






MAG 4046









COMPENDIO  
D' INSTITUTE  
CHIRURGICHE

AD USO DE' PRINCIPIANTE

DEL SIGNOR

GIOSEFFO JACOPO  
PLENCK,

Dottore di Chirurgia, pubblico e ordinario Ce-  
sareo-Regio Professore di Chirurgia, Anato-  
mia, e dell' Arte Ostetricia, nella Cesareo-  
Regia Università di Buda.

PARTE SECONDA.

TERZA EDIZIONE.



IN VENEZIA, MDCCXCV.

Presso Giuseppe Orlandelli,

PER LA DITTA DEL FU'  
FRANCESCO DI NICCOLO' PEZZANA.

Con Approvazione, e Privilegio.



# APPARATO DELLA PATOLOGIA CHIRURGICA

Della Patologia in generale.

## NOSOLOGIA.

Della Nosologia in generale.

*Morbi semplici delle parti solide.*

Morbi di coesione.

— — elasticità.

— — irritabilità.

— — sensitività.

*Morbi organici delle parti solide.*

Morbi di numero.

— — diametro.

— — magnitudine.

— — figura.

— — sito.

— — legame.

— — continuità.

— — consistenza.

— — sostanza.

— — colore.

— — calore.

— — pianezza.

— — gravità.

*Morbi delle parti fluide.*

Morbi di quantità.

— — coerenza.

— — acrità.

- degenerazione .
- mescolglio .
- error di luogo .
- ritenzione .
- escrezione .
- secrezione .
- moto .

della Divisione e differenza de' morbi in generale.

### ETIOLOGIA.

Delle cause de' morbi in generale .

Cause prossime de' morbi .

——— eccitanti .

——— predisponenti .

### SINTOMATOLOGIA.

De' sintomi in generale .

Sintomi esterni .

——— interni .

### SEMIOTICA.

De' segni de' morbi in generale .

Diagnosi .

Anamnesi .

Prognosi .

### TERAPIA.

Della cura de' morbi in generale .

——— particolare .

Igiene .

Farmaceutica .

Chirurgia .

DEL:



D E L L A  
P A T O L O G I A  
C H I R U R G I C A .  
I N G E N E R A L E .

**L**A *Patologia chirurgica* è una scienza, che dà la dottrina de' morbi esterni. Si divide in *generale*, che considera i morbi generalmente; e in *ispeziale*, che li considera ad uno ad uno.

La *Patologia generale* si discerne in 5. parti:

1. *Nosologia*, che tratta del nome, divisione e differenza de' morbi.
2. *Etiologia*; delle cause de' morbi.
3. *Sintomatologia*; de' sintomi de' morbi.
4. *Semiotica*; de' segni de' morbi.
5. *Terapia*; della curazione de' morbi.

La *Terapia* torna a dividersi in tre parti:

1. *Igiene*, che tratta del vitto, e dell' uso di cose naturali.
2. *Farmacentica*; de' medicamenti.
3. *Chirurgia*, che insegna a curar i morbi con gli strumenti e colla mano.

## N O S O L O G I A .

*NOSOLOGIA* è una scienza , che dà i nomi de' morbi , le differenze e divisioni loro .

Il *morbo esterno* è una costituzione preternaturale di alcuna parte .

I morbi hanno il ~~lor~~ *nome* o dall' indole loro , o dal lor sintomo primario , o dalla loro causa prossima .

La *primaria* division de' morbi è

1. in morbi *semplici di parti solide* ;
2. — — *organici* — — — ,
3. — — *di parti fluide* .

## M O R B I S E M P L I C I

## D E L L E P A R T I

## S O L I D E .

**S** O N O costituzioni preternaturali delle *forze* , che dalle fibre del nostro corpo si esercitano .

Le primarie forze delle nostre parti sono ,

1. La *coesione* .
2. La *elasticità* .
3. L' *irritabilità* .
4. La *sensitività* .

MOR-

## MORBI DI COESIONE.

La coesione degli elementi , che formano la fibra , può peccar in tre modi :

1. Per coesione *deficiente* .
2. ————— *eccedente* .
3. ————— *soluta* .

La coesione degli elementi fibrili troppo parva, o *deficiente* nelle parti *molli* , si chiama *laxità di fibre* ; *mollizie* , nell' *ossa* .

La coesione degli elementi fibrili troppo grande , o *eccedente* nelle parti *molli* , si dice *rigidità di fibre* ; *fragilità* , nelle *ossa* .

La coesione delle fibre soluta fa *tubo* ( *marchia* ) nelle parti *molli* , e *polvere* nell' *ossa* .

## MORBI DI ELASTICITÀ.

L'elasticità delle parti elastiche pecca di *ecceffo* o di *difetto* .

*Ecceffo* d'elasticità dicesi l'*estruazione* delle *fibre* .

*Difetto* d'elasticità dicesi l'*inerzia* delle *fibre* .

## MORBI D'IRRITABILITÀ.

L'irritabilità delle fibre muscolari può peccare in *ecceffo* o in *difetto* , ovver in *mota* o in *immobilità* .

Irritabilità eccedente si chiama la *troppa mobilità delle fibre muscolari*.

Irritabilità deficiente, il *torpore delle fibre muscolari*.

La contrazion preternaturale della fibra muscolare si dice *spasmo*.

L'immobilità preternaturale della fibra muscolare si chiama *paralisi di fibra*.

### MORBI DI SENSITIVITA'.

Sensitività eccedente. dicesi la *sensazione ingrata o il dolore*.

— — — — — deficiente, l'*insensibilità o anodinia*.

## MORBI ORGANICI.

### D E L L E

### P A R T I S O L I D E .

**S**ONO costituzioni preternaturali di qualità *visibili* nelle parti solide del nostro corpo.

Le qualità visibili degli organi del nostro corpo sono, il *numero*, il *diametro*, la *magnitudine*, la *figura*, il *sito*, il *legame*, la *continuità*, la *consistenza*, la *sostanza*, il *colore*, il *calore*, la *pianezza* e la *gravità*.

MOR-



## MORBI DI NUMERO.

- Il numero di qualche parte pecca in *ecceſſo*, o in *diſetto*.
- Il numero *eccede*, ſe vi ſono ſei dita, o tre teſticoli, o due verghe, o due teſte.
- Il numero *manca*, ſe manca un dito, una gamba, un braccio, la verga, o l'naſo.

## MORBI DI DIAMETRO.

- Il diametro de' vaſi e d'altre parti contenenti peccano per *ecceſſo* o *diſetto di amplitudine*.
- Il diametro delle parti contenenti accreſciuto ſi chiama *amplitudine morbosa*.
- Il diametro delle parti contenenti, diminuito o abolito, ſi dice *angustia morbosa*.

Sette ſono le ſpecie di *amplitudine morbosa*:

1. L' *eurisma*, ovvero *dilatazione* preternaturale di vaſi e d'altre cavità. Come nell' *aneurisma vero*, nelle *varici*, e nell' *aſcite* oſſervafi.
2. La *flogoſe*, ovvero *dilatazion* preternaturale de' vaſi ſanguiferi o ſcoloriti, la quale induce roſſezza e calore, come ſi può vedere in ogni *inſiammazione* ed *eritema*.
3. L' *anaſtomofi*, o *dilatazione* preternaturale d'orificj o bocche, qual ſi vede

in certe emorragie e negli anelli dell' ernie inguinali.

4. La *diapedesi*, o *dilatazion* preternaturale de' pori ne' lati de' vasi o delle cavità, la quale a guisa di tessuto lascia trasudare quegli umori ch' ella dovrebbe contenere. Questo *trasudamento* addiviene in ogni gagliarda *infiammazione*, e in iscavi molto distesi.

5. La *diereesi*, o *ferita* di vasi o scavi come la ferita de' vasi o scavi del cranio, torace, addomine.

6. *Rissi* o *rottura* di vasi o scavi. Come la rottura dell' *umbilico* nell' ascite, de' *ligamenti capsulari* nella dislocazione, delle *vene* nelle varici, dell' *arterie* nell' aneurisma.

7. La *diabrost*, od *erosione* di qualche scavo per *acrimonia*, *caustico* od *ulcere*.

Le *angustie* morbose sono parimente di sette specie:

1. L' *enfrassi*, ovvero *ostruzione* di vasi o di meati a causa dell' umore che non può passare per l' estremità dell' arteria o del meato.

2. La *stenocoria* o *turamento* di vie per esser gonfia la parete che forma lo scavo. Così l' intumescenza dell' interna membrana produce stenocoria d' esofago, d' uretra, di vagina.

3. La *slipfi*, ovvero *compressione* del vaso, o scavo, per causa fuor di lui situa-

situata . Così lo scirro subascellare comprimendo l'arteria brachiale fa l'*aridore* del braccio .

4. La *contrattilità dello scavo*, o *contrazione* preternaturale di qualche vaso o meatò per *forza contrattile spontanea* . Così l'*uretra*, appoco appoco contratta, causa *iscuria* .
5. La *sinizesi*, o preternaturale *tracollo* o *sussidenza* di vasi o di meati . Così tracollano dopo il parto i vasi umbilicali .
6. La *sinfisi*, ovvero preternaturale *coalescenza* o *concrezione* di vasi o di meati, come in senettù adiviene in vasi e in altri meati .
7. L'*angustia di apertura* è la troppo piccola *amplitudine* di qualche bocca o porta, come si vede nella fimosi del prepuzio, o nella strettura dell'intestino retto,

## MORBI DI MAGNITUDINE.

La grandezza delle parti può *eccedere* o *mancare* .

L'accresciuta magnitudine di qualche parte si chiama *tumore* .

Qui dunque si riducono tutt' i tumori, e *frigidi*, e *calidi* .

La diminuita magnitudine di qualche parte dicesi *magrezza*; come l'*aridore* del braccio e della gamba .

## MORBI DI FIGURA.

La figura di qualche parte può peccare in *dimensione*, *crassizie*, o *forma*.

Ecceſſo di dimenſione è la *longitudine*, come il capo biſlungo.

Difetto di dimenſione è la *parvità*, come la parvità del capo.

Ecceſſo di crassizie è la *grossezza*, come il collo groſſo.

Difetto di crassizie è la *gracilità*, come le gambe gracili.

Svariar dalla forma è *deformità*, come il collo torto, la gobba della ſpina del dorſo, le gambe sbilenche.

## MORBI DI SITO.

Il ſito di qualche parte può peccare di *luogo*, di *rimozione* e di *direzione*.

*Error di luogo* diceſi il ſito in luogo alieno, come un dente che creſce dal palato, o la vulva ſotto l'umbilico.

Il ſito della parte ſmoſſa dalla ſua fede chiamafi *ectopia*. Qua riferiſconſi tutte l'ernie, i prolapſi, le luſſazioni e diſtaſi dell' oſſa.

Il ſito divergente dalla ſua direzione ſi nomina *obliquità*; come l'obliquità dell' utero, del dente, del capo.

MOR.

## MORBI DI LEGAME.

- Il legame di qualche parte è troppo *debile* e troppo *forte*.
- Il *legame* troppo *debile* si osserva nella preternaturale mobilità dell' articolo.
- Il *legame* troppo *forte*, nella preternaturale immobilità dell' articolo o nella anchilosi.

## MORBI DI CONTINUITA'.

- La continuità della parte pecca per *soluzion del continuo*, o per *continuità del soluto*.
- La preternaturale *soluzion del continuo* è in parti molli, *ferita*, *ulcero*, *labbro leporino*; in parti dure, *fratura*, *carie*, *fessura*.
- La *continuità* preternaturale in parte, che dovrebb'esser soluta, è la *concrezione dell' ano*, della *vulva*, dell' *articolo*.

## MORBI DI CONSISTENZA.

- La consistenza della parte può peccare per *troppa mollezza*, o per *troppa durezza*.
- La *consistenza* troppo *molle* è nell' *edema*, nell' *ascesso*, nella *cancrena*.
- La *consistenza* troppo *dura* è ne' tumori *indurati* e *asfei*.

MOR-

## MORBI DI SUSTANZA.

La sostanza di qualche parte naturale si può mutare di naturale in preternaturale.

Qui appartiene la sostanza di parti molli mutata in *cartilaginea*, *ossea*, *terrea*, *cavernosa*, *callosa*, *fungosa*, *steatomatosa*, *scirroso*, *putrida*; e la sostanza dura dell' ossa mutata in *fungosa*, o *carnea*.

## MORBI DI COLORE..

Il color naturale di qualche parte pecca di *difetto* o di *alienazione*.

Il difetto di color naturale si osserva nel *pallore* della *ferita* o dell' *ulcera*, o di altre parti.

L'alienazione del color naturale è il color rosso nell' *infiammazione*, livido nella *cancrena* e nell' *ecchimosi*, nero nella *necrosi* e nella *carie*.

## MORBI DI CALORE.

Il calor naturale di qualche parte può peccare di *eccesso* o di *difetto*.

L'eccesso di calore è nelle *infiammazioni*.

Il difetto — — è nello *sfacelo*.

## MORBI DI PIANEZZA.

La superficie di qualche parte può peccare in *liscio*, o in *iscabro*.

Il *liscio* morbofo della *superficie* è nella *calvizie*.

Lo *scabro* della *superficie* nafce da *pustule* da *vefcichette*, da *vajuole*, da *squame*.

## MORBI DI GRAVITA.

La *gravità* naturale di qualche parte pecca di *eccesso*, o *difetto*.

La *gravità* maggiore, fi osserva in parte infiammata e indurita;

La ——— minore, nell' *enfifema* di tutto il corpo; quindi i cadaveri putridi galleggian full' acqua.

## M O R B I

### DELLE PARTE FLUIDE.

GLI *umori* del nostro corpo poffon peccare di

1. *Quantità*.
2. *Coerenza*.
3. *Acrità*.
4. *Degenerazione*.
5. *Mefcolamento*.
6. *Errore di luogo*.
7. *Ritenzione*.
8. *Efcrezione*.
9. *Secrezione*.
10. *Moto*.

MOR-

## MORBI DI QUANTITA'.

La quantità del sangue può peccare in *ecceſſo* o in *difetto*.

L' *ecceſſo* ſi chiama *pletora* ; il *difetto* , *Keneangia* .

La *pletora* , o abbondanza di ſangue buono , ſi divide ,

1. in *uniuerſale* , quando il ſangue abbonda in tutto il corpo , e in *parziale* quando abbonda in una ſola parte ;
2. in *vera* , quando v'è abbondanza di ſangue vero , e in *iſpuria* quando v'è ſoltanto eſpanſion di ſangue , che diceſi *rarefazione* .

La *Keneangia* , o difetto di ſangue buono , può anch'eſſere *uniuerſale* , o *parziale* .

## MORBI DI COERENZA.

La coerenza de' principj , che forman gli umori , pecca di *ecceſſo* , di *difetto* , o di *ſeceſſo* . La coerenza di *ecceſſo* ſi chiama *ſpeſſezza* ; la coerenza di *difetto* , *tenuità* .

La *ſpeſſezza* degli umori è di due forte :

1. *Speſſezza ſemplice* , che naſce da ſolo difetto d'acqua .
2. *Speſſezza compoſta* , la qual è *glutinoſa* , o *inflammativa* , o *atrabilaria* , o *coagulata* , o *venerea* .

La *tenuità* degli umori è pur di due forte :

1. Te-



1. Tenuità *semplice* , che dipende dalla sola abbondanza di acqua .
2. Tenuità *composta* , con cui s'è unita l'acrimonia .

*Secesse* sono i troppo facili staccamenti delle particelle da particelle con cui dovrebbero stare . Così quando la sola acqua , il sale , l'olio , il moccio , la terra , o la gelatina facilmente si ritira dalla comun massa del cuore , nascono varie *discrasie* di umori , e varj tumori di secesso .

## MORBI DI ACRITA'.

Le *acrità* sono impregnazioni di umori con qualche principio irritante .

Le *acrità* degli umori si dividono in *vulgari* , e *specifiche* .

*Acrimonie vulgari* sono ,

1. L'*acrimonia acida* , o abbondanza di sale acido negli umori .
2. ——— *alcalina* , o abbondanza di sale alcalino volatile .
3. ——— *ammoniaca* , o abbondanza di sale negli umori , il quale in essi è nativo .
4. ——— *muriatica* , o abbondanza di sale culinare .

*Acrimonie specifiche* sono ,

1. Le *acrimonie de' morbi cronici* , come *Acrimonia* , *venerea* , *scorbutica* , *artritica* , *podagrica* , *reumatica* , *scrofolosa* ,  
scir-

*feirrosa, cancerosa, ulcerosa, cariosa, scabbiosa, cignosa, lebbrosa, elefantica, erpetica, plicosa.*

2. Le acrimonie de' morbi acuti, come *Acrimonia variolosa, morbigliosa, miliare, scarlattina, erisipelatosa, petecchiale, pestilenziale, carbuncolosa, cancrenosa, putrida, di febbre intermittente o di continua.*

## MORBI DI DEGENERAZIONE.

Qui si riferiscono le spontanee mutazioni degli umori d' indole naturale in morbosa.

Avvengono queste degenerazioni nelle prime vie, o negli umori medesimi. Nelle prime vie si chiamano *savorre*; negli umori, *cacochimie* o *cachessie*,

Qui appartengono,

1. La *rancescenza*, o degenerazione dell' olio in umor acre, quale si osserva nel burro guasto.
2. La *putrescenza*, o degenerazione del sangue, e degli umori gelatinosi, in umor tenue e fetido, qual si osserva in un cadavere.
3. La *purulenza*, o degenerazione dell' umor gelatinoso in *marcia*, o in umore blando e albicante, qual si trova nelle ferite. La *marcia* si divide,
  1. in *marcia buona*, ch'è senza odore, ha sapor blando, consistenza di

cre-

erentor latteo , colore stramineo , maggior gravità che l'acqua , arde al fuoco , e nasce da precedente infiammazione , ferita od ulcere .

2. in marcia *cattiva* , la qual è tenue , fetida , acra , verdeggiante , nericante o fosca , Questa marcia si dice anche *sanie* o *icore* .
3. in marcia *spuria* , ch'è un moccio flavo , il quale senza precedente infiammazione o ferita nasce , e non arde . Si può sovente osservare questo moccio puriforme nella corizza , nella gonorrea , nella fistola lagrimale spuria , e nel fluor bianco .

La *pioggia* , o generazione della marcia , è ancor oscura : pare che la materia della marcia si formi , in ferita , ulcera , o tumore infiammativo , da *gelatina* di siero , che trasuda dai vasi infiammati e che si mischia con l'*olio* della membrana adiposa . La marcia *spuria* è senza olio , perciò non arde .

4. La *crosta infiammatoria* è degenerazione della *gelatina* di sangue o di siero in unor albicante e tenace , il quale ne' morbi infiammativi suol coprire la superficie del sangue cavato dalla vena .
5. La *cancrenscenza* è degenerazione della materia scirrofa in acrimonia specifica , quale si osserva nel canchero .

6. L' *acrescenza della bile* è una peculiare degenerazion della bile, la quale molto si confa collo rancescenza.
7. L' *atrabile*, che si osserva ne' malinconici e maniaci.
8. L' *acrimonia della materia perspirabile*, provegnente dalla ritenzione di questo liquido.
9. L' *acrimonia dell' orina*, che nasce da lunga ritenzion d' orina.
10. L' *acrimonia stercoracea*, che nasce da feccia intestinale ritenuta lungo tempo. E
11. L' *acrimonia degli ulceri*, la quale, riassorbita dalla superficie dell' ulcero, si comunica agli umori.
12. La *savorra delle prime vie*: questa degenerazione è di molte sorte; *acida*, *putrida*, *biliosa*, *rancida*, *glutinosa*, *salina*, *cruda*, *aromatica*, *acerba*; *terrea*, *flatulenta*, *venenata*, *verminosa*.
13. La *degenerazion de' liquori* in materia simile a *miele*, *poltiglia*, *sevo*, *cartilagine*, *osso*, *terra*.

## MORBI DI MESCOLAMENTO.

V' ha molte meschianze di umori, quanto a' principj costitutivi degli umori. Qui dunque appartengono le seguenti *diatesi e discrasie* d'umori:

1. L'

1. L' *acquosità*, se l' acqua abbonda , come nell' idropisia .
2. L' *oleosità* , se abbonda l' olio , come nella corpulenza .
3. La *chilosità*, se il latte , come nelle donne di parto .
4. La *cruorità*, se i globettini rossi abbondano , come nel temperamento sanguineo .
5. La *glutinosità*, se abbonda il glutine , come nel temperamento pituitoso .
6. La *gelatinosità* , se gelatina , come negl' infanti .
7. La *terrestrità*, se abbonda la terra , come nella *senettù* , nella podagra e ne' calcolosi .
8. L' *acrità* , se negli umori abbonda qualche principio acre . V. *Morbi di acrità* .

## MORBI PER ERROR DI LUOGO.

Il passar degli umori da' loro vasi in vasi alieni si dice *error di luogo* . Così è quando passa il sangue da vasi rossi in vasi *sierosi* o *scoloriti* , come avvien nell' infiammazione e nell' eritema .

## MORBI PER RITENZION D'UMORE.

Il ritenersi nel corpo l' umore , che se ne dovrebbe segregare , si chiama *ritenzione* . Qui appartien la ritenzion del-



delta *materia perspirabile*, dell' *orina*, della *feccia intestinale*; del *latte*, del *sangue mestruo*, de' *lochii*, delle *morroidi*, della *marcia*, o di qualunque altra *materia morbosa*.

## MORBI PER ESCREZION D'UMORE.

L'uscir che fa l'umore dal corpo si dice *escrezione*. Qui spettano l'escrezion del *sangue* dalla ferita; e la troppa escrezione di *marcia* dall'ulcero, e di *siero* o *linfa* dall'ulcero di tumor linfatico.

## MORBI PER SECREZION DI UMORE.

*Secrezione morbosa* è l'effusione o stravasamento dell'umor sano da' suoi vasi nelle cellule della membrana cellulosa o nelle cavità magne del corpo.

Qui si riferisce lo stravasamento del *sangue* nell'ecchimosi, dell'*acqua* ne' tumori idropici, dell'*aria* nell'enfisema; del *latte* ne' tumori lattei.

*Metastasi* è la secrezione dell'umore morboso in qualche luogo: qui dunque spettano tutt' i tumori *metastatici* e *critici*.

## MORBI PER MOTO DI UMORI.

Il moto degli umori può peccare per *ecceffo*, *difetto*, e *direzione*.

Il moto maggior degli umori in tutto il corpo si chiama *ecceſſo di moto*.

Il moto ————— diretto a qualche parte, ſi chiama *congeſtione* di umori.

Nun moto d'umori in qualche parte, ſi chiama *ſtagnazione* d'umori.

L'*inſuſſo* e l'*effuſo* d'umori di qualche parte poſſono *impedirſi*.

## DELLA DIVISIONE E DIFFERENZA

### D E' M O R B I.

IL *decorſo totale* di ciaſcun morbo ſi ſuol dividere in cinque *ſtadi*:

1. Il *principio* è lo ſtadio in cui il morbo comincia.
2. L'*aumento*, in cui il morbo va perpetuamente crescendo.
3. Lo *ſtato*, in cui nè creſce, nè cala.
4. Il *decremento*, in cui il morbo di-creſce.
5. Il *ſine*, incui il morbo ceſſa del tutto.

La differenza de' morbi ſi divide in *effenziale*, e *accidentale*.

La differenza *effenziale* è quella diverſità d'indole, con cui un morbo differiſce dall'altro.

La differenza *accidentale* ſi è la diverſità, col-

colla quale le spezie dell'istesso morbo fra se differiscono.

Dalla differenza essenziale si dividono i morbi in *classi*, *generi*, *specie* e *varietà*. Di questi veggasi la mia *Patologia speciale*.

La differenza accidentale de' morbi si prende dall'origine, tempo, sede, decorso, indole, genere di vita, sesso, età, clima, evento.

## DIFFERENZE DE' MORBI DALL' ORIGINE.

In rispetto all'*origine* o *causa* si dividono i morbi,

### 1. In *ereditarj*, *congeniti*, e *avventicj*.

*Ereditarij*, quegli che nell' infante nascono da morbo de' genitori. Questi morbi adunque posson essere *paterni* o *materni*. Così il mal francese, il mal di pietra, le scrofole, la catteratta, sovente passano di padre in figlio.

*Congeniti*, quegli che la prole contrae nell'utero, ma non da' genitori, perchè sarebbon *ereditarj*; bensì da altra causa. Qui si rapportano i nervi o macchie materne, l'idrocefalo, la spina bifida, e tutte le deformità.

*Avventicj* si chiamano tutti que' morbi, che fin alla morte si contraggono un poco avanti il parto, dopo il parto.



to. Qui, oltre i morbi e reeditarj e congeniti, appartengono tutti gli altri.

2. In *primarij*, e *secondarij*.

*Primarij* o *protopatici*, quegli che non da altro morbo, ma dalla loro propria causa nascono; come la ferita, la contusione, la frattura.

*Secondarij* o *deuteropatici*, che nascono da altro presente o precedente morbo; come la lussazione da tumor interno dell' articolo, l'ulcero da infiammazione, e la cataratta nata dopo l'operazione.

3. In *pandemj*, *endemj*, *epidemicj* e *sporadici*.

*Pandemj*, i quali senza contagio attaccano molti uomini nel medesimo luogo. Così la soldatesca, che viaggia in un vento polveroso, quasi tutta inferma d' oftalmia; e così l'aria umida cagiona a moltissimi dolor di denti reumatico.

*Endemj*, che sono proprj di certo paese o popolo. Così la gente alpina patisce il gozzo, la marittima l'ulcero scorbutico, e i *Polacchi* van soggetti alla *plica polonica*.

*Epidemicj*, morbi che attaccano molti uomini nel medesimo luogo e tempo. Così talora v'è epidemia di carboncelli, di bubboni pestilenziali, di angine cancrenose.

*Sporadici*, i quali si osservano in ogni

luogo e tempo fra gli uomini. Anche i morbi epidemici osservansi ad ora ad ora in via sporadica. Così di tempo in tempo taluno del popolo è assalito da carboncello, o da angina cancrenosa.

4. In morbi *veri*, *finti*, o *artefatti*.

*Veri*, quegli che la natura eccità.

*Artificiali*, che si fanno con arte, come gli ulcersi procurati per setaceo, per fontanella, per vescicatorio.

*Finti*, che si fingon con arte, come l'azzoppamento, l'elefantiasi, le macule indotte per impiastro di colori,

5. In morbi *legittimi*, e *spurj*.

*Legittimi* quelli che hanno vera indole di morbo.

*Spurj*, che simulano altro morbo e non hanno l'indole generica di morbo.

Quindi l'ernie si dividono in *vere* e *spurie*, e gli aneurismi in *verj* e *spurj*.

6. In morbi da causa *esterna*, o *interna*.

*Morbi da causa interna*, o *spontanei*; son quelli che nascono per vizio degli umori, o de' solidi, senza causa esterna, come gli ulcersi per acrimonia scorbutica od altra.

*Morbi da causa esterna*, o *violenti*, quegli che nascono da vizio esterno, come l'ulcera da vescicatorio, l'infiammazione da contusione.

## DIFFERENZE DE' MORBI DALLA SEDE DEL MORBO.

Rispetto alla *sede* i morbi si chiamano ;

1. *Esterni*, che seggono nell'esterna superficie del corpo, come la ferita, l'ulcera, il tumore.
2. *Interni*, che riseggono in qualche cavità del corpo, come ferita di viscera, effusion di sangue, ascite, idrocefalo, idrotorace, carie d'articolazione.
3. *Vaghi*, che passano d'una parte in altra. In tal guisa si ha la risipola vaga.
4. *Fissi*, che nel luogo, da essi attaccato, dimorano perpetuamente, com'è il solito di quasi tutt' i morbi.
5. *Retrogradi*, i quali dopo aver assediata per qualche tempo una parte esterna, la lasciano, e s'internano. Così talvolta la risipola della parte esterna svanisce in un tratto, e va nel cerebro, o ne' polmoni, con sommo pericolo.
6. *Idiopatici*, la causa de' quali risiede in quell' istessa parte in cui il morbo si mostra.
7. *Simpatichi* o *consensuali*, la cui causa risiede in altra parte da quella in cui il morbo si fa vedere: come l'amaurosi da flogora del ventricolo, l'odontalgia da gravidanza, il vomito da lesion del capo.

8. *Sintomatici*, che sono sintomi d'altro morbo. Quasi ogni morbo può essere sintomo d'un altro.
9. *Universali*, che assediano tutta la superficie del corpo: come l'anassarca, la pneumatosi, l'ambustione universale, se taluno cade in un bagno caldo.
10. *Parziali*, che occupano tutta una parte, come l'edema delle gambe, l'enfisema del capo, la risipola della faccia.
11. *Topici o locali*, che soltanto il luogo di qualche parte assediano, come la ferita, il tumor cistico. Molti morbi pajono per ragion della lor sede esser *locali*, che nulladimeno rispetto alla lor causa sono *universali*, come il carcinoma, la scrofola.
12. *Morbi delle parti*, quelli che a ciascuna parte sono proprj. Così abbiamo la divisione anatomica de' morbi, come i morbi del capo, del collo, del torace, dell'addomine, delle membra, oppure i morbi cutanei, oculari, quì de' denti, dell'ossa, delle glandule ec.

### DIFFERENZE DE' MORBI DAL DECORSO.

Rispetto al *decorso*, che i morbi soglion avere, si chiamano morbi

1. *Brevi*, che passan presto; come i  
tumori.

tumori infiammativi , le ferite , le frattore .

2. *Lunghi* , che durano più lungamente avanti che si possa guarirli , come gli ulceri , l'ernie , i prolapsi .
3. *Cronici* , che durano molti anni , come il canchero , l'ulcero antiquo , la spina ventosa , la carie .
4. *Continui* , i quali dalla prima invasione continuano coll'istesso tenore fin alla fine .
5. *Remittenti* , che per intervalli s'allentano , o inacerbiscono , ma non cessan del tutto .

6. *Intermittenti* , o *periodici* , che per un certo tempo infestano , e tornano a cessare . Così dassi l'ostalmia periodica , la quale infesta ogni due giorni :

I morbi periodici , che osservano certo tipo , si dicon *tipici* ; ma quei che non osservan certo tipo , si chiamano *erratici* .

Il tempo fra due *insulti* si chiama *apiressia* ; il tempo dell' insulto medesimo , *parossismo* s'appella .

7. *Precedenti* , che precedono un altro morbo : così l' infiammazione è un morbo che precede l' ascesso ; la sfessatura dell' osso è un morbo che precede la carie .

8. *Accessorj* , che accedono al morbo presente ; come la cancrena alla ferita , la contusione alla mammella scirrofa .

9. *Successori*, che succedon al morbo già finito: così di spesso vengon dietro al vajuolo i furuncoli, i leucomi della cornea, gli ascessi cariosi.

## DIFFERENZE DE' MORBI DALL' INDOLE.

Rispetto all' *indole*, che i morbi soglion avere, si danno morbi,

1. *Magni*, i quali fanno il lor corso con gravi e grandi sintomi; come la ernia incarcerata, le lesion di un nervo.

- [ 2. *Parvi*, che han sintomi leggieri e non pericolosi; come una lieve ferita, un ulcero semplice.

3. *Benigni*, che non hanno nè pericolo, nè sintomi gravi; come il tumor cistico, lo scirro o polipo benigno.

4. *Maligni*, che hanno pericolo apparente od occulto; come lo scirro maligno, il carcinoma, il morso di cane rabbioso, o di vipera venenata.

5. *Refrattarij*, che eludono la forza de' rimedj sperimentati, o che più s' esacerbano con la solita cura; come il chancreo, la carie occulta.

6. *Contagiosi*, che per contatto passano da un uomo all' altro, come il mal-francese, il bubbone pestilenziale.

7. *Regolari*, che hanno i consueti sintomi.

8. *Irregolari* o *anormali*, che non hanno i consueti sintomi.

9. *Sem-*

9. *Semplici*, che sono solitarj nella parte, come la frattura semplice, la lussazion semplice.
10. *Composti*, che accadono alla parte due volte, o più, come la frattura doppia o tripla in un osso.
11. *Complicati*, i quali con altro morbo stanno nella medesima parte, come lussazione complicata con ferita, o con carie, o con frattura d'articolazione.

### DIFFERENZE DE' MORBI DALL' EVENTO

Rispetto all' *esito*, che i morbi aver sogliono, dividonsi,

1. In *sanabili*, che per arte o per natura sanar si possono.
2. — *insanabili*, che finora nè per arte nè per natura si sono potuti sanare.
3. — *letali*, che finiscono colla morte.  
I morbi letali si suddividono,
  1. In *assolutamente letali*, ne' quali nè arte, nè natura può salvar da morte.
  2. In *per se letali*, in cui l'arte, non la natura, può salvar da morte.
  3. In *per accidente letali*, che per se non sono letali, ma per error del Chirurgo, o per abuso di sei cose non naturali, diventano letali.

4. In *incipiti*, l'esito de' quali , per vita o per morte, è incerto.
5. In *recidivi*, i quali già sanati soglion di spesso tornare , come la cateratta; l'amaurosi.
6. In *salutari* o *salubri*, i quali preservano o curano l'uomo da altro morbo più grave. Qui spettano gli ulceri, e i tumori critici.
7. In *insalubri* o *detrimentosi*, che da niun altro morbo preservano, o curano.

### DIFFERENZE DE' MORBI DAL GENERE DI VITA:

Dal *genere di vita* si distinguono i morbi in quei d'*artefici*, *soldati*, *rustici*, *letterati*, *ecclesiastici*, *ricchi*, *poveri*, *peregrinatori*, e *sedentarij*.

### DIFFERENZE DE' MORBI DAL TEMPERAMENTO.:

Dal *temperamento* si distinguono i morbi in morbi di *sanguigni*, *biliosi*, *pituitosi*, *atrabilarj*.

### DIFFERENZE DE' MORBI DAL SESSO.

Dal  *Sesso* distinguonsi i morbi in *masculini* e *femminini*. I femminini si suddividono in morbi di *vergini*, di *gravid*  
de



*de, di partorienti, di donne di parto, di vecchie.*

## DIFFERENZE DI MORBI DALL'ETA'.

Dall'*età* si dividono i morbi in *embrionali, infantili, giovanili, virili, senili.*

## DIFFERENZE DAL CLIMA.

Dal *clima* si dividono i morbi in quei di *climi caldi; freddi; temperati; umidi, secchi.*

## DIFFERENZE DE' MORBI DAL TEMPO.

Dal *tempo* si distinguono i morbi in *vernali, estivi, autunnali, jemali*: in *novilunari e plenilunari*: in *diurni e notturni.*

Dalla *durazione* del morbo si dividono in *recenti e inveterati.*

Finalmente dallo *stadio* del morbo ogni morbo si può dividere in *incipiente, progrediente, stante, declinante e fi-  
niente.*

## E T I O L O G I A

O V V E R O

DOTTRINA DELLE CAUSE

D E' M O R B I.

DELLE CAUSE DE' MORBI  
IN GENERALE.

**L**A *causa* del morbo è un ente che produce il morbo.

Generalmente le cause de' morbi si dividono,

1. In *cause proegumene* o *predisponenti*;
2. In *cause procatartiche* od *occasionalì*, od *eccitanti*.
3. ——— *prossime*, o *costituenti il morbo*.

*Causa proegumena* o *predisponente* è quella disposizione, interente al corpo, per forza della quale egli è reso atto ad imprendere il morbo.

Non tutt' i morbi hanno una causa predisponente. Questa predisposizione è una certa costituzione de' fluidi, o de' solidi, oppure di questi insieme e di quelli: e già ella si trova nel corpo avanti la nascita del morbo.

*Causa procatartica* od *occasionale* si è quell' ente il quale, applicato al corpo, eccita il morbo nel corpo predisposto.

Que-

Questa causa si dice anche *remota*, e suol dividerfi

1. In *esterna*, la quale, esistendo fuor del corpo, al corpo si applica.
2. In *interna*, la quale, esistendo entro il corpo, dà la causa del morbo.

*Causa prossima* è la stessa mutazion de' solidi o de' fluidi, la quale fa il morbo presente; o pure causa prossima è il *morbo stesso*.

Necessarissimo è al Chirurgo lo studio delle cause, poichè nel togliere la causa morbifica sta la cura del morbo.

## CAUSE PROSSIME DE' MORBI.

Cause prossime sono i morbi semplici delle fibre, o degli umori, di cui sono composte la parti malate.

### MORBI DA MORBI SEMPLICI DELLE PARTI SOLIDE.

La *lassità* fa distorsione, lussazione, aneurismi veri, varici, ernie.

La *mollizie dell'ossa* cagiona curvature di membra, gibbosità, deformità di parti.

La *rigidità* causa anchilosi di articolì; e la *fragilità dell'ossa*, fratture.

La *fracida soluzion delle parti* produce umor putrido, canceroso o carioso.

*Elasticità eccedente*. La troppa elasticità delle cartilagini della pelvi è causa di parto difficile in femmine attempate.

*Elasticità deficiente* . Così l'inerzia delle cartilagini della pelvi ammette , al punto di pavorire , la diastasi dell' ossa della pelvi . L'inerzia delle cartilagini intervertebrali fa gobba la persona .

*Irritabilità accresciuta* : lo stimolo fa dolore nei nervi sensorj ; spasmo o convulsione nei nervi motorj ; infiammazione o febbre nei nervi vitali .

L'irritabilità diminuita induce in breve la cancrena .

Lo spasmo causa iscuria spasmodica , o angina spasmodica .

La paralisi causa angina paralitica , e iscuria per paralisi della vescica .

La sensitività accresciuta fa troppa sensibilità e dolore .

*Sensitività perduta* ; ne nasce anodinia alla cancrena . La sensitività perduta nel nervo ottico fa amaurosi ; e nel nervo uditorio , sordità .

## MORBI DA MORBI DI UMORI .

Dalla *pletora* nascono le emorragie da' luoghi soliti e non soliti , e le infiammazioni vere e spurie .

Dalla *Keneangia* si fan tumori edematosi .

Da *spessezza* , ostruzioni e tumori .

Da *tenuità* , infiammazioni , macule , emorragie ed extravasazioni .

Da *acrimonia* nascono varj morbi . Così  
L'acri-

L'acrimonia *acida* fa mollizie d'ossa universale o particolare, tumori cariosi e cancrenosi.

L'acrimonia *alcalina* causa tenuità acre di umori: quindi infiammazioni, ulceri, emorragie.

L'acrimonia *muriatica* induce rigidità, ulceri cacoeti.

L'acrimonia *venerea* cagiona gonorrea, fluor bianco, bubboni, ulceri, oftalmia, condilomi, artritide notturna, tufi e gomme.

L'acrimonia *scorbutica* è causa di ulceri fungosi, gengie sanguinolenti, macule, induramento di gambe, e strepito d'ossa.

L'acrimonia *artitrica* fa tumori artitrici, e ulceri che plorano sanie nerican-  
te.

———— *podagrica* fa tumori podagri-  
ci e nodi ferrei.

———— *reumatica* fa dolorosi tumori di muscoli e articolì, dolori di testicoli, ulceri cacoeti, carie, aridore e contrattura di membra, angina, oftalmia, e odoptalgia reumatica. Le infiammazioni reumatiche appena rofseggiano.

———— *scrofolosa* produce scrofole nel collo, nel mesenterio, nell'anguinaja; oftalmia; intumescenza del naso, e del labbro superiore; carie d'ossa; tumori bianchi; degli articolì.

— scir-

\_\_\_\_\_ *scirrofa e cancerosa* dà scirri e cancheri .

\_\_\_\_\_ *carbuncolosa e pestilenziale* , carbonchj e bubboni pestilenziali .

\_\_\_\_\_ *putrida* , cancrene di tumori e di ferite .

\_\_\_\_\_ *rancida* fa risipole , e carie d'ossa .

\_\_\_\_\_ *biliosa* : pur risipole , e erpeti .

Finalmente ,

L'acrimonia degli *ulceri* , assorbita , cagiona febbre lenta e tumori metastatici .

La *savorra delle prime vie* sovente fa oftalmia , odontalgia , risipola , infiammazion di ferite e d'ulceri .

Da *error di luogo* nascono infiammazioni vere e spurie , o rossezze con e senza dolor e calore .

Da *ritenzion di materia traspirabile* , tumori sierosi , idrocele , reumatismi .

Da *ritenzion di feccia ineffinabile* , estension dell' intestino retto , intumescenza fuor dell' ano , emorroidi , oftalmia , e angina per congestioni di sangue verso il capo .

Da *ritenzion di latte* , mastodinia , infiammazione , indurazion di mammelle , tumori lattei delle stremità .

Da *ritenzion di sangue mestruo* , o *emorroidale* , nascono emorragie in varj luoghi , e tumori sanguinei .

Da *ritenzion di seme* , spermatocele , sarcoccele , infiammazion di testicolo .

Da

- Da *troppa escrezion di sangue*, la morte,  
o tumori edematosi.
- Da *escrezion di siero, di marcia*, o di *linfa*, viene febbre etica, confunzione  
o tabe, morte.
- Da *escrezion di seme*, ambliopia, cecità,  
gonorrea femminile.
- Da *estrazione di sangue*, ecchimosi,  
aneurisma spurio, trombo.
- Da *estrazione di siero*, edemi, tumori  
sierosi, idropisie.
- Da \_\_\_\_\_ di *linfa*, tumori linfatici.
- Da \_\_\_\_\_ di *aria*, enfisemi.
- Da *metastasi di materia morbosa* nascono  
tumori metastatici, o critici.
- Da *congestione* o moto di sangue violento  
a qualche parte, emorragie, oftalmie,  
amaurosi.
- Da *stagnazione di umori* nasce putredine,  
o degenerazione varia dell'umor sta-  
gnante, come si vede ne' tumori ci-  
stici e idropici. Da stagnazione d'ori-  
na viene la pietra.
- Da *secessione di principj* si fanno varj mor-  
bi: da secessione d' *acqua*, edemi o  
idropisie; da secessione d' *olio*, lipomi  
o grassiezza; da secessione di *chilo*, tu-  
mori lattei; da secessione di *terra*,  
calcoli, o tumori terrej; da secessione  
di *glutine*, tumori edematosi. Da se-  
crezione di *succo nutritivo* nascono  
sarcomi, e polipi.

## CAUSE ECCITATRICI DE' MORBI.

Sono condizioni , che eccitano le cause prossime , o sono cause delle cause prossime .

Le *frequentissime* cause *eccitatrici* de' morbi sono sei , alle quali sogliam dare nomi di *cofe naturali* o *non naturali*, come ,

1. *Aria.*
2. *Cibo e bevanda.*
3. *Moto e quiete.*
4. *Sonno e veglia,*
5. *Cose efcrette , e ritenute.*
6. *Patemi dell'anima.*

## A R I A

L'aria atmosferica , che circonda il nostro corpo , generalmente irrita , infiamma , corrompe , o subitamente disecca tutte le parti prive d'epidermide . Quindi ella nuoce alle ferite , agli ulceri , all'ossa nude . In oltre , può l'aria avere peculiari vizj , co' quali ella crea i morbi .

1. L'*aria calda* rarefa gli umori , relassa i solidi , rende troppo irritabile il sistema nerveo , dispone a putredine la bile e gli altri umori . Quindi , dal calor dell'aria , gran suppurazione di ferite , cancrena , esclusione  
di



di vermi, carne fungosa, tetano o incordatura.

2. L'*aria fredda* condensa gli umori, contrae i solidi; la *materia glaciale* converte in diaccio i nostri umori; quindi pedignoni, cancrena, sfacelo delle parti congelate, principalmente se a queste si dà calore. Il freddo, ammesso alla ferita, impedisce la suppurazione, e talora causa tetano.
3. L'*aria secca* impedisce colla sua fici-tà la guarigione d'ulceri e ferite, o la ritarda; produce oftalmie e angine.
4. L'*aria umida*, impedendo la traspirazione cutanea e rilassando i solidi, causa oftalmie croniche, dolor di denti, e tumori reumatici.
5. L'*aria piena di particelle eterogenee*, quì appartiene, massime l'aria putrida e polverosa.
6. *Aria putrida*: tale diventa l'aria degli ospedali per la traspirazione putrida de' malati, o per l'esalazione d'ulceri putridi, massime cancrenosì. Bene spesso le ferite si fan cancrenose in aria putrida. Quindi ne' putridi spedali muojono quasi tutti coloro che s'incidono o trapanano.
7. L'*aria epidemica*, la quale covi certe sozzure, fa bubboni pestilenziali, carbonchj, e talvolta angina cancrenosa.
8. L'*aria polverosa* fa rossi gli occhj, e sovente angina e raucedine.
9. L'

9. *L'aria ventosa*, o *l'vento*, disecca l'epidermide ; quindi screpolatura di labbra. Pel vento, principalmente in città popolose, avvengon molte e gravi ferite di capo da tegole cadute dalle case.
10. *L'aria tolta via*, come adiviene sotto la tromba e sotto la ventosa, produce enorme intumescenza in parte o in tutto il corpo. Chi si annega, muore per mancanza d'aria.
11. *L'aria per fetore od acre esalazione* è nociva agli occhi, e induce oftalmia: da esalazione d'acqua forte si è osservata la cateratta. L'aria *mercuriale* in una camera di salivanti ha mosso negli scorbutici una pessima salivazione ed altri sintomi.
12. *Aria sviluppata dalle nostre parti*: L'aria delle nostre parti solide e fluide si sbratta per putredine; quindi l'enfisema di parte cancrenosa, e l'intumescenza di cadaveri.
13. *Aria insinuata nelle nostre parti*. Così l'aria gonfiata in ferite anguste rende enfisematoso il corpo tutto. Così pur l'aria, scappata nella tela cellulosa dai polmoni lesi per rottura di costa, fa enfisema di tutto il corpo.

## CIBO E BEVANDA, O MATERIE INGESTE.

Così chiamansi tutte quelle cose, che a titolo di *cibo, bevanda, medicamento, o veleno*, s'introducono per bocca nelle prime vie.

I cibi ingesti recano morbi, o per *quantità*, o per *qualità*.

La quantità è *eccedente*, o *deficiente*.

L'*eccedente quantità di cibi* produce chilo mal elaborato: quindi per la troppa voracità nasce troppa suppurazione di ferite e d'ulceri, o marcia cattiva, carne fungosa, infiammazion di ferita.

In donne di parto la voracità cagiona deposizioni di latte nelle estremità, o intumescenza e infiammazion di mammelle. In ferite di ventricolo e d'intestini la sola voracità può dar morte, e negli erniosi far incarcera-  
zione.

La *deficiente quantità di cibi*, ossia il digiuno, rende putridi gli umori; quindi alle volte mala suppurazione di ferite ed ulceri, cancrena, morte. E la troppo rigorosa dieta rende insana-  
bili le fratture.

La *qualità delle cose ingeste* può aver i suoi vizj.

1. Le cose *spiritose* fanno *congestion* nel capo; quindi in ferite di capo, e in  
con-

commozione di cerebro, sono nocive. Il lungo uso di spiriti ardenti indura le glandule, e tanto strigne l'esofago, che ne divien impossibile la deglutizione.

2. Le  *cose grasse* , rilassando le prime vie e 'l peritoneo, dan motivo a ernia. Corrotte nel ventricolo generano favorra rancida, dalla quale il chilo rancido portato nel sangue infetta l'adipe e 'l midollo dell'ossa, onde poi infiammazioni, rispole, erpeti; ulceri maligni, cancrena; spina ventosa.
3. Le  *cose glutinose*  fanno nelle prime vie una favorra glutinosa e insieme infortita, dalla quale il chilo glutinoso e infortito passa nel sangue. Quindi ostruzioni di glandule, tumori d'articolazioni, anchilosi spurie, edemi.
4. Le  *cose false*  producono acrimonia muriatica e scorbutto.
5. Le  *cose alcaline*  solvono la gelatina del sangue; quindi insanabilità di ferite, ulceri e fratture; per la tenuità del sangue, varie emorragie e livide macule.
6. Le  *cose acide*  generano prurito, morbi cutanei, mollizie d'ossa, e rachitide.
7. Le  *dolci* , col lungo abuso, causano acidità d'umori; quindi denti neri, e rachitide negl'infanti.
8. Le  *acri ed aromatiche*  fanno infiam-

mazione di ferite ed ulceri; a *masticarle* lungamente, ne viene nerezza e carie di denti.

9. Le *flatulente* fanno sovente agli erniosi incarcerazione d'ernia.

10. Le *frigide*, non di rado, causano angina catarrale, e dolor di denti.

11. Le *calide* causan fessure e nerezza di denti. Le *troppo calide* fanno ambustione di bocca, di fauci e d'esofago, la quale lascia una mortale angustia dell'esofago.

12. Le *venenate* producono varj morbi secondo la diversità del veleno. Così il pane di corrotta farina cagionò cancro secca in tutte le stremità. Da inghiottito arsenico si è veduta cancro di parti genitali.

13. Le *cose dispepte* ( non concotte, o mal digerite ) fanno cruda favorra; onde spesso incarcerazion d'ernie.

14. Gl'*ingesti corpi eterogenei* sogliono stare e ritenersi nelle fauci, o nella cardia, o nel piloro, o dintorno la valvola di *Tulpio*, o nell'esito dell'intestino retto. Per error di deglutizione si insinuano nella tuba *Eustachiana*, nello spiraglio delle laringe, nella trachea, o ne bronchj. Se in questi luoghi subito non soffocano il malato, apprestano infiammazione, ascesso, fistole, e maravigliosamente si fanno strada per uscire.

## ECCEDENTE MOTO DI MUSCOLI .

L' *ecceſſo del moto muſcolare* accelera il moto del ſangue ; quindi egli aumenta i tumori infiammati , infiamma i frigidi , nuoce a chi è ſoggetto a emorragia ; cagiona ſinovitura di ferita , ulcera , frattura , e luſſazione già incantucciata , e ne impediſce la guarigione .

Qui pure appartengono i *moti ſingolari* di certe parti , come ,

1. Lo *ſforzo* che ſi fa nel parto , nello ſcarico dell' alvo e dell' orina , nella lotta , ec. cagiona bronecocele , ernia , prolapſi , oftalmie .
2. La *gagliarda iſpirazione* , che ſi adopera nell' enfiamento delle tube , cauſa ernie e oftalmie .
3. Il *vomito* e la *toſſe* : queſta può cauſare roſſor d' occhj , ecchimoſi d' occhj , ernie ; quello , rottura d' eſoſago .
4. Lo *ſtarnutamento* può produrre ernie ; e ne' trapanati , eſpreſſione del cerebro dal luogo trapanato .
5. Lo *ſmoderato riſo* , può cauſare ſtruma di collo , congeſtione ſanguinea nel cerebro e negli occhj .
6. Da *gagliardo ſbadigliamento* può naſcere luſſazion di maſcella .
7. Da *vociferazione* , ernie ; dal *canto* , roſſor d' occhj , e angina .

8. Dal

8. Dal *salto*, frattura di gamba; lussazione o storta di piede, di ginocchio, di coscia; rottura di fegato; di milza o dell'aorta; commozion di cerebro; rottura del tendine d'Achille.
9. Da *cammino diuturno*, rigidità di ginocchia e anchilosi.
10. Da *divarificazione* o *spaccata di cosce*, ernia.
11. Da *portatura*, storta della spina del dorso; varici di gambe.
12. Da *alzar pesti*, dolor di fianco, ernie, polmoncele, prolapso.
13. Da *lotta*, storcimento di tendini e muscoli; rottura di ligamenti armillari, storta o lussazione di mano, dita, cubito, umero.

## EGCEDENTE QUIETE DI MUSCOLI.

Ne deriva anchilosi, e rigidità di ligamenti e di muscoli.

Qui si riferiscono le *singolari positure* di alcune membra, come,

1. Lo *stato* oltremodo strascicato causa edemi, varici e ulceri di gambe.
2. Il *sito inetto* procura curvature di membra, e gibbosità.
3. Il *sedere* fa lo stesso, e insieme rigidità di ginocchia.
4. La *genuflessione* diuturna produce lupia nel ginocchio.
5. Il *lungo decubito* causa infiammazione,

ne, escoriazione, e cancrena nell'osso coccige e nell'osso sacro; o nel calcagno; e calcolo nelle reni e nella vescita.

## VIOLENZA ESTERNA.

Le violenze solite a recar morbo sono,

1. La *scissura*, che fa ferita scissa.
2. La *puntura*, che fa ferita punta.
3. La *contusione*, che causa ecchimosi o ferita contusa:
3. Il *morso*, col quale si dà ferita contusa:
5. La *rottura*, con cui sovente le membra tutte si svegliano da' lor articoli.
6. L'*amputazione* o taglio fatto con coltello o con palla da schioppo ec. induce difetto di membro.
7. La *caduta*, massime da luogo alto, fa lussazioni, fratture d'ossa, contrizioni di parti molli, e commozion di cerebro o della midolla spinale.
8. La *palla di cannone*, che *passa allato*, benchè non tocchi la parte, rompe l'ossa, le sloga, brustola le parti molli o vi fa ecchimosi, e commuove il cerebro.
9. La *palla di cannone*, che *tocca la parte*; per lo più la porta via, e di rado solamente la converte in una molle poltiglia carnea.
10. La *palla di scbioppo*, *scagliata nel nostro corpo*, ne passa mezza o tutta la



la parte, o soltanto la tocca. Quindi la varietà delle ferite e contusioni da simili palle.

11. Il *bucar con succhiello* fa forame lacero.

12. Il *grattare* fa escorazione sanguigna, poi purulenta, massime ne' cachetici, e nelle gambe de' vecchj.

13. Alla *tritura* si riferisce l'escorazione della palma della mano per *fatica*, o della pianta del piede per *viaggio*, e quella delle cosce per *cavalcata*; come pur. l'escorazione cruenta delle papille pel violento *succiar* dell' infante.

14. *Estension della parte*. Ella è *subitana* o *lenta*. Coll' estensione subitana si fa gran dolore, e lacerazion di vasi e nervi; indi ecchimosi, infiammazione, tetano. L'estension lenta si porta spesso senza gravi sintomi; ma se la causa estendente subito si leva, come l'acqua nell' idrocele, nell' edema, nell' ascite, sovente ne vien cancrena, o effusion di sangue.

15. La *contorsione* di membro causa lussazioni, fratture, e ecchimosi ne' rotti vasi.

16. La *compressione* di una parte intera fa cancrena; la compression dell' arteria fa aridore; la compression della vena fa edema; la compression del nervo produce paralisi, e aridore.

PARTE II.

C

17. La

17. La *commozione* è una violenta concussione di tutto il corpo, o soltanto di una parte. Così in un salto violento da grande altezza si commuove tutto il corpo; da contusion di capo il capo solo commuovesi. Quindi dal commosso cerebro seguono varj sintomi: come vomito, e abolizion de' sensi interni ed esterni; fordità, da commozion dell' orecchio; cecità, da commozione d' occhio.

## COSE ESTERNAMENTE APPLICATE.

Quì si riferiscono,

1. Le *vestimenta*, che o per la compressione, o per la materia di cui sono fatte, nuocono.

Il capo coperto di *bende pellicciate* si scalda troppo; questa copertura vi fa congestion di sangue; e propaga i pidocchj.

Il collo con *collaro* troppo stretto causa rossor d' occhj, ed emorragia di nari.

Il petto compresso da *busti malfatti* causa gibbosità, escoriazion d' ascelle, intumescenza di braccia.

Le gambe per *calzini di lino* stretti contraggon ulceri, e

I piedi per *iscarpe* anguste o troppo larghe acquistan calli.

2. *Fascie* mal applicate. Le parti, infiam-

fiammate da fasce troppo strette , si fanno in cancrena e sfacelo . Ciò di spesso nelle fratture osservasi .

3. *Veleni* esternamente applicati . Così da arsenico o solimato sparso nelle ulcere si è veduto farsi cancrena nella parte, e venirne la morte . Da morso di vipera venenosa segue cancrena nella parte, enfisema, non di rado la morte; e da morso di cane rabbioso , idrofobia . Da unguento di radice di giusquiamo , applicato all'ano, proviene il delirio delle streghe .
4. Il *contagio* è materia morbosa , che dal corpo del malato passa nel corpo di uomo sano . Simil *veleno* si osserva nel canchero , nel malfrancese , nel carbonchio , nella peste .
5. *Medicamenti incongrui* . Così da rancidi unguenti le ferite recenti degenerano in ulcere cacoeti . Da' calidi , applicati al pedignone , nasce cancrena; da' pingui , applicati alla risipola , viene un ulcere sordido o cancrenoso .
6. *Insetti* . Alcuni col lor morso , come le vespe e le zanzare , eccitano infiammazione larga , o tubercoli infiammativi : i pidocchj generano *ftiriasi* o morbo pedicolare : le *mosche carnarie* soglion deporre le sue larve nelle ferite ed ulcere . La *furia infernale* perfora la cute , e può creare

dolori enòrmi e morte . V. la mia *dottrina de' morbi cutanei*.

7. *Le cose aliene introdotte nel corpo irritano*, e perciò fanno infiammazioni e suppurazioni, colle quali sovente in guisa maravigliosa si fanno strada ad uscire .
8. Il *freddo* o la *materia glaciale* fa pedignoni . V. *Morbi per aria frigida*.
9. Il *fuoco* produce infiammazione, suppurazione e cancrena: il fuoco secco fa cancrena; il fuoco umido, come l'acqua bollente, fa vesciche piene di acqua o cancrena umida .
10. Il *fulmine*, che sembra essere fuoco elettrico concentrato, fa maravigliosi abbruciamenti, lacerazioni, fratture d'ossa, commozioni di cerebro e di nervi, e spesso dà anche morte senz' apparente lesione esterna o interna.
11. La *troppa luce*, ferendo la retina, fa ambliopia e amaurosi.
12. *Raggj del sole*. Da forte soleggiamento nascono lentiggini, esfelidi, e a mano a mano gran bolle nel viso .
13. *Suono*. Da forte suono di sparato cannone ho veduto nascere dall' orecchio un profluvio di sangue, difficoltà d' udito, e sordità. Il suono ingrato allega i denti.
14. L'*odor grave* produce rossore e infiammazion d'occhj.

## DEGLI ARTIERI.

Le *fonti* de' morbi degli artieri sono ,

1. La *materia* , che l'artefice adopera , colla quale egli si sporca , e sporca anche l'aria che lo circonda .
2. Le *positure* , i *movimenti* o le *manipolazioni* , di cui si serve l'artista nella sua opera .

I *rustici* e gli *ortolani* per tutta la state esposti al sole ardente ne contraggono faccia nera ed esfelidi . Per l'*assiduo* lavoro manuale si fa *collosa* la palma della mano . Se il rustico ha *panereccio* alle dita , e se non si fa subito profonda incisione , spesso ne viene cancrena , o carie delle falangi digitali ; poichè l'epidermide crassa e callosa preme violentissimamente le parti gonfie di sotto all'ossa ; quindi , compressi e nervi e vasi , fatti cancrena , ed anche carie per l'inclusa marcia .

I *letterati* , per l'oggetto bianco , com'è la carta , si fanno *miopi* .

I *medici* e *chirurghi* , per la conversazione co' malati , van soggetti a' morbi *contagiosi* .

I *saggiatori* , per la fusione de' metalli , diventano *caliginosi* , e per la probazione del ferro , estinguendolo in acqua , *amaurotici* .

I *cerussarj*, che solvono il piombo con vapor incarcerato di aceto; sono presi da *contrattura* di dita, mani, braccj e finalmente di tutto il corpo con *artritide* fissa.

I *cupraj* o *ramieri* sovente acquistano coll'andar del tempo *capelli e denti verdi*, e comunemente diventan *sordastri* pe' colpi di martello.

I *fabri* parimente pe' colpi di martello son *sordastri*; *rigidi e erniosi* per gli pesti ch' e' levano; *lippi e ciechi* pel fuoco violento e lucido.

I *calibearj*, o lavoratori d'acciaro, col lungo seder alla fucina spesso diventan *caliginosi*.

I *cavatori di mercurio* hanno denti *vacillanti e caduchi*.

Gli *jatrapti*, o fabbricatori d'unguenti, sentivano anticamente *tremor di mano*; perciò adesso i chirurghi ordinano unzioni mercuriali agli stessi infermi venerei.

I *doratori*, nell'amalgamazione, con cui copron l'argento, pel fuoco ascendente dal mercurio diventan *paralitici*, *sordi e mutti*.

I *fonditori di lettere* pel fumo d'antimonio e di saturno patiscono di *stupor e contrattura di mani*.

Gli *scarpellini*, per la polvere lapidea che lor entra negli occhj e nell'orecchie, van soggetti a *oftalmia e cofosi*. Una

ve-

vescica sospesa nelle lor botteghe , e chiusa con arte , spesso contiene una manata di polvere , onde si vede che questa polvere è penetrantissima .

Gli *stuccatori* o *calcarj* ; ch' estinguon la calce , hanno *labbra ulcerose* , e *mani rugose* , ma non mai scabbiose .

I *figuli* o *vasaj* , che calcinano il piombo per la vetrificazione , patiscono *contrattura* di mani , e diventan *reumatici* nelle mani e ne' piedi per l'argilla frigida ch' e' calcano .

Chi lavora alle saline è *scorbutico* e *lippo* .

I *suochi* , pel fuoco , tendono a *ambliopia* , e finalmente divengon *ciechi* .

I *foricarj* o *nettaceffi* sono quasi tutti pel sommo fetore *lippi* e pressochè *ciechi* , e pel dolor degli occhj appena posson lavorare quattr' ore del giorno ; si metton poi a sedere per tutto 'l giorno in luogo scuro , lavandosi gli occhj con acqua tepida . Imperciocchè sì corrosivo è quel fetore , che se ne fan neri i vasi d'argento e di rame in modo ch'è difficile il nettarli . Quindi si vede perchè un otinale impuro sia tanto nocivo agli occhj .

Le *lavandaje* , per l'odor nocivo del ranno son *lippe* ; per lo stare nell'acqua hanno *edema* ; pel calor e freddo alternativo delle dita , *paronichia* , e pel sapone , *screpolature di mano* .

*Chi fa candele* , è soggetto a *lippitudine* dal pessimo fetore del sevo liquefatto .

*I mugnaj* diventan *sordastri* per lo strepito delle ruote e per la farina volatile .

*I pistori* , per la farina volatile , diventan *rauci* , e hanno ordinariamente le *mani più grandi* , perchè l'esercizio ingrandisce le membra .

*Chi lavora di capelli posticcj* , si fa *caliginoso* per la polvere .

*I vagliatori* , per la polvere che s' alza dalla rossa biada , si fanno *caliginosi* , e dagli acari della farina contraggono *fiiriasi* e *scabbia* .

*I muratori* diventan *curvi* pel lavoro ponderoso , e han *dolor di schiena* e *dè cosce* pel dorso troppo affaticato : diventan *sciatici* , premuto dai pesi il sangue de' vasi minuti , ed *erniosi* per gli enormi pesi ch' egli alzano .

*I facchini* , pel corpo curvato sotto il peso , diventan *curvi* , e pel peso *erniosi* .

*I sartori* camminano con passo ambiante per gli piedi compressi sotto il sedere ; e sono *curvi* di schiena . Ma anche le fanciulle diventan *gibbose* , sedendo con la scapula distesa nell' imbastire all'arconcello le puntute frangie .

*I calzolaj* , pel corpo curvato , diventan *curvi* e *gibbosi* , e per le ginocchia piegate si fanno *zoppicanti* per la continua flessione . Costoro hanno braccio grosso , e robusti i muscoli del

tora.



torace ; perchè la fatica fortifica la corata .

I *lacchè* per lo più si fanno *erniosi* .

I *cavalcatori* diventan *calcolosi* per l'agitazione delle reni, *libidinosi* per la concussion delle parti genitali , ed *emorroidarj* pel fregamento e concussione dell'ano .

I *cantori* si fanno *erniosi* , come gl'infanti che molto urlano , e i musici che di fiato suonan il basso : per la vociferazione diventan *rossi* gli *occhj* ; per la fatica della laringe , ne vien *raucedine* e *angina* .

I *santesi* dell' *India* , che proclamano le creature a tutta voce , per lo più diventano *ciechi* .

Chi *lavora* o *sta sempre in piedi* ( come anche i *ciamberlani regj* ; e gli *aruspicj* degli *Antichi* , i quali stavano in piedi tutto il giorno ) ha piedi *varicosi* , poi *edematosi* .

Gli *artefici sedentarj* ( così pure i *letterati* ) divengon *emorroidarj* per costipazione dell'alvo , come anche per l'angolo retto de' vasi iliaci sotto il sedere .

Tutt' in somma quegli arteri , che a fetida atmosfera si espongono , son *lippi* e *cachetici* : in essi le ulcere difficilmente perciò si curano .

## PATEMI DELL' ANIMO.

Sono idee impresse con somma violenza nell' animo , alle quali succedon nel corpo movimenti involontarj .

Accoglie queste idee non già l' *adiaforia* ( indifferenza ) ma bensì il somm' odio o *gaudio* . Quindi i patemi d' animo si dividono .

in *grati* , giusta il nostro desiderio , come *gaudio* e *amore* :

in *ingrati* , per cui abbiamo aversione , come *ira* , *odio* , *invidia* , *tristezza* , *timore* , *terrore* , *pudore* .

1. Il *gaudio* accrescendo il moto del sangue nuoce alle parti infiammate e dove l' arteria maggiore è lesa : per troppa allegrezza si può morire .
2. L' *amore* o *desio di venere* , in entrambi i sessi , causa congestion di sangue verso le parti genitali . Quindi egli può fare o aumentare l' infiammazione o spermatocoele della verga e de' testicoli .
3. L' *ira* accrescendo il moto del sangue può fare più veemente l' infiammazione della ferita , l' emorragia da questa , e la febbre vulneraria . Il morso d' uomo animale irato indusse rabbia con idrofobia . L' ira corrompendo la bile suol eccitar risipole .
4. La *tristezza* inducendo imbecillità di  
ner-

nervi e di vasi produce scirri e tumori edematosi.

5. Il *timore* fa subito lasse tutte le fibre muscolari; quindi per risoluzione degli sfinteri cagiona pisciatura involontaria: per timore, il malato, che s'accorge dell'imminente operazione patisce deliquj d'animo, e dopo l'operazione gli si fa maggiore l'infiammazione della ferita.

6. Il *terrore* produce spasmi di muscoli, quindi particolarmente ne' feriti può causar tetano: contratti per lo terrore i vasi, per lo più avviene poca emorragia sotto le operazioni chirurgiche, la quale spesso comincia a farsi vedere alcune ore dopo l'operazione. Non di rado il terrore produce scirri, o li converte in canchero. Il terrore può anche rendere *mortali per accidente* leggieri ferite, essendosi veduti uomini morti di lievissima ferita per mero terrore.

7. Il *pudore* fa arrossire le guance; quindi fa congestion di sangue nel viso.

## IMMAGINAZIONE DI DONNA GRAVIDA.

Non è ancora deciso, se la violenta immaginazione della gravida possa produrre un nevo nel feto. Non credo, che per forza d'immaginazione si pos-

fa fare una nuova formazione di parti organiche non preesistenti, o l'abolizion di quelle già formate; comechè non possiamo negare tutta la forza dell'immaginazione sopra il feto. Pare, che i nervi si formino da preternaturale evolucion dell'embrione.

## TROPPO ESERCIZIO DE' SENSI.

L'esercizio de' sensi *esterni* o *interni* può peccar di *ecceſſo*, o *diſetto*.

Ogni troppo esercizio del cerebro, come succede in istudio forte, fa debolezza di nervi, e congestion di sangue al cerebro. Quindi nuoce in ferite di testa, e in mal d'occhj.

Il troppo esercizio dell'*organo sensorio* lascia debolezza nell'organo, e vi fa congestion di sangue. Così da *vista* troppo intensa nasce debilità di vista, rossor d'occhj, e amaurosi. Da lungo udito di suono troppo strepitoso diventiam sordastri.

## S O N N O,

L'*eccedente* sonno relassa le fibre, e induce pituitosa diatesi di umori; e perciò dispone a edemi.

## V E G L I A.

Le veglie troppo lunghe nucono agli occhj, i quali perciò si fan rossi.

FOR-

## FORZA DIVINA.

E' antica opinione di quasi tutt' i popoli ,  
che da Nume irato provengano mor-  
bi dannaggiosi . Ma dura cosa è fare  
Dio , ch'è sommamente buono , e che  
cerca la salute di tutti , *generalmente*  
autore de' mali .

## FORZA DIABOLICA O DI MAL'IA .

E' mera favola , che si diano *maghi e stre-  
ghe* , che per patto fatto col diavolo  
possano a lor talento produr morbi  
nella gente . I morbi , che talvolta si  
fanno da persone malevole , non pro-  
cedono che da veleni ed arti naturali .

## MORBI PREVENIENTI ESTERNI .

Così da ferite o ascessi nasce per lo più la  
fistola , e da risipola la cancrena .

## MORBI PREVENIENTI INTERNI .

Per lo più i morbi interni depongono la  
materia loro a varj luoghi esterni ,  
onde nascono varj tumori critici o  
metastatici .

CAU.

## CAUSE PREDISPONENTI DE' MORBI.

**F**REQUENTISSIME cause di morbi sono predisponenti.

### MALA EVOLUZIONE DELL' EMBRIONE.

La *svoltatura dell' embrione*, ancor esistente nell' utero, dà occasione a varj morbi organici, in quanto ella sia troppo primaticcia, o troppo tarda, o erronea. Quindi nascono deformità, e macule o nevi.

### TEMPERAMENTO.

Il *temperamento* è una peculiar costituzione in rispetto agli umori. Qui dunque appartiene,

1. Il *temperamento sanguineo*, in cui abbonda il sangue: indi infiammazioni vere e spurie, o emorragie.
2. Il *temperamento flemmatico*, in cui abbondano il siero e il muco; indi tumori edematosi e acquei.
3. Il *temperamento colerico*, in cui abbonda la bile; indi risipola, erpete.
4. Il *temperamento malinconico*, in cui il sangue nereggiante è spesso come pece;

pece ; onde scirro e carcinoma atrabilario.

5. Il *temperamento grasso* , in cui l'olio da per tutto abbonda ; indi suppurazion facile .
6. Il *temperamento gelatinoso* , in cui la gelatina abbonda in tutti gli umori ; come nel feto e negl' infanti : onde nervi ed escrescenze .
7. Il *temperamento spiritoso* , nel quale abbonda il liquido nerveo ; onde facilmente nascono spasimi e convulsioni da ricevute ferite .
8. Il *temperamento cacochimico o cachectico* , dove gli umori sono infetti di certa acrimonia , o patiscono discrasia .  
V. *acrimonie e discrasie* .

### IDIOSINCRASIA.

Ella è la propria costituzione di ciascun corpo , per la quale un uomo si porta diversamente dagli altri uomini rispetto a certe cose esterne . Quì appartiene la lipotimia a veder una ferita od un gatto ; e l' infiammazion di cute all' applicazion di quel medicamento , che la cute d'altri uomini soffre senza danno .

### ABITO DI CORPO .

Egli è la peculiar costituzione del corpo in rispetto alle parti solide . Quì si riferisce ,

1. L'

1. L' *abito sensibile* , in cui è molto *sensibile* il sistema nerveo , e molto *irritabile* il muscoloso . Quindi infiammazion facile , e ne' feriti facile tetano o convulsione .
2. L' *abito insensibile* , in cui il sistema nerveo è *poco sensibile* , e i muscoli *poco irritabili* ; come ne' flemmatici e malinconici .
3. L' *abito robusto* , in cui le fibre sono forti ed elastiche ; come ne' viri e ne' rustici .
4. L' *abito debile* , in cui le fibre son tenere , come negl' infanti .
5. L' *abito rigido* , in cui le fibre già sono rigide , come nei vecchj e ne' decrepiti .
6. L' *abito molle* , in cui le fibre sono molli , lasse , poco elastiche ; come nelle femmine e negl' infanti .
7. L' *abito macilento* , dove le fibre sono forti e senza molta tela cellulosa .
8. L' *abito pingue* , dove le fibre son molli e involte in molta pinguedine .
9. L' *abito morbofo* ; lo stesso che il *temperamento cacochimico* .

## E T A'.

Ogni età dell' uomo ha i suoi proprj morbi .

1. L' *età infantile* : I morbi . che da questa si stimano provenire , sono le afte ( mal di bocca ) ; la ranella ; infiamm.



fiammazione o esulcerazione di bellico; idrocele; ernia umbilicale o inguinale; scabbia di testa; crosta lattea; intertrigine, avvenimenti d'orecchie o d'occhi; prurito o infiammazione di gengie; dentizione difficile; spina ventosa; scrofole.

2. *Età giovanile*. Per lo moto di sangue abbondante verso il capo si osservano, in questa età, l'emorragia di nari, l'angina sanguinea, e le rossezze degli occhi; e circa il tempo di *pubertà*, carnosità e sarcocoele.

3. *Età virile*. Questa produce incomodi emorroidali, calcoli, podagra.

4. *L'età senile*, per la rigidità di tutte le fibre, per gli umori acri e terrestri, induce rigidezza di articoli; gibbosità della spina del dorso; gravità di udito; debolezza di vista, o cecità; fragilità d'ossa; e fa degenerare in ulceri cacoeti le ferite e le contusioni, massime nella tibia.

## S E S S O.

Il  *Sesso mascolino* patisce malori particolari nelle parti genitali, come, ernie scrotali vere e spurie, finosi, parafinosi, infiammazioni e induramento di testicoli, pararchidio.

I morbi del  *Sesso femminile* dipendono da diverse cause; dalle parti genitali, dalle mammelle,

me , e dalle azioni proprie a questo sesto , cioè , dalla menstruazione e dal parto . Nelle *parti genitali* , prolapsò , rottura d' utero o di perineo ; nelle *mamme* , mastodinìa , infiammazione , induramento , canchero .

## STRUTTURA DELLA PARTE .

Ogni parte del nostro corpo è disposta , più che altra parte , per la *sua fabbrica* , a malori peculiari . Così lo scirro è frequentissima infermità delle glandule , come lo è della membrana adiposa l' ascesso ; così per pinguedine e putridità dell' intestino retto sovente nascon fistole nell' anno .

## SINTOMATOLOGIA ,

O V V E R O

D O T T R I N A

DE' SINTOMI DE' MORBI.

**IL** *sintomo* è l' effetto o fenomeno del morbo .

Dunque ogni sintomo di morbo è lesione delle azioni del nostro corpo , o lesione di qualità visibili in qualche parte del nostro corpo .

Ri-

Rispetto all'origine si dividono i sintomi in

1. sintomi *del morbo* , che nascono dal morbo stesso ;
2. ——— *della causa del morbo* , che nascono dalla causa del morbo ;
3. ——— *de' sintomi* , che nascono da' sintomi del morbo ;
4. ——— *epigenòmeni* , che da sopravveniente nuovo morbo derivano .

Dal tempo dell'apparizione si dividono i sintomi in

1. sintomi *precedenti* , che precedono il morbo ;
2. ——— *concomitanti* , che accompagnano lo stesso morbo ;
3. ——— *susseguenti* , che seguono il morbo già finito .

Finalmente dalla sede si dividono i sintomi in

1. sintomi *propri* , che sono propri del morbo ; detti anche *patognomici* e *caratterici* ;
2. sintomi *comuni* , che a più morbi sono comuni ;
3. ——— *pericolosi* , che metton a ripentaglio la vita ; e
4. ——— *non pericolosi* , che non metton in pericolo la vita .

## SINTOMI ESTERNI.

Esterni sintomi de' morbi sono le lesioni di qualità visibili .

Qui si riferiscono quasi tutti i malori  
ester-

esterni che posson essere sintomi d'altro morbo esterno.

**Dolore** . Un'ingrata sensazione in qualche parte è sintomo d'infiammazione , di carcinomi , di tumori reumatici , di spina ventosa , di ferite , nell'atto di riceverle , massime di nervo leso , e talvolta di ulceri .

**Anodinia** , o assenza di dolore . L'insensibilità della parte sensibile , quando dovrebbe dolere , è sintomo di cancrena , di nervo legato o tagliato , o compresso .

**Calore** . La sensazione di ardore in qualche parte è sintomo d'infiammazione , e di nervo leso .

**Freddo** . La sensazione di freddo in qualche parte è sintomo di sfacelo .

**Colore morbofo** : E' vario il color preternaturale: il *lividore* è sintomo d'ecchimosi , d'aneurisma spurio , di varici , di cancrena e di sfacelo : si osserva la *nerezza* nella necrosi , la *rossezza* nell'infiammazione , il *pallore* nell'edema .

Il *fetore* è sintomo di ulcera cancerosa , putrida , o cariosa , e di cancrena . Qui pur appartiene il *fetor della bocca* per dente carioso , per tartaro di denti , per iscorbuto di bocca , per carbonchio di lingua . Il *fetor d'orecchj* viene da ulcera , quel delle *nari* da ozena , quel delle *parti genitali* da incontinenza , d'orina e d'alvo .

*Prin-*

*Prurito* . La sensazione che sforza a grattare è sintomo di acrimonia scabbiosa, di ulceri , e talvolta di fratture da lungo tempo legate .

*Durezza* . La consistenza *dura* è sintomo di scirro e di tufo : la *consistenza tesa* si osserva in tumori infiammati , *durissima* nell'eflostosi .

*Mollizie* . La consistenza molle è sintomo di meliceride : la consistenza *pastosa* si osserva nell'edema e nella cancrena ; l' *elastica* , ne' tumori sierosi e nella enterocèle ; la *fluttuante* , nell'ascesso .

L' *intumescenza* è sintomo di tutti gli umori e *calidi* e *frigidi* .

L' *aridore* è sintomo di arterie lese e di lesi nervi principali di qualche membro, di qualche dito ; di spinà ventosa e di lussazioni non riposte .

L' *infiammazione* è sintomo di ferite, d'ulceri, fratture, lussazioni, contusioni .

L' *enfisema* è sintomo di ferite , di cancrena, di frattura di coste , di morso di vipera velenosa .

L' *eritema* o rossore è sintomo di ulcere antiche , di pericranio leso , di carie occulta .

L' *oftalmia* è sintomo di quasi tutt' i morbi oculari , e di lesioni di capo . Il *rossor* degli occhj , sopravveniente al leso cerebro nel settimo o ottavo dì , indica cerebro suppurato , e morte .

Il *rossor* degli occhj in canchero di mamma , o d'altro luogo , indica essere già dispersa per tutto il corpo la virulenza cancerosa .

La *cancrena* è sintomi di nervi molto contusi , di frattura stritolata , di lussazioni di vertebre , di morso di vipera velenosa , d'arteria o nervo principale tagliato , di certe ferite , ulcere , tumori , ernie .

La *suppurazione* è sintomo di ferite contuse , di ulceri , e di certi tumori , come flegmoni , e furuncoli .

*Gravità* . La gravità maggiore è sintomo di tumori indurati , e infiammati .

*Levità* . La natural levità maggiore si osserva nell' enfisema .

La *siccità* è sintomo di oftalmia secca .

L' *umidità* è sintomo di oftalmia umida .

La *pulsazione* è sintomo d' infiammazione che va in suppurazione , e principalmente di aneurisma vero .

*Abolizion di polso* . Il polso abolito in qualche membro è sintomo di sfacelo , di arteria tagliata , compressa , o legata come si osserva dopo l'operazione dell' aneurisma .

Lo *strepito* d'articoli è sintomo di scorbutto , di enfisema , e di storta di mano e di piede .

L' *emorragia* è sintomo di ferite , d'ulceri scorbutici , putridi , e di canchero aperto .

L' *emor-*

- L' *emorragia delle nari* è sintomo di naso contuso, di cerebro commosso, di polipo fradicato.
- L' *emorragia delle orecchie* è sintomo di cerebro commosso.
- Stomacace*, o mal di bocca. Le gengie sanguinolenti sono sintomo di scorbutto gengivale.
- Il *flusso di linfa* è sintomo di vaso linfatico leso, e di tumor linfatico aperto.
- Il *flusso di siero* è sintomo di ferite recenti e di certi ulceri fungosi.
- Il *flusso di marcia* è sintomo di ulceri e ferite. La *corizza purulenta* è sintomo di ozena, e di morbo scrofoloso; il *flusso di orecchie* è sintomo di orecchio ulceroso, e di capo contuso.
- Il *flusso di sinovia* è sintomo di ferite penetranti, o di ulceri articolari.
- La *proctorrèa*, o flusso dell' ano, è sintomo di fistola interna dell' ano, e di emorroidi interne.
- La *contrattura* di muscoli e ligamenti è sintomo di fratture, ferite e tumori articolari.
- L' *atonìa*, o gran lassità di muscoli e ligamenti, è sintomo di storta, e talvolta di lussazione riposta.

# S I N T O M I

## I N T E R N I.

**S**INTOMI interni sono le lesioni d'azioni vitali, animali, o naturali.

### SINTOMI D'AZIONI VITALI.

**Q**uesti sono lesioni di polso, di moto del cuore, o di respirazione.

### SINTOMI DI POLSO.

**Il polso parvo, tardo, e intermittente,** è sintomo di emorragia interna o esterna, di cancrena, di morte.

**Il polso più frequente, e più auro,** è sintomo di febbre e d'infiammazione.

**Quì perciò appartengono i sintomi febbrili e infiammativi.**

### *Sintomi Febbrili.*

1. **La febbre infiammativa** è sintomo, che precede, accompagna o segue i tumori infiammativi. Sotto il nome di *febbre vulneraria* o *suppuratoria* viene il sintomo di ferite, di gagliarde contusioni, e di fratture complicate con infiammazione.

2. **Febbre putrida** è quella che viene da



da marcia putrida assorbita. Ella è sintomo di cancrena, e d'ulcero putrido o carioso. Nell'aria putrida degli ospedali i feriti e gli ulcerosi restan presi da febbre putrida più facilmente che i sani.

3. La *febbre biliosa* nasce da bile putrida, e perciò sovente accompagna la risipola, e sta co'feriti e con gli ulcerati.
4. La *febbre lenta*, per cui s'emacia il corpo, è sintomo di ascessi lungamente rinchiusi, di gran ferita od ulcera che ogni dì fa molta marcia, e principalmente di canchero e tumor linfatico aperto.
5. La *febbre intermittente*, la qual periodicamente ritorna ogni dì, o ogni due o tre giorni, non è sintomo di morbo esterno. Ma siccome i feriti hanno, per difetto di dieta, la febbre intermittente più facilmente che i sani, perciò ella è talora sintomo epigenomeno di morbo esterno.

### *Sintomi Infiammativi.*

1. *Frenitide*. Infiammazione delle membrane del cerebro, la qual si conosce dalla febbre infiammativa e dal feroce delirio. Ella è sintomo di capo contuso, o ferito, ed è anche effetto d'infiammazione d'orecchio, di veemente odontalgia, e di panereccio.

PARTE II.

D

2. *Ce.*

2. *Cefalite*. Questa infiammazione del cervello è sintomo di cerebro contuso, ferito, o compresso nel cranio.
3. *Cinanche*; infiammazion della faringe o della laringe. Ella accompagna i corpi eterogenei diuturnamente fermati nella laringe o nelle fauci.
4. *Pleuritide*, infiammazione de' muscoli intercostali e della pleura; sintomo che suol seguitare la contusion del torace, e le fratture di coste o di sterno.
5. *Peripneumonia*. Questa infiammazione di polmoni vien sovente dietro alle ferite di questa viscera, e a fratture di coste. Talvolta la cinanche passa in infiammazione di polmoni.
6. *Diaframmaticide*. Questa infiammazione del diaframma si accompagna con le ferite e contusioni del diaframma.
7. *Carditide*, infiammazione del cuore, e sintomo di ferite superficiali del cuore.
8. *Gastritide*, infiammazione del ventricolo; sintomo di contusioni e ferite di ventricolo; sintomo di gastrocele incarcerata, e anche di spilletto inghiottito.
9. *Enteritide*, infiammazione d'intestini; sintomo di contusioni e ferite intestinali, di enteroccele incarcerata, e d'inghiottiti corpi acuti.
10. *Epiploide*. Questa infiammazione dell'omento è sintomo di contusioni e

ferite omentali, di epiplocele incarcerata, e di omento scattato per ferita o compresso, o a posta legato.

11. *Epaticide*, o infiammazione di fegato. Ella è sintomo di fegato contuso, rotto o ferito, ed è anch' effetto di commozione e ferite di cerebro.

12. *Spleditide*, o infiammazione di milza. E' sintomo di milza contusato ferita; ed è talvolta effetto di ferite di cerebro.

13. *Nefritide*. E' infiammazion delle reni, e sintomo di rene contuso o ferito.

14. *Cistide*, o infiammazion della vescica urinaria. E' sintomo di vescica contusa, o ferita, e spesso d'iscuria, di litotomia aspra, e di costoccele incarcerata.

15. *Metritide*, o infiammazion d'utero. E' sintomo di utero contuso, ferito, o rotto nel parto; e anche di operazione cesarea.

16. *Miositide*, o infiammazione di muscoli; sintomo di contusioni, ferite, fratture, e amputazioni.

## SINTOMI DELLE AZIONI DEL CUORE.

1. *Lipotimia*, o *sincope*; cessazion apparente di tutte le azioni vitali. Ella è sintomo di emorragia interna o esterna, di cancrena; di ulcera vecchia,

nata; di cuore leso; di timore avanti il salasso o l'operazione del chirurgo.

2. *Alfissia*, o morte apparente; sintomo di persone impiccate, congelate, o sommerse, o nate di parto difficile.

3. *Palpitazioni di cuore*. Ella è sintomo di cuor leso, indi aneurismatico. A' malati palpita il cuore di paura sotto le operazioni chirurgiche.

## SINTOMI DELLA RESPIRAZIONE.

*Ortopnea*, respirazione soffocante. Ella è sintomo d'idrotorace; di empiema; di boccone mezz'inghiottito, o di corpo eterogeneo, fermato nell'esofago o nella trachea: di gozzo o struma magna nel collo; di ferite penetranti del torace con effusion di sangue o d'aria complicata; di leso polmone, diaframma, o nervo frenico; d'impresca cartilagine ensiforme; di ascite; di gibbosità.

*Empiema*. La marcia, che si scarica nella cavità del torace è sintomo di ascesso toracico, e di polmone leso o contuso.

## S I N T O M I

## D E L L E

## A Z I O N I A N I M A L I .

**Q**UESTE sono lesioni de' sensi esterni e interni, del sonno, e del moto volontario de' muscoli .

## SINTOMI DE' SENSI ESTERNI .

L' *amanrofi* ( cecità , gotta serena ) è sintomo di nervo superciliare lesa; di cerebro o occhio contuso o ferito; e di morbi de' seni frontali .

L' *ambliopia* ( oscurità d' occhio ) è sintomo di quasi tutt' i morbi oculari .

La *fotofobia* , o intolleranza di luce , è sintomo di oftalmia , massime interna .

La *còsofi* , sordità o difficoltà di udito , è sintomo di contusion d' orecchie , e di quasi tutt' i mali dell'organo uditorio .

L' *ageusia* , abolizion di gusto , è sintomo di lingua paralitica .

L' *anosmia* , abolizione di odorato , è sintomo di ozena , e di polipo .

L' *anestesia* , abolizion di tatto , od *insensibilità* , è sintomo di nervo sensorio tagliato via , legato , o compresso , o da cancrena distrutto .

Lo *stupore* , sensazione di tatto diminuito ;

è sintomo che precede alla cancrena ;  
e alla necrosi : nasce anche da nervo  
legato o compresso .

La *formicazione*, o senso d'informicolamen-  
to, è sintomo degli stessi mali che lo  
stupore .

### *Dolori e Sensazioni ingrate . . .*

*Cefalagia* ; dolor di capo : E' sintomo di  
contusioni del capo ; di tufo e carie  
nel cranio .

*Emicrania* ; dolore della metà del capo : E'  
sintomo d'oftalmia , di odontalgia , e  
di que'morbi che stanno ne' seni pitui-  
tarij dell'osso della fronte ,

*Pleurodine* ; dolor di torace non infiamma-  
tivo : sintomo d'empiema esterno , di  
torace contuso, di sforzo veemente .

*Cardialgia*, dolor di ventricolo: sintomo di  
gastrocele , d'impresca cartilagine enfi-  
forme, d'epigastrio contuso .

*Epatalgia*, dolor nella regione del fegato :  
sintomo d'intumescenze vescichetta del  
fiele, o di ascesso nel fegato .

*Colica*, dolor d'intestini: sintomo di ernia  
incarcerata, e di addomine contuso .

*Nefralgia*, dolor di reni: sintomo di cal-  
colo renale, il quale vievia per ascesso  
sbocca de' lombi .

*Isterlagia*, dolor nell'utero: sintomo di cal-  
colo, polipo, cancro, nascosto nell'  
utero o nella vagina .

*Ma*

*Mastodinìa*, dolore di mamma: sintomo di canchero o d'infiammazione, o di abbondanza di latte, nella mamma.

*Artride*, dolor di articolo: sintomo di tumori, ferite e ulcere articolari.

*Ostocòpo*, dolor nell'osso stesso: sintomo di spina ventosa, cancro, tuso, sarcofosti.

*Reumatismo*, dolor di muscoli: sintomo di precedente necrosi.

*Ansietà*, sintomo di morso di vipera velenosa.

*Lassitudine*, ingrata sensazione di debolezza: sintomo di persone ferite; di scorbuti; di morbi per contagio, come di malfrancese.

*Prurito*, sensazione che sforza a grattarsi; sintomo d'ulceri, di empetigine, e di fratture da lungo tempo non isfasciate.

*Freddo*: sintomo di emorragia, suppurazione, cancrena.

*Calore*: sintomo di febbre, che accompagna i tumori calidi.

## SINTOMI DE' SENSI INTERNI.

Sono depravazioni d'immaginazione, o abolizioni di memoria.

1. Il *delirio* è sintomo di emorragia magna, di cerebro lesò, e di gran dolore.
2. La *rabbia*, o desiderio di mordere, è sintomo di morso fatto da animale rabbioso.

3. *L'idrofobia*, grandissima avversione da ogni bevanda, è frequente sintomo di ferite fatte da cane rabbioso.
4. Il *tarantismo*, sfrenato desiderio di ballare, si dice sintomo prodotto da morso di tarantola. Ma non per anche si hanno prove, che una botta di tarantola faccia quell'effetto.
5. La *vertigine*, apparente girazione di oggetti, è sintomo di emorragia magna, e di cerebro commosso.
6. La *stupidità* è sintomo di lesioni di capo.
7. *L'amnesia*, dimenticanza di quasi tutte le idee, è sintomo di cerebro leso.

## SINTOMI DEL SONNO.

Il *sonno*, sonno appena eccitabile, è sintomo di cerebro occupato da sangue sparso o da impressione di cranio; d'idrocefalo interno; d'iscuria; e di ulcera subito disseccata.

La *tifomania*, sonno apparente con delirio, è sintomo di cerebro irritato da qualche lesione, ed accompagna eziandio il morso della scolopendra di *Martinita*.

L'*agripnia*, veglia immoderata, è sintomo di ogni idea ingrata, e di dolor vemente, massime notturno.

La *panofobia*, paura nel sonno, è un sintomo che suol accompagnare le fratture



ture d'ossa , l'idrocefalo interno, e 'l morso di cane rabbioso.

## SINTOMI DEL MOTO MUSCOLARE .

L'azione de' muscoli può peccare per ispasimo , paralisi , o depravazione .

Gli spasimi si dividono in *tonici* e *clonici* , cioè in *ispasimj* e *convulsioni* .

Gli *spasimi* sono contrazioni di muscoli involontarie e costanti: le *convulsioni* sono agitazioni di muscoli involontarie e reciproche .

### *Spasimi .*

Il *tetano* è una contrazione tonica de' muscoli di tutto il corpo , per la quale tutto il coreo sta disteso come statua di legno, o si curva in avanti, o indietro, o alla banda.

Egli è sintomo di lesa cerebro o muscolo temporale; di nervo contuso, legato, esteso, vellicato, o toccato con caustico. Quindi spesso vien dietro a contusion di capo; a ferite, ad amputazioni, a legature di funicolo spermatico, e a lussazioni complicate con articoli rotti, principalmente in uomini molto irritabili, in climi caldi, e in ospedali putridi.

Il *crampo*, spasimo della gamba, è sintomo di varici nelle gambe..

Lo *spasmo di mascella* è sintomo di angina tonsillare, e quasi anticorriere perpetuo di vicino tetano universale.

Lo *spasmo di faccia, o riso sardonico*, vien dietro a lesione di nervo diaframmatico.

### *Convulsioni.*

*Convulsione* è un'agitazione involontaria de' muscoli di tutto il corpo.

Ella è sintomo, che succede a ferite di cerebro e della midolla spinale; a punture di nervi; a emorragie magne; a dolori acerbissimi, come odontalgia, otalgia, calcoli, dentizione; a carie interna del cranio, o di vertebra; a spina bifida premuta con dito; e a idrocefalo interno. I feriti, esposti ad aria troppo fredda, vengono facilmente assaliti da tetano o convulsione.

Il *nistagma*, convulsione di palpebre e del bulbo oculare, è sintomo di oftalmia.

Il *trismo*, stridor di denti, è sintomo di dolore acerbissimo.

L' *epilessia*, convulsione perindica di tutto il corpo, è sintomo di esostosi o carie interna del cranio o della vertebra; di cerebro commosso; di ulcera antica subitamente sanata.

L' *orrore* è sintomo d' infiammazione, che principia, e va in suppurazione.

Il *tremore* è sintomo d' infiammazione, che  
di

di quel terrore in cui sono i malati e avanti e dopo l'operazione .

La *starnutazione* è sintomo di oftalmia catarrale, e di polipo spiccato .

L'*escitazione*, o badigliamento, è sintomo di oftalmia periodica, e di emorragia .

Il *singulto*, invita contrazione del diaframma con ispirazione sonora subitamente interrotta, è sintomo di emorragia, iscuria, cancrena, angina afosa; di ferito o contuso cerebro, diaframma, ventricolo o intestino; di ernia incarcerata, di vertebra rotta, di cartilagine enfiorme impressa .

La *tosse*, concussione di petto sonora, è sintomo di corpo eterogeneo caduto nella trachea; di marcia o sanie assorbita da ulcero e deposta ne' polmoni .

### *Paralisi.*

L'*apoplessia* è paralisi di tutt' i muscoli volontari con respirazione stertorosa e con sopore non eccitabile . Ella è sintomo di lesa cerebro, compresso da estravasazion di sangue o da impressione di cranio .

La *paralisi*, lascia immobilità di un membro, è sintomo di nervo tagliato, compresso, legato, o di cerebro commosso o compresso .

L'*emiplegia*, paralisi di un solato, destro o sinistro, è sintomo di cerebro commosso, o compresso .

La *paraplegia*, paralisi di tutto il corpo di sotto del capo, o paralisi delle membra inferiori, è sintomo di vertebra sconcia o rotta, e di midolla spinale lesa o commossa.

La *debilità* delle membra di tutto il corpo è sintomo d'idrocefalo interno, di spina bifida, di morso venenato, e di contagio qualunque, venereo, scorbutico, cancrenoso.

### SINTOMI DELLA VOCE.

L'*afonia*, impotenza di parlare, è sintomo di nervo recorrente laringeo tagliato, compresso; o troppo distratto, come nell'impiccato; di trachea o torace feriti; di lingua ascisa, o presa da tetano.

Lo *psellismo*, impotenza di ben pronunciare alcune sillabe, è sintomo di lingua deforme; di difetto di lingua, uvola, velo palatino, denti, labbro leporino; di palato fesso; di ranella; di capo contuso.

La *sacofonia* è insuavità di voce. La voce *nasale* è sintomo di polipo nasale; di ozena; di angustia de' forami postici del naso; di difetto dell'uvola. La voce *sibilante* è sintomo di angina poliposa e laringea. La voce *rauca* è sintomo di angina catarrale, corizza, uvola rilassata.

SIN.

## S I N T O M I

## D E L L E

## A Z I O N I N A T U R A L I.

**S**ONO lesioni di appetito, sete, masticazione, deglutizione, chilificazione, sanguificazione, nutrizione, secrezioni ed escrezioni.

## SINTOMI DI APPETITI NATURALI.

L' *anoressia*, appetito deficiente, è sintomo di grave dolore, di febbre vulneraria, di emorragia, di lesion del ventricolo, o della vescichetta del fiele.

Le *nausea*, fastidio di cibi, è sintomo di cerebro commosso.

L' *adipsia*, mancanza di sete, è sintomo di angina paralitica.

La *polidipsia*, gran brama di bere, è sintomo di feriti, d' infiammazioni, e cancrena.

La *satiriasi* è gran voglia di coito con libidinosa erezion di verga: sintomo di gonorrea virulenta, d' idrofobia, di impiccati, di cantaridi applicate.

L' *anafrodisia* è abolizion di libidine con impotenza di rizzare il membro: sintomo di trabocco su i lombi o sull'osso sacro; di testicoli indurati.

*Il tenesmo d' alvo*, frequente voglia di andar del corpo, è sintomo di calcoli; di vescica infiammata: o d' intestino retto infiammato; di emorroide dolorosa; di fistola dell' ano, massime dopo l' operazione.

*Il tenesmo di vescica*, o frequente voglia di pisciare, è sintomo di disuria. Vedi *disuria*.

## SINTOMI DI DIGESTIONE.

*Masticazione lesa*: sintomo di mascella slogata, o rotta: di denti vacillanti, mancanti, dolenti; di paralisi e tetano di mascella; di muscoli delle buccie e delle mascella feriti, ulcerati: di palato fesso; di labbro leporino, e di ranella.

*Deglutizione lesa*, o *disfagia*: sintomo di tetano, d' idrofobia, di esofago paralitico; di tumori situati dentro o fuori dell' esofago e lui comprimenti; di corpi inghiottiti, fermati nell' esofago; di esofago rotto; d' osso ioide slogato; di broncocele; di polipo esofageo, o pendente dalle nari alle fauci; di angina infiammatoria, suppurativa, scirrofa, venerea, scorbutica, edematosa, aneurismatica, paralitica, spasmodica, catarrale.

*Dispepsia*; o digestione de' cibi impedita o diminuita: sintomo di cattiva digestione;

ne; di ventricolo ferito; di ernia ventricolare e intestinale; di vescichetta del fiele ferita, e di dutto epatico ferito.

## SINTOMI DI SANGUIFICAZIONE.

*Cachessia*, o mala sanguificazione: sintomo di emorragia, di ulceri, di tutte le acrimonie, di scrofole, di scorbutto, di peste venerea, di necrosi e *dispesia*.

*Ittero*, o *cachessia biliosa*: sintomo d'ira, e di morfo di vipera od animal rabbioso.

*Anasarca*, intumescenza acquosa del corpo: sintomo di emorragia antecedente; di ulceri subito disseccati, o troppo scorrenti; di orina lungamente ritenuta.

## SINTOMI DI NUTRIZIONE.

*Tabes*, o estenuazione di tutto il corpo con febbre lenta, ma senza tosse, e senza purgazione di marcia. E' sintomo di ogni grand'ulcera; di scrofole, di canchero, di ernia ventricolare, di lesione del dutto toracico, e di antecedente emorragia magna.

*Erisi*, estenuazione di tutto il corpo con febbre lenta, tosse, e purgazione di marcia: sintomo di polmone contuso,

so , o suppurato da ferita ; di ulcere subito sanate , la cui materia si depone ai polmoni ; e di ascesso non aperto da lungo tempo .

## SINTOMI DI SECREZIONE .

Qui appartengono i profluvj , e le ritenzioni di secrezioni .

### *Profluvj sanguinei .*

*Emòptisi* , espettorazione di sangue spumoso : sintomo di polmon ferito , di torace contuso .

*Ematèmesi* ; vomito cruento : sintomo di ventricolo ferito , contuso ; di sanguisuga inghiottita .

*Èmaturia* , piscio cruento : sintomo di vescica o rene ferito , contuso , di peso alzato ; di calcolo della vescica ; di emorroidi .

*Metrorragia* , emorragia uterina : sintomo di utero ferito ; contuso ; di peso alzato ; di calcolo della vescica , particolarmente nelle gravide ; e di polipo uterino .

*Diarrea cruenta* ; sintomo di tubercolo emorroidale , di polipo e cancro intestinale .

*Flusso emorroidale* : sintomo di tubercolo emorroidale , di polipo e cancro intestinale .

*Præ-*



*Vomito*: sintomo di cerebr o commosso, di diaframma ferito, di ernia incarcerata, di ventricolo contuso, d' iscuria renale.

*Ileo*, vomito di feccia intestinale con ostruzione d'alvo: sintomo d' ernia incarcerata, d' intestino retto ragricciato.

*Diarrea*, frequente scarico d'alvo: sintomo di ascesso lungamente chiuso; di ascessi, e ferite; da cui si cava e assorbe la marcia; d' iscuria; di essenza d' alooe molto applicata internamente alla ferita.

*Ptialismo*, copiosa efcrezione di saliva: sintomo di mascella slogata, rotta; di dutto salivale leso; d' ulcera nella bocca; di acuto dente irritante: d' iscuria; di mercuriali esternamente applicati. Lo ptialismo *purulento* è sintomo d' ulcera nell' orecchie, nari o fauci.

*Anasàtarfi*, espettorazione di marcia dai polmoni: sintomo di polmon ferito, di torace contuso, e di empiema.

*Diabète*, troppo scaricamento d' orina; già sintomo di contusione de' lombi.

*Enuresi*, involontaria emission d' orina: sintomo di vertebra slogata; di polipo uterino o vaginale; di utero prolapso; di cistocele; di fistola della vescica urinaria; di litotomia; di parto difficile.

*Incontinenza d' alvo*: sintomo di vertebra lombale slogata, o rotta; di midolla

spi-

spinale offesa o commossa ; di canchero o nodi nell' intestino retto ; d' inciso sfintere dell' ano nel taglio della pietra o nell' operazion della fistola dell' ano .

*Piuria*, mistura di materia purulenta o mucosa: sintomo di calcoli , emorroidi , reni ferite , vescica ferita o contusa ; e di marcia d' ascesso assorbita .

*Leucorrea*, fluor bianco dalla vagina o dall' utero : sintomo d' ulcero o canchero nell' utero o nella vagina , di polipo vaginale , e di prolapso dell' utero .

*Gonorrhea*, fluor di moccio puriforme dalla uretra : talvolta sintomo di calcoli della vescica ; di piccol' cerò applicato nell' uretra ; d' ulcero nell' uretra , e di fimosi .

*Flatulenza* ; vagamento d' aria negl' intestini . Il rutto e 'l flato sono sintomi degli erniosi .

*Edopsia*, emissione di flato per l' uretra o per la vagina ; sintomo di fistola dell' ano , la quale penetra nella vescica o nella vagina .

## RITENZIONE IMPROPRIE.

*Iscuria* è ritenzione d' orina nella uretra o nelle reni . L' iscuria *uretrale* è sintomo di calcoli o di caruncula nell' uretra : di tumore nel perineo o tra la vescica e l' intestino retto ; di uretra  
con -

contratta, infiammata, di cervice della vescica; contratta da spasmo; di vescica paralitica; di verga edematosa; di prepuzio concreto.

*L'isouria renale* è sintomo di rene infiammato, contuso, o preso da spasmo per la vescica lesa, come talvolta si vede dopo la litomia.

*Disuria*, pisciatura dolorifica o ardente; sintomo di calcoli, di emorroide infiammata, di gonorrea virulenta recente, poi di cantaridi esternamente applicate.

*Dismenorragia*, o soppressione di mestruj, è sintomo di concreto, orificio uterino, vagina o vulva.

*Riserramento d'alvo*, è sintomo d'intestino retto concreto, poliposo, di ferito intestino o vescichetta del fiele; di ernia incarcerata.

## S E M I O T I C A,

### O V V E R O

### D O T T R I N A

### D E' S E G N I D E' M O R B I.

**SEGNO** è quel fenomeno od apparizione, per cui conosciamo la condizione del morbo presente, passato, o futuro.

Si

Si dividono i segni de' morbi ;

1. in segni *diagnostici* , che indicano lo stato presente del morbo ;
2. ——— *anamnestici* , che mostrano lo stato del morbo passato ; e
3. ——— *prognostici* , che danno lo stato del morbo avvenire .

I segni diagnostici si suddividono in *proprij* , *comuni* ed *epigemoni* .

I segni prognostici si dividono in *buoni* , *equivoci* , e *cattivi* .

### DIAGNOSI DE' MORBI .

L' *ta* scienza che dà i segni , co' quali si possa conoscere il morbo presente , e distinguerlo dagli altri . Così

Cavansi , coll' ajuto de' sensi esterni , con sano raziocinio e analogia , i segni del morbo presente .

1. col *tatto* , il quale si esercita col dito , o con istrumenti , come stilo e catetere , e col quale conosciamo la profondità e direzione delle ferite ed ulcere , il latente calcolo nella vescica , le ossa sconcie e rotte , la durezza , mollezza , fluttuazione , pulsazione , calore , freddo de' tumori ec.
2. coll' *udito* , pel quale sentiamo lo strepito dell' ossa nelle fratture , lo strepito dell' aria nell' enfisema ;

3. Coll'

3. Coll' *odorato*, mediante il quale conosciamo la putredine cancrenosa, e nella ferita degl' intestini crassi, o della vescica, il fetor della feccia e dell' orina.
  4. Col *gusto*. Così l' umor amaro, che scola dalla ferita addominale, indica esser lesa la vescichetta della bile.
  5. Con la *vista* scopriamo l' esterna faccia de' morbi, come la grandezza di ferite ed ulceri; i colori e'l volume de' tumori. A vedere gli umori che scolano dalla ferita, ci accertiamo della lesione di parti interne. Così dalla feccia, ch' esce per la ferita dell' addomine, giudichiamo la lesione dell' intestino crasso.
  6. Col *raziocinio* indaghiamo la natura del male da' sintomi del male stesso, dall' azione delle cause morbifiche, e dall' azione di quel che giova o nuoce.
  7. Mediante l' *analogia* paragoniamo i malori men cogniti con quei che son cogniti.
  8. E finalmente il *moto automatico* e'l *dolore*, in moltissime infermitadi, mostrano la sede del male.
- I segni di ciascun morbo si dividono in *proprij*, *comuni* ed *epigenomeni*.
- Il *segno proprio* del morbo, che pur dicesi *patognomico* e *caratteristico*, è quel segno di morbo, col quale il mor-

morbo differisce da tutti gli altri. Segno adunque patognomico dell' aneurisma vero è la pulsazione; dell' edema, la fossetta del dito impresso; dell' enfisma, lo strepito della tela cellulosa. Or da uno, or da molti segni presi insieme, ricaviamo il segno patognomico del morbo. In que' casi poi, che non hanno segno patognomico, non vale arte umana a scoprirli; simile esempio n' è talvolta il sangue sparso sotto il cranio.

Il *comun segno* del morbo è quello, ch' è comune a molti mali; così il dolore è segno di varj tumori e caldi e freddi.

*Epigenòmeno* dicesi quel *segno*, che indica esservi un altro morbo che sopravviene o precede al morbo presente. Così la febbre intermittente, che sopravviene alla ferita, ci dà un sintomo epigenòmeno.

## ANA'MNESI DE' MORBI.

È scienza, che dà i segni, co' quali scopriamo la causa del morbo.

La *causa prossima* del morbo si rileva, 1. dall' indole del morbo, 2. dalla notazione della causa eccitante o remota, 3. dalla presenza della causa predisponente.

La *causa eccitante*, se il morbo dee la sua ori-

origine a violenza o ad altra causa esterna, si conosce per la relazione del malato; ma se il morbo viene da causa interna, a lui, ignota, bisogna che il chirurgo esamini tutte quelle cause interne che altra volta possan dar occasione a questo male.

Quindi l'esame di sei cose non naturali, e de' morbi antecedenti, costituisce l'anamnesi de' morbi per la maggior parte.

## PROGNOSI DE' MORBI.

E' la scienza, che dà segni, per cui si predice lo stato avvenire del morbo.

I segni prognostici si dividono

in *buoni*, che danno speranza di vita e guarigione;

in *equivoci*, che non indicano pericolo, nè difficoltà di guarigione; e

in *cattivi*, che mostran pericolo di vita, o difficoltà di guarigione.

Da questi segni si predice

1. l'*esito del male* o in sanità, o in altro male, o in morte;

2. la *guarigion del male*, o difficile, o facile, o impossibile.

In casi dubbj l'uomo savio pronostica non di certo, ma probabilmente.

L'esito e la guarigione di ciascun morbo si danno nella *patologia speciale*.

T E R A P I A,  
O V V E R O -  
D O T T R I N A  
D E L L A C U R A D E' M O R B I.

\* \* \* \* \*

D E L L A C U R A D E' M O R B I  
I N G E N E R A L E.

**LA** cura è toglier la causa prossima del morbo.

Questo togliimento di causa si fa colle forza della natura o cogli ajuti dell' arte; quindi la cura del morbo è *natura*, o *artificiale*.

Le forze mediatrici della natura sono potenze insite a' solidi e fluidi, con le quali può la natura impedire i morbi o sanarli. Qui sopra tutto appartiene.

1. La *forza consolidante*, che sana ferite, ulceri, e fratture.
2. ——— *suppurativa*, che separa le cose crude, ostruttive, acri, cancrenose, cariose, eterogenee, dalle parti sane.
3. ——— *assorbente*, che tira ne' vasi assorbenti il sangue sparso; il siero, la linfa ed altri sparsi umori; e così ella guarisce felicemente le ecchimosi, le idropisie ed altri tumori.

4. — *scer-*



4. — *scernente*, che per la cute, pe' reni, per gl' intestini, per l' ulcere artificiali, o pe' tumori metastatici e critici, sfratta gli umori.

5. *La forza del moto vitale decresciuta*, con la quale per lo più si risolvono spontaneamente i tumori nati da ostruzione.

6. *La forza del moto vitale diminuita*, con cui di spesso fermanfi spontaneamente emorragie pericolosissime, indotto il deliquio d'animo.

7. *L' appetito peculiare* indicò più volte un medicamento salubre, con cui fu vinto il male.

Ma la maggior parte delle forze medicatrici è ancora ignota.

Anche senza medicamenti si guariscono molte malattie dalla *forza di cose naturali*, cioè dall' aria, dal cibo, dalla bevanda, da patema d'animo, dalla quiete, dal moto, e parimente dall' età, dalla consuetudine, dal mutato temperamento, dal clima ec.

Di tre sorte sono gli ajuti, co' quali l' *arte* guarisce i mali: *Dieta*, *Medicamenti*, *Instrumenti*. E perciò la terapia artificiale si divide

1. in *igiène*, la quale cura i mali col vitto, e col governo delle cose;

2. — *farmacia*, la qual guarisce con medicamenti esterni e interni;

3. — *chirurgia*, che sana con mano, fasce e strumenti.

PARTE II.

E

Po-

Potendosi finalmente ogni morbo impedire ,  
o del tutto sanare , o soltanto in parte  
curare , si divide la cura de' morbi ,

1. in cura *profilattica* , la qual insegna a  
prevenire i morbi ;
2. ——— *palliativa* , che insegna a di-  
minuire i sintomi del morbo ; e
3. ——— *radicale* , che insegna la total  
guarigione del morbo .

*Metodo di medicare* si è la norma , che dà  
regole , colle quali si possa fare la cu-  
ra del morbo .

Ma acciocchè questa *norma* ; o *metodo di  
medicare* , si trovi , osservi bene il  
chirurgo qual sia , nel morbo ch'e'vuol  
curare ,

- 1, l'*Indicante* , che dimanda il toglimen-  
to del male :
2. l'*Indicazione* , con la quale si possa  
levar il male :
3. l'*Indicato* , che può toglier il male ; e  
s'egli manca ,
4. il *contr'indicante* , o la condizione  
che vieta di adoperar l'Indicato .

L'*Indicante* è la causa prossima del morbo ,  
la quale si dee tor via .

L'*Indicazione* è l'azion del rimedio , con  
la quale si toglie il morbo .

L'*Indicato* è il rimedio stesso , o lo stru-  
mento , che ha l' indicata forza di  
levare il morbo .

La *Contr'indicazione* è la condizione del mor-  
bo , o dell'Indicato , contrario alla cura .

Final-

Finalmente ogni metodo di medicare , ed ogni cura di morbo , si divide

1. In *cura razionale* , che si fa giusta le indicazioni ; e
2. in *cura empirica* , la quale si fa senza indicazione .

La *cura razionale* si fa solamente in morbi , de' quali è nota l' indole .

La *cura empirica* si dee usare in que' morbi , di cui non si fa ancora l' indole .

Perciò in questi diamo medicamenti specifici in via empirica .

## DELLA CURA DE' MORBI SPECIFICAMENTE .

I morbi , o le cause prossime de' morbi ; si tolgono co' seguenti rimedj e strumenti .

### CURA DE' MORBI SEMPLICI IN PARTI SOLIDE .

1. La *laffità delle fibre* , e la *mollizie dell' ossa* si toglie con medicamenti corroboranti , astringenti , acqua fredda , compressione con fascie ,
2. La *rigidità delle fibre* , e la *fragilità dell' ossa* si cura con emollienti , mucilaginosi , oliosi .
3. L' *irritabilità accresciuta* si cura con levare lo stimolo , con narcotici , emollienti , indi con corroboranti .

4. L'*irritabilità diminuita* si cura con irritanti e corroboranti.
5. Lo *spasmo* si leva con narcotici, oppio, mercurio gommoso.
6. La *paralisi* vuole rimedj nervini, irritanti, soprattutto cantaridi.
7. La *sensibilità aumentata* si cura come l'irritabilità aceresciuta: la *sensibilità distrutta* si rimette come l'irritabilità diminuita o distrutta.

La cura de' morbi organici si dà nella *patologia speciaie*.

## CURA DE' MORBI IN PARTI FLUIDE.

*Pletora*: si cura con salasso, e poco vitto.  
*Keneangia* (vacuità di vasi): con nutritivi, e cardiaei.

*Speffitudine*: con resolventi, antiflogistici, bevanda acquosa.

*Tenuità*: con inviscanti, e corroboranti.

*Acrimonia acida*: si cura con terre assorbenti, con sali alcalini, amaricanti.

—— *alcalina*: con acidi.

—— *muriatica*, o *falsa*: con avvoltanti, diluenti.

—— *venerea*: con mercuriali.

—— *scorbutica*: con sugo di limone, d'arancia, e con erbe fresche.

—— *artritica*: con ispecifici, come antimonio, acónito.

—— *podagrica*: con acqua fredda, e specifici.

—— *ren-*

- *reumatica* : con antimonioati , e  
specifici .  
*Acrimonia scrofolosa* : colla chinachina ,  
con cicuta , con sapon Veneto  
 ——— *scirrofa* , e *cancerosa* : con cicuta  
ed altri specifici .  
 ——— *carbionchiosa* , e *pestilenziale* : con  
aceto rutato , canfora e specifici .  
 ——— *putrida* , e *cancrenosa* : con antiseptici , china , canfora , arnica , ruta .  
 ——— *rancida* : con purganti , e me-  
lati .  
 ——— *ulcerosa* : con nitro , sali medj ,  
canfora , china .  
 ——— *cariosa* : con china , assa fetida .  
*Savorra delle prime vie* : si cura con eme-  
tici e purganti .  
*Error di luogo* : con repellenti , e acqua  
fredda .  
*Materia traspirabile ritenuta* : con sudori-  
feri .  
*Orina ritenuta* : con levar la causa che in-  
duce iscuria .  
*Feccia alvina ritenuta* : si cura con purgan-  
ti , enemì o serviziali .  
*Latte ritenuto* : con estrarlo mediante l'  
antlia mammaria .  
*Ritenzion di sangue mestruo* : con rimette-  
re i mestrui .  
 ——— *emorroidale* : con sanguisu-  
ghe .  
*Troppa escrezion di sangue , o d'altro umo-  
re* : con rimedj astringenti .

*Estravasazione, e stagnazion di umori*: con fomenti risolventi, con evacuanti interni, o con apertura fatta.

*Metàstasi* ( mutazione, o passaggio ): con apertura fatta.

*Congestion, e flogosi o infiammazione*: con antisthogistici, evacuanti, revellenti, avvoltanti; togliimento di stimolo, salasso, acqua fredda.

## I G I È N E,

O V V E R O

DOTTRINA DI GOVERNO

DELL' INFERMO.

**SI** chiama *Igiene* il metodo del vitto e delle cose naturali, che prescrive il chirurgo ad osservarsi dall'infermo sotto la cura de' morbi chirurgici.

**Ciò** riguarda l'uso regolato di sei cose naturali, col quale si può conservare la sanità, e curar il morbo. Quì dunque appartengono.

1. L' *aria*.
2. Il *cibo*, e la *bevanda*.
3. Il *moto*, e la *quiete*.
4. Gli *affetti dell' animo*.
5. Le *cose ritenute*, e le *escrete*.
6. Il *sonno*, e le *veglie*.

ARIA.

## A R I A.

Attorno a' feriti, e ulcerosi l'aria sia calda, pura e serena. Si schivi l'aria umida, fredda, troppo calda, e la puzza degli ospedali. Non si tengano lungamente esposte all'aria, benchè pura le ferite e lo ulcere. Si fascino queste, acceso fumo aromatico, e facciasì presto.

## C I B O.

Sia egli buono di qualità e quantità; cioè facile a digerirsi, nè peccante di eccesso o difetto.

Di tre sorte è la *dieta*: *piena*,  
*mediocre*,  
*tenue*.

*Dieta crassa*, o *piena* è quella, che può non solamente conservare le forze del corpo, ma accrescere il lor vigore.

Quindi

*Minestra* con brodo di carni.

*Carni* di giovani animali castrati.

*Vegetabili teneri*.

*Carne arrostita di animali giovani*, o di polli.

La *dieta piena* conviene a uomini robusti, leggiermente feriti, o del tutto convalescenti da malattia.

La *dieta mediocre* conserva le forze, non le aumenta: come,

*Brodetto, o minestra farinacea.*

*Carni di polli cotte.*

*Frutti cotti ben maturi.*

Convieni questa dieta a febriti, e ad altri infermi, se non v'è infiammazione o febbre.

La dieta tenue conserva forze poco diminuite: come,

*Brodi o minestre farinacee.*

*Frutta cotta acidetta.*

Convieni questa dieta a' gravemente feriti; ancorchè con febbre vulneraria o infiammazione. E perciò eziandio chiamasi *dieta antiflogistica*.

Ma sempre, nell'ordinar la dieta, si dee dar qualche cosa all'età, alla consuetudine, al tempo.

## BEVANDA.

L'acqua buona è ottima per chi v'è uso. Assente la febbre e l'infiammazione, si dà vino o buona birra ai debili e convalescenti. La limonia, il decotto d'orzo con ossimele, od una tenue emulsion di mandorle con nitro, è l'ordinaria bevanda ne' mali infiammativi.



## MOTO E QUIETE.

Un moto mediocre conviene a chi non ha febbre , infiammazione , o membro fratto : a chi ne ha , si prescrive la quiete . In quasi tutte le fratture giova di tenere il membro alquanto *piegato* . Si impedisca , particolarmente nella cura di frattura di gamba o coscia , di *decubito* dell' osso sacro a lunga dimora in letto..

## AFFETTI D'ANIMO.

Giova la *speranza* , e un *gaudio* mediocre . Si evitino gli altri patemi dell' animo , le studiose applicazioni , e i violenti esercizi de' sensi..

## COSE RITENUTE, ED ESCRETE.

Ogni dì succeda *escrezioni* d' alvo , d' orina e traspirazione cutanea , e si promuovano le cose *ritenute* , l' alvo con enema ( *serviziale* ) , l' orina e la traspirazione con bevanda diuretica o diaforetica.

## SONNO, E VEGLIE.

Sia moderato il sonno ; si schivino le veglie..

E S

FAR

## F A R M A C I A ,

O V V E R O

D O T T R I N A

## DELLA CURA MEDICINALE .

**Q**UELLA parte , che insegna a curare i morbi chirurgici co' medicamenti , *Farmacia* s'appella .

I medicamenti sono cose tratte dal regno animale , vegetabile , o minerale , che hanno la forza di sfrattare i morbi .

Quindi la *primaria divisione* dei medicamenti è in medicamenti *vegetabili* , *animali* , *minerali* .

I medicamenti de' morbi esterni , o si applicano al corpo , o s'introducono nel ventricolo ; ed ecco una *seconda divisione* in *medicamenti esterni* e *interni* .

E perchè tutt' i medicamenti si adoperano crudi , e con arte farmaceutica alquanto immutati , o per mano dello speziale composti di più semplici misti insieme ; ne abbiamo una terza divisione in medicamenti *semplici* , *preparati* , e *composti* .

In oltre , siccome l' *azion* de' medicamenti dipende da' principj costitutivi , e varia secondo la diversità di questi , si dividon i medicamenti dall' *indole* o qualità

lità de' principj costitutivi , in mucilaginosi , oliosi , gelatinosi , gommosi , resinosi , bituminosi , balsamici , austeri , aromatici , saponacei , acri , caustici , narcotici , acidi , alcalini salii , spiritosi , eteri , terrei , metallici , acquosi , meccanici.

Poi dall' *azione* medicata si dividono i medicamenti in emollienti , astringenti , corroboranti , stitici , disseccanti , umettanti , avvoltanti , anodini , suppuranti , attraenti , repellenti , corrosivi , correggenti , detergenti , consolidanti , cicatrizzanti , calefacienti , refrigeranti , risolventi , evacuanti , specifici.

Dee finalmente il Chirurgo saper la *forma* , con la quale si adoperano i medicamenti , i quali perciò dalla *forma di applicazione* soglion dividersi.

1. In *formule de' preparati* , come sono , acque distillate , aceti , spiriti , tincture , essenze , elisir , estratti , olj , decotti , infusi , mieli , liquori , mucilagini , saponi , polpi , resine , sughi , sali , sugne , sevi , spugne preparate , preparati terrei , e metallici.
2. In *formule de' composti* , come sono , acque composte , tincture composte ; liquori , balsami , olj composti ; mucilagini , spiriti composti ; specie , fomenti umidi , fomenti secchi , cataplasmi , gargarismi , collutorj , iniezioni , clismi , lavatorj , bagni artificiali , vapora-

zioni, polveri, empiastri, cerotti; unguenti, unzioni, lattovarj, suppositorj, trochisci, pietre, globi, paste, candele.

Quindi si vede, che la *Farmacia* chirurgica dee dividersi.

1. in *materia chirurgica*.
2. in *farmacia chirurgica*.
3. in *metodo di prescrivere le formule esterne*.

Dimostro a sufficienza queste tre dottrine nella mia *Materia chirurgica*, e *Farmacia chirurgica*.

## CHIRURGIA,

• V V E R O •

D O T T R I N A

D E L L A C U R A M A N U A L E .

**Q**UELLA parte di Terapia, che insegna a sanare i morbi col mezzo della mano, di fascie o di strumenti, in senso rigorosissimo chiamasi *Chirurgia*.

Si usa la cura manuale dove non bastano i medicamenti, nè la dieta.

Servono alla *chirurgia manuale* le *mani*, la *fascie*, gli *strumenti*; perciò ella si divide

1. in

1. in *dottrina delle fasce*, che insegna la composizione e applicazione di fasce e fasciatura;
2. in *dottrina degli strumenti*, che dà la figura, la materia, la divisione, la struttura, l'applicazione e l'uso degli strumenti;
3. in *dottrina delle operazioni*, che insegna l'indicazione, la contr'indicazione, il luogo, la preparazion del malato, l'apparato della fasciatura e degli strumenti, il sito del malato e del Chirurgo per l'operazione, la stessa manipolazione dell'operazione, la fasciatura, e le disgrazie che nell'operazione e dopo succeder possono.

Gli *Antichi* divideano le operazioni, giusta l'effetto che producono, ne' sette generi seguenti:

1. *Sintesi*, che unisce le preternaturali soluzioni del continuo.
2. *Tassi* (ordine), che riduce a luogo le cose rimosse.
3. *Diortosi* (correzione) che riforma le mal formate.
4. *Dieresi* (divisione), che separa le unite.
5. *Exeresi* (eccezione) che leva dal corpo le eterogenee.
6. *Prostesi* (giunta) che rimette le mancanti.
7. *Aferesi* (toglimento) che detrae le superflue.

I *Moderni* dividono le operazioni

1. in *manuali*, che si fanno colla nuda mano, come nel riporre la ernia, o la lussazione.
2. in *strumentali*, che si fanno con mano armata di strumenti, come nel salasso, nella trapanazione, emputazione, ec.

Circa le operazioni veggasi l'ultima dottrina di *Chirurgia pratica*, dov' elle sono descritte.



FARMACOLOGIA

OVVERO

DOTTRINA

DE' MEDICAMENTI.

THE

NEW





# FARMACOLOGIA

O V V E R O

## DOTTRINA

DE' MEDICAMENTI.

- I** MEDICAMENTI si dividono ,
1. in *esterni* , e *interni* ;
  2. in *semplici* , *preparati* , e *composti* .
- 

# MATERIA CHIRURGICA.

O V V E R O

CLASSI DE' MEDICAMENTI ESTERNI.



## D I G E S T I V I .

**S**ONO rimedj , che in ferita ed ulcere  
promuovono la suppurazione .

Balsamo d' Arcèò .

Unguento digestivo .

Unguento di basiliconè .

Digestivo liquido .

VUL-

## VULNARJ.

*Che si usano per curar ferite ed ulceri,*  
 Acqua vulneraria semplice.

— Tedianà.

— Fagedenica.

Spirito di vino masticino.

Balsamo d' Arcèò.

## UNIENTI.

*Empiastri tenaci per riunir le ferite di taglio.*

Empiastro Anglicano.

— stitico.

— di minio.

## DETERGENTI.

*Che detergono e purificano le ulcere lardace.*

Unguento digestivo acre.

— Egiziaco.

Acqua fagedenica.

Mercurio precipitato rubro.

## DISSECCANTI.

*Che disseccano, e cicatrizzano le ferite ed ulcere.*

Estratto di Saturno.

Panno lino sfilacciato, asciutto.

Bolarmeno.

Allume arso.

Acqua Tedianà.

## S T I T T I C I.

*Rimedj che fermano l'emorragia.*

Alcohol di vino.

Spirito di trementina.

Acqua Tediaa.

Vitriuolo ceruleo.

Fungo agarico.

Panno lino sfilacciato.

## A S T R I N G E N T I.

*Che astringendo corroborano le parti rilassate.*

Specie astringenti cotte in vino rubro.

Acqua Tediaa.

Allume.

Zucchero di Saturno.

Acqua di calce.

Vino rubro.

## C O R R O B O R A N T I.

*Che corroborano con lena stimolo le parti rilassate.*

Specie cefalica.

Vino rubro.

Spirito di vino canforato.

—— di anthos o rosmarino.

—— di lavanda.

## R I S O L V E N T I I T U M O R I C A L I D I.

*Che risolvano l'infiammazione, e i tumori calidi.*

Off.

Officrato .

Vino acquato .

Acqua vegeto-minerale .

Formento d'erbe risolventi .

—— di feccia di vino .

—— di farine risolventi .

## RISOLVENTI I TUMORI FRIGIDI.

*Che risolvono i tumori frigidi.*

Sapon Veneto soluto in latte .

Soluzione di balsamo di vita eterno .

Gomma ammoniac soluta con aceto .

Fomento o. cataplasma di cicuta .

Spirito saponaceo .

Empiastro di cicuta .

—— saponato .

## EMOLLIENTI.

*Che mollificano i tumori induriti, e infiammanti.*

Empiastro diachilon semplice .

Cataplasma emolliente .

Fomento d'erbe emollienti .

Unguento di altèa .

## MATURANTI.

*Che promuovono la suppurazione de' tumori infiammanti.*

Empiastro di galbano .

—— diachilon con gomme .

Unguento di basilicone .

Ca-

Cataplasmata maturante.  
 Fermento di farina melata.  
 Cariche ( fichi secchi ) cotte in latte.

## A N O D I N I.

*Che mitigano il dolore.*  
 Cataplasma di foglie d'iosciamo.  
 Croco.  
 Oppio.  
 Unzione anodina.

## R E P E L L E N T I.

*Che ne' vasi stagnanti respingono gli umori,  
 o li dibattono, come nell' oftalmia.*  
 Acqua fredda.  
 ——— vegeto-minerale.  
 ——— vetriolata.

## G A U S T I C I.

*Che corrodono le parti, a cui si applicano.*  
 Pietra caustica; per aprire gli ascessi o po-  
 steme,  
 Pietra infernale; da applicarsi a carne fun-  
 gosa papillare.  
 Allume arso . . . . a carne fungosa lata.  
 Olio di canfora caustico . . . a sarcomi fun-  
 gosi magni.  
 Polvere di flammula jovis, o  
 Polvere di fredo ( sempreviva ) acre . . .  
 a canchero fungoso.

Bu-

Butiro d'antimonio .... *a margini callose  
d'ulceri, e fi-  
stole.*

Precipitato rubro .... *ad ulceri lardacei  
venerei.*

Acqua forte mercuriale ... *a carie negra.*

Acqua caustica mercuriale ... *a condilomi  
venerei.*

Polvere di vitriuolo ceruleo .... *a vasi lin-  
fatici  
offesi.*

Pasta da nevi .... *a nevi materni.*

Spirito di sale, concentrato ... *a verruche.*

Verderame con cera ... *a calli de' piedi.*

Unguento Saintyviriano ... *a pterigj o ma-  
cule dell'occhio.*

Polvere di cantaridi ... *a ferite fatte da  
cane rabbioso.*

## A N T I S E T T I C I .

*Che resistono alla putredine e alla cancrena.*

China.

Castoreo.

Ruta.

Unguento di storace.

## A N T I V E N E R E I .

*Che fanano gli ulceri venerei.*

Acqua fagedenica.

Balsamo mercuriale.

Soluzione di solimato corrosivo.

Gargarismo mercuriale.

A N .

## ANTICANCEROSI:

*Che si applican nel canchero e nelle indurazioni.*

Cicuta.

## ANTICARIOSI.

Che nella carie si applicano.

Essenza masticina.

— di mirra.

— di euforbio.

## FORMULE

## CONSUETISSIME

## DI MEDICAMENTI

## COMPOSTI.



## SPEZIE EMOLLIENTI,

**H**B. di malva

— di altea.

— di verbasco.

## SPEZIE RESOLVENTI.

Fiori di camomilla.

— di sambuco.

... di

- di arnica.
- Hb. di marubbio.

### SPEZIE CEFALICHE.

- Hb. di menta.
- di melissa.
- di rosmarino.
- di salvia.
- Fiori di lavanda.
- di rose.
- di arnica.

### SPECIE ASTRINGENTI.

- Radice di tormentilla.
- bistorta.
- Foglie di piantagine.

### SPEZIE VULNERARIE.

- Hb. di ruta.
- alchimilla.
- Fiori d'ipericone.

### FARINE RISOLVENTI.

- Farina di fave.
- orzo.
- segala.

### FARINE EMOLLIENTI.

- Farina di seme di lino.
- fieno greco.

SPI



## SPIRITO MASTICINO.

Il mastice di gomma si solve in ispirito di vino.

## ACQUA VULNERARIA SEMPLICE.

L'erbe balsamiche si distillano con ispirito di vino.

## ACQUA VULNERARIA TEDIANA.

E' composta d'acqua, spirito di vino, spirito di vetriuolo, e zucchero albo.

## ACQUA FAGEDENICA.

Il mercurio sublimato corrosivo si solve in acqua di calce.

## ACQUA ALBA o VEGETO-MINERALE.

Una dramma di estratto di saturno e di spirito di vino si dilava in una misura d'acqua.

## ACQUA OFTALMICA VITRIOLATA :

Alquanti grani di vitriuolo albo si solvonò in alquante oncie d'acqua rosa.

## UNGUENTO DIGESTIVO SEMPLICE .

S'impasta trementina cruda con torlo d'uovo , poi vi si aggiugne mirra e olio d'ipericone .

## UNGUENTO DIGESTIVO ACRE .

Egli è fatto di unguento digestivo semplice e di mercurio precipitato rubro .

## DIGESTIVO LIQUIDO .

Si dilava in acqua il digestivo semplice con torlo d'uovo e miele .

## BALSAMO D' ARCEO .

E' fatto di trementina , gommaelemi , cera , fevo di becco , e olio d'ipericone .

## BALSAMO MERCURIALE .

Si compone di balsamo d'Arcèò , di unguento Napolitano , e mercurio dolce .

## UNGUENTO NAPOLETANO o MERCURIALE .

E' fatto di mercurio vivo e sugna porcina .

MER-

## MERCURIO GOMMOSO.

Si pesta e si riduce in moccio , in un mortajo di marmo , 3j di mercurio vivo , e 3iij di gommarabica , con qualche siroppo .

## CATAPLASMA EMOLLIENTE.

Si fa cuocer con latte pezzolini di pan bianco , un torlo d'uovo , croco e butiro .

## CATAPLASMA RISOLVENTE.

Si fa cuocer erbe e farine risolventi con acqua alba .

## FOMENTO ASTRINGENTE.

Corte in vino rosso le specie astringenti ; con allume , o zucchero di saturno , vi si aggiugne spirito di vino canforato .

## FOMENTAZIONE CHE RISOLVE LE COSE SECCHIE.

Si riducono in polvere con le specie risolventi , e con canfora , le farine risolventi ,

## ENEMA EMOLLIENTE.

E' composto di ℥viij di decotto emolliente e ℥iv d'olio di Mno .

## ENEMA SOLVENTE L'ALVO.

E' composto di ℥viij di decotto emolliente, d'un'oncia di miel comune, e ℥j di sal amaro.

## ENEMA ACRE.

Si può comporlo di ℥vj di decotto emolliente, ℥ij di polvere di jalapa, e ℥j di scilla.

## PESI FARMACEUTICI.

℔	ovvero libbra	ha	℥xij.
℥	— oncia	—	℥viiij.
℥	— dramma	—	℥iiij.
℥	— scrupolo	—	gr. xx.
gr.	— grano .		
gt.	— goccia		
℞	— mezzo .		
℥ss.	— ana , cioè altrettanto .		
Menf.	— misura	ha	℔iv.
Manip.	— manipolo .		

## MATERIA MEDICA

O V V E R O

C L A S S I

D E' M E D I C A M E N T I

I N T E R N I



VOMITORJ o EMETICI.

*SI danno, quando nel ventricolo vi sono cibi corrotti, o bile corrotta; il che si conosce da nausea e dalla lingua amara.*

*Polvere della radice ipecaquano gr. xv.*

*Tartaro emetico gr. ij.*

*Pozione emetica: composta di 4. gr. di tartaro emetico e 4. oncie d'acqua: si dà a cucchiariate.*

*I vomitorj son nocivi alle gravide, agli erniosi, e a chi vomita o sputa sangue. A questi bisogna dar un purgante.*

P U R G A N T I.

*Si indicano quando negl'intestini v'è savorra corrotta.*

*I purganti si dividono in leni e forti.*

*I leni, che insieme refrigerano, sono:*

F 3

Sa-

Sale amaro ℥iſſ.

Manna ℥iij.

Cremor di tartaro ℥ſſ.

Rheum ʒj. ( Rabbarbaro ).

Polvere della radice jalapa ʒſſ.

Pozione lassativa D. Vien. ℥iv.

Lattovaro lenitivo ʒj.

Polpa di tamarindi ℥iij.

Siroppo di cicoria con rabbarbaro, ovvero

Siroppo mannato: *si dà agl' infanti a cucchiariate.*

*Purganti forti, o drastici, chiamansi i seguenti:*

Resina di jalapa gr. x. in ispirito di vino ℥ſſ.

Resina di scamajo, *pur così.*

Pillole anetine ʒſſ.

## SUDORIFERI.

*Si indicano in catarro, acrimonia e scabbia.*

Infusione di fior di sambuco.

Decotto di legni.

Antimonio diaforetico gr. xx.

Polvere antispasmatICA rubra ʒſſ.

## DIURETICI.

*Si indicano in morbi idropici e in tumori acquosi.*

Ossimele scillitico ʒj.

Ossimele colchico ʒj.

Polvere di scilla gr. x.

Vino.

Vino scillitico ℥ij.

Decotto di ginepro ℔j.

## ESPETTORANTI.

*Si danno in asma pituitoso e purulento.*

Specie pettorali con iscilla.

Offimele scillitico ℥j.

Gomma ammoniaca gr. xx.

Chermes minerale gr. ij.

## ANTIFLOGISTICI O REFRIGERANTI.

*Si indicano in mali infiammativi e in febbri calide.*

Limonea Mj.

Decotto d' orzo Mj.

———— di vena Mj.

Offimele semplice ℥ij.

Nitro ℥ss.

Emulsione mandorlina con nitro.

## ANTISETTICI O ANTIPUTREDINOSI.

*Si indicano in febbri putride, cancrena, e carie.*

China ℥j.

Canfora gr. x.

Aceto di vino ℥ij.

Spirito di vitriuolo gr. xxx. a ℔j. d'acqua.

## CARDIACI o ECCITANTI.

*Si indicano in debilità senza infiammazione, e calore.*

Vino di Tokai ʒij.

Liqqor anodino minerale gr. xx.

## CORROBORANTI.

*Si indicano in clorosi, e debilità, senza febbre calida.*

China ʒj.

Estratto di marte pomato ʒʒ.

Tintura di cinnaomono ʒj.

## STOMACHICI.

*Si indicano in debilità di ventricolo.*

Essenza amara ʒʒ.

Elissire di vitriuolo gr. xx.

Specie amare.

Polvere di genziana ʒʒ.

## CARMINATIVI:

*Si danno in colica flatulenta.*

Essenza carminativa ʒj.

Spirito di nitro dolce gr. xxx.

Acqua di finocchio.



## A N O D I N I

*Si danno in dolore , eh' è senza infiammazione .*

Oppio gr. ꝑ. ovvero j.

Laudano liquido gt. xij.

## A N T I S P A S M O D I C I .

*Si indicano in tetano e convulsione , e si danno con olio dopo le grandi operazioni chirurgiche .*

Oppio gr. j.

Laudano gt. xx.

## V U L N E R A R J .

*Si danno in ulcere di polmoni e d' altre parti ; quindi si raccomandano in tisi- ca ed etica .*

Decotto vulnerario .

———— di poligala amara .

———— di lichene islandica .

Acqua scelterana con latte caprinò .

Pillote balsamiche .

## R I S O L V E N T I .

*Si indicano in iscirro , in indurazioni di viscere e di glandule .*

Sapon veneto gr. xx.

Estratto di cicuta gr. xx.

F 5

Gom.

Gomma ammoniaca gr. xx.

Tartaro tartarizzato .

—— vitriolato .

Sal mirabile .

Sal policresto gr. xx.

### ANTACIDI, o ASSORBENTE L' ACIDO.

*S' indicano in acidità di ventricolo e d' intestini .*

Pietre di cancri gr. xx.

Magnesia alba ʒj.

Sal di tartaro gr. x.

### LENIENTI.

*S' indicano in colica , altri dolori , e disuria .*

Emulsione mandorlina ʒbj.

Polvere di gommarabica ʒʒ.

Olio di mandorle dolci ʒij.

Siroppo di diacodio ʒʒ.

### EMOLLIENT :

*Si indicano in mali dolorosi e infiammatori .*

Decotto di radice d' altea .

Infus. di semi di lino .

ASTRIN-

## A S T R I N G E N T I.

*S'indicano in emorragie, e diarrea abituale.*

Allume dragonizzato ℥j.

Terra Giapponica ℥j.

Bolarmeno ℥ij.

Decotto di simaruba.

Conserva di rose rubre ℥ij.

## A N T I V E N E R E I.

*S'indicano ne' morbi venerei.*

Mercurio gommoso gr. xx.

———— dolce gr. ij.

———— sublimato corrosivo gr.  $\frac{1}{2}$  ℥ij. di  
decotto.

## A N T I S C O R B U T I C I.

*Si danno in morbi scorbutici.*

Sugo di nasturzio.

———— coclearia.

———— beccabunga.

———— limone.

———— arancia ℥ij.

Conserva di nasturzio ℥ij.

Brasca acidulata.

Birra di rafano.

Mosto di malto.

Frutta e cibi vegetabili.

## PURIFICANTI IL SANGUE:

*S'indicano in ogni acrimonia d' umori ;  
scabbia e malfrancese.*

Decotto di falsapariglia.

\_\_\_\_\_ bardana.

\_\_\_\_\_ legni.

Fiori di zolfo.

Etiopie minerale.

Estratto di enula.



**E L E N C O**

**DE PIU' USUALI**

**STRUMENTI CHIRURGICI.**





# ELENCO

## DE' PIU' USUALI

### STRUMENTI CHIRURGICI.

STRUMENTI VULGARI , CHE IL CHIRURGO  
DEE SEMPRE AVER CON SE .

**F**ORBICE dritta .  
— — — — — curva .

Spatola per la bocca .

Spatola mirtiforme .

Forcipe , o tanaglia vulgare .

Stilo .

Solco .

Cucchiajo auricolare .

Strumento per la pietra infernale .

Rasojo .

### ASTUCCIO DA LANCETTE.

6. Lancette . 16

2. Flebotomi .

ASTUC

## ASTUCCIO DA COLTELLI.

Coltello dritto.

—— curvo.

—— capitato.

Lancetta maggiore.

## BORSA DA TORNO.

Torno vulgare, o strettojo.

2. Aghi curvi con fili incerati.

Splenioli, o pezzette graduate.

Falce di 4. braccia.

Fungo agarico.

STRUMENTI  
PER OGNI OPERAZIONE  
SPECIALMENTE INDICATA.

\*\*\*\*\*  
PEL SALASSO.

Lancetta.

Flebotomo.

PER SEGAR LA VENA JUGULARE.

Compressorio della vena jugulare.

PER TAGLIAR L'ARTERIA.

Lancetta.

PER



PER APRIR LA POSTEMA.

Lancetta maggiore.

PER ISNOCCIOLAR IL TUMORE.

Coltello.

Solco a punta ottusa.

————— acuta.

Picciolo amo, o uncinetto.

Mollette.

PER TAGLIAR VIA IL SARCOMA.

Forbice curvata lungo la superficie.

Coltello maggiore curvato lungo la superficie.

Coltello minore, detto.

Ago per legar il sarcoma.

PER ESPLORAR FERITA DI PUNTA:

Stilo più tenue.

————— grosso.

————— lungo.

———— di balena.

Sciringa per la ferita.

PER DILATAR LA FERITA.

Coltello dritto.

———— curvo.

———— occulto.

Forbice dilatatoria.

Cannellina.

Solco lato.

Strumento per la contr'apertura.

PER

PER CAVAR LA PALLA DALLA  
FERITA.

Forcipe dritta.

—— curva.

—— tridentata.

Cucchiajo.

Succhiello per le palle di piombo.

PER CUCIR LE FERITE.

6. Aghi curvi maggiori.

—————— minori.

PER COMPRIMER LE ARTERIE.

Tornò vulgare.

—— *Petiziano*.

—— *Anglicano*.

—— per lesion dell'arteria radiale.

PER LEGAR LE ARTERIE.

6. Aghi curvi grandi.

—————— più piccoli.

Ago per l'arteria intercostale.

Detrusorio della medesima.

Ago curvo grande.

PER DISCARNARE.

Coltello.

Cubo scarificatorio.

Ventosa.

Antlia, o tromba.

PER

PER FAR UNA FONTANELLA.

Coltello .

Cintolo per la fontanella .

PER LO SETACEO.

Forcipe da setaceo .

Ago ——— .

PER L' INOCULAZIONE.

Lancetta .

Flebotomo per l' inoculazione .

PER CAUTERIZZARE.

Cauterj di varia figura .

Vagine di varia figura .

PER DAR L' ENEMA.

Sciringa clismatica vulgare .

Vescica clismatica .

Cannellina maggiore .

———— minore .

Ordigno per fumo di tabacco .

Ordigno, *con cui può comodamente ognuno mettersi un serviziale e bagnarsi ano e scroto ; e con cui le femmine possono farsi iniezione nella vagina dell' utero .*

PER CAVAR LE UGNE.

Forcipe da schiantar l' ugne .

———— squarciale .

———— cavarle .

PER

PER PUNGERE GLI ORECCHJ.

Strumenti da pigner l'orecchie.

PER CAVAR UN CORPO ETEROGENEO DAL MEATO UDITORIO.

Cucchiajo auricolare.

Forcipe auricolare.

PER ESTIRPAR LA CARIE.

Ago da pugnere, o lesina.

Trapano perforativo.

—— sfogliativo.

Raspatojo.

Lima.

Forcipe da taglio.

Seghette del Cel. *Smußer*.

Cuneo.

—— incavato.

Martello.

PER DINUDAR IL CRANIO.

Rasoio.

Coltello.

Spatola mitriforme.

PER TRAPANARE.

Trapano con corona.

—— perforativo.

Chiave per la piramide del trapano.

Elevatorio a chiocciola.

Forcipe a cavar l'orbicolo dell'osso.

Sol-

Solco a punta acuta.

Stuzzicadenti.

Setolina.

Cotello lenticolare.

Depressorio della dura madre.

Forcipe da taglio con punte semilenticolari.

### PER ALZAR IL CRANIO.

Antilla

Elevatorio vulgare.

——— *Petiziano.*

### PER EMORRAGIA DELLE NARI.

Stumento per turar i forami postici del naso.

Cannellina elastica pel sangue da naso.

### P E R T A G L I A R E L O SCILINGUAGNOLO.

Forbice con punte ottuse.

Strumento del Cel. *Plattner.*

Spatolina incisa.

### PER FORAR L'ANTRO IGMORIANO.

Uncinetto per la bocca.

Stilo perforatorio maggiore.

——— minore.

Trapano piccolo.

Sciringa con cui far iniezione per l'alveolo del dente.

Ca-

Cannellina .

Stilo tenue .

## PER ESTIRPAR IL POLIPO NASALE .

Forcipe dritta pel polipo .

———— curva .

———— dentata per isfritolar il polipo .

———— tagliente per ischiantar il polipo .  
del Cl. Prof. *Richter* .

Coltello semilunare .

———— occulto .

Cauterio pel polipo .

Cannellina per legar il polipo nasale .

———————— uterino .

Filo tenue d' argento .

## PER CAVAR UN CORPO ETEROGE- NEO DALLO SCAVO DELLE FAUCI .

Forcipe semicircolare per le fauci .

———— che si apre superficialmente .

Detrusorio , di balena .

Strumento *Venetiano* .

## PER TAGLIAR L' UGOLA .

Strumento per l' amputazion dell' ugola .

———— per legar l' ugola .

———— per legar le gangole .

Forbice per tagliar via l' ugola .

## PER APRIR LA POSTEMA NELLE FAUCI .

Chiocciola della bocca .

Fa-

Faringotomo ; o che taglia la laringe.  
Strumento da forbir le fauci.

PER ISPRUZZAR LE FAUCI.

Sciringa d'argento.

Spatola ——— per la bocca.

PER L' OPERAZIONE DEL LABBRO  
LEPORINO.

Forbice pel labbro leporino.

Coltello.

Forbice tagliente per ischiantare il rialto  
osseo.

Fascia che unisce, con fili incrociati.

P E L P A L A T O.

Otturator del palato.

PER TAGLIARE LA TRACHEA.

Coltello dritto.

—— bipenne.

Solco.

Cannellina laringea, d'argento.

Lancetta occulta laringea, del Cl. P. Ri-  
chter.

Ago con doppia scanalatura.

PER TAGLIAR L' ESOFAGO.

Coltello.

Uncinetto.

Solco.

PEL

PEL TAGLIO DI MAMELLA.

2. Coltelli per tagliar la mammella.  
Uncinetto.

PER ESTRARE IL LATTE DALLE  
POPPE.

Antlia mammaria del cel. P. *Stein*.

PER LA PARACENTESI DEL  
TORACE.

Cokello acuto.

—— capitato.

Cannellina d'argento.

Ago per l'arteria intercostale.

PER LA PARACENTESI DELL'  
ADDOMINE.

*Ago di tre coste*, vulgare.

—— con cannellina incisa.

Riduttor dell' omento.

Otturator della cannellina.

Cintolo addominale.

PER CUCIR IL VENTRE.

6. Aghi grandi, e curvi.

Calamo grosso.

PER CUCIR GL' INTESTINI.

3. Aghi curvi e tenui.

3. Fili di color diverso.

Tubo di carta da giuoco.

PER



## PER TAGLIAR L'ERNIA.

Coltello diritto .

— curvo .

— capitato .

— occulto .

Solco semplice .

— alato .

Dilatatorio .

## PER LA SEZIONE CESAREA.

Coltello curvo .

— dritto .

— ricurvo .

Solco lato .

Forbice curva .

PER LA PARACENTESI  
DELLO SCROTO.

Ago piccolo da tre coste .

## PER SETACEO DELLO SCROTO.

Ago scanalato pel setaceo , secondo il Cel.  
*Pott.*

## PER TRONCARE LA VERGA.

Coltello .

Cannellina d'argento con appiccagnoli .

PARTE II.

G

PER

A

## PER CATETERISMO DELLA VESCICA URINARIA.

Catetere virile tenue

— — — — — più grosso.

— — — — — flessibile.

— — — — — per infante.

— — — — — muliebre.

Candelette semplici.

— — — — — cave.

— — — — — di resina elastica.

## PER L' INCONTINENZA D' ORINA.

Ordigno per l' incontinenza della vescica  
negli uomini  
— — — — — nelle donne.

## PER FAR INIEZIONE NELLA VESCICA URINARIA.

Catetere con chiocciola.

Sciringa per far iniezion nella vescica.

Compressorio della verga.

## PER PUGNER LA VESCICA.

Ago da tre coste, flessibile, per la puntura  
della vescica.

PER

PER DILATAR IL PREPUZIO  
E L' URETRA.

Coltello acuto.

Solco.

Coltello *Petiziano* per la fimosi.

Strumento per aprir l' uretra concreta.

PER LA LITOTOMIA,

o *taglio della pietra.*

6. Cateteri folcati di varia figura.

2. Coltelli litotomi di varia figura.

2. Conduttori: maschio e femmina.

Litotomo occulto.

2. Forcipi dritte.

2. — curve.

2. — dentate.

Strumento cocleo-nodoso.

Conduttur nuovo.

Ago per legare l' arteria.

Cannello.

PER LA LITOTOMIA MULIEBRE.

Coltello di due forte pel taglio della pietra.

Forcipi varie.

Dilatatorio dell' uretra muliebre.

**PER LA FISTOLA DELL' ANO.**

Coltello corvo ottuso del Cel. *Pott.*

Ago flessibile.

Coltello con uncinetto.

Strumento per la fistola dell' ano, inventata  
dal Cel.

*D. Retter.*

Strumenti — — — inventati  
dal Cel. *D. Brambilla.*

Tubo e

Coltello del Cl. *Rungio.*

Specolo dell' ano.

**PER COMPRIMERE GLI ANEURISMI.**

Compressorio calibeo ( d' acciaio. )  
di suvero incavato.

**PER L' OPERAZIONE DEGLI  
ANEURISMI.**

Coltello dritto.

Solco acuto.

ottuso.

2. Aghi curvi.

Mollette grandi.  
piccole.

**PER**

## PER L' AMPUTAZIONE.

Coltello falcato maggiore .

— — — minore .

— dritto .

— bipenne .

Forcipe da attrarre l'arteria .

Sena grande .

Forcipe grande da taglio .

Torno *Petiziano* .

Astuccio con aghi .

## PER TAGLIARE UN ARTICOLO.

Coltello maggiore .

— — — curvo .

— — — ricurvo .

Torno per l'arteria succlavia?

Ago peculiare per l'arteria .

## PER CAVAR UN DENTE

Chiave *Inglese* .

Strumento del cel. *Aitken* .

Pellicano .

— — — del cel. *Bourdet* .

Forcipe dentaria semplice .

— — — — — composta ( che in Germania si chiama *Ulbervvurf* . )

Torno per l'emorragia dall'alveolo .

PER NETTAR I DENTI.

Astuccio con 10. strumenti per far bianchi  
i denti.

PER CAUTERIZZARE  
I DENTI.

Imbuto.

Varj cauterj.

Ago da cauterizzare.

Calamita artificiale.

PER DEPRIMERE LA  
CATERATTA.

Aghi varj per la cateratta.

PER ESTRARRE LA  
CATERATTA.

Coltelli oculari del cl. P. *Richter*.

Kistotomo.

Cucchiajo.

Forcepe oculare.

Forbici oculari.

Ditale con asta, del cel. D. *Rumpelt*.

Tenacolo delle palpebre.

PER

PER LA FISTOLA  
LAGRIMALE.

Stili oculari.

Stilo pel fetaceo.

Sciringa *Aneliana*.

Perforatorio dell'osso lagrimale.

Cannellina d'oro.

Imbuto per gli punti lagrimali.

Compressorio del sacco lagrimale.

Catino pel bagno dell'occhio.

PER TAGLAIR VIA IL BULBO  
CANCEROSO.

Coltello.

Mollette.

Forbice.

Uncinetto.

Occhio artificiale.

PER LA TRICHIASI.

( male per certi peli. )

Mollette piccole.

PER L'ARTE OSTETRIZIA.

Lieva *Roonhuijsiana*.

— incavata.

Forcipe *Levreziana*.

— tribrachiale, del C. D. Leake.

Perforatojo.

Gancio ottuso.

Forcipe lata per estrarre l'ossa del cranio.

Forcipe dentata lunga.

Pelvometro e

Seggiola ostetricia del C. P. *Stein*.

Sciringa per l'utero.

Speculo dell'utero.

Pessaria anulare.

— — — — — peculiare.

Ago da tre coste occulto per la paracentesi  
del feto.

Forbice pel funicolo umbilicale.

## VARJ ORDIGNI CHIRURGICI.

Ordigno per la doccia, o embrocca.

— — — — — pel vapore.

— — — — — per l'ano artificiale.

Gambe artificiali.

Mani — — — — —

Riduttore emendato per le lussazioni.

— — — — — della spina del dorso.

Glossocomio ( guaina per la tibia: )

Polispasto ( argano . )

Noce, ordigno.

Forca di *Petit*.

Ambi, emendato.

Ordigno per frattura di gamba.

— — — — — di coscia.

— — — — — per gli sbilenchi.

Tavola per la litotomia.

Seggiola artificiale per le operazioni.

— — — — — pe



— — — — pe' convalescenti , del  
cl. *White*.

Letto artificiale pe' malati , dello stesso  
*White*.

Ferule varie ( stecche ) per le fratture .  
— — — — per le lussazioni .

## STROMENTI PER LA SEZION DI UN CADAVERE.

Rasojo.

3. Scarpelli grandi .

3. ——— piccoli .

3. ——— bipenni .

Forbice dritta .

——— curva .

2. Mollette .

2. Uncinetti semplici .

2. ——— doppi .

Tubo con epistomio ( turacciolo ) e 3. can-  
nelle .

2. Specilli o tente .

2. Solchi .

Sega arcata con lamine .

Strumento per sollevar il cranio .

Spatola per iscorticare la dura madre .

1. Aghi grandi e dritti .

4. ———— curvi , per cucir il cadave-  
re , e pel tenue legame  
nero di Seta .

## STRUMENTI ANATOMICI

*Oltre i sopraccennati . .*

Coltello pea la fezion del cerebro .

2. Cavatorj.

Martello .

Sciringa maggiore ; e altra minore , per  
l' iniezione .

Cannelline di vario diametro .

Sega versatile .

3. Lime varie .

Tenacolo torcolare . ( *Germ. Schraubstock .* )

Strumento per isciorre l' ossa del cranio .

Tavola anatomica versatile .



ELENCO  
DELLE FASCE  
CHIRURGICHE:





# ELENCO

DELLE FASCE

CHIRURGICHE.



SUPPLEMENTE CHIRURGICA  
ORDINARIA PER FASCIATURE.

- P**I. Anno lino sfilacciato o lacero , e le cose che se ne preparano, come,
1. Pimaccinoli .
  2. Pallottole di filaccica ( tasta. )
- II. Empiastri, ed altri medicamenti.
- III. Splenj ( pezze raddoppiate. )
- IV. Fasce semplici .
- Fascia circolare .
  - ascendente..
  - discendente .
  - uniente .
  - espulsiva.
  - comprimente .
  - contentiva .
- V. Fasce composte .

VI. Co-

VI. Cose accessorie alla suppellettile chirurgica.

Ferule .

Letticciuoli .

Legami , funicelli , refi , ec.

FASCE PEL CAPO.

Berretta grande .

——— piccola .

Cappellina .

Fonda capitale .

Fascia da sei teste .

——— uniente .

Scafa per la sezione della vena frontale .

Fascia nodosa, o solare per tagliar l'arteria .

——— mitrale .

Legatura per la trapanazione .

FASCE PER GLI OCCHI.

Occhio semplice .

——— doppio .

Fascia triangolare .

——— Oculare, del cel. D. Vincci .

FASCE PEL NASO.

Sparviere .

Discrimen ( dirizzatura . )

Fonda nasale .

## FASCE PER LE LABBRA DELLA BOCCA.

Fascia pel labbro leporino.

— — — — — superiore.

— — — — — inferiore.

## FASCE PER LA MASCELLA INFERIORE.

Capestro semplice.

— — — — — doppio.

Fonda mascellare.

## FASCIA PEL VISO.

Larva o maschera.

## FASCIA PEL COLLO.

Fascia contenente del collo.

— — — — — dividente del collo.

— — — — — pel taglio della trachea.

— — — — — uniente.

## FASCE PER LA SPINA DEL DORSO E DEI LOMBI.

Fascia scapolare con mantile.

Quadriga o catafratta.

## FASCIA PER LE MAMME.

Fascia di 4. capi pel taglio della mamma.

Sospensorio semplice della mamma.

— — — — — dop.

— — — — — doppio — — — — —

Fascia T per le mamme.

Camicia per la donna di parto.

## FASCE PER L' ADDOMINE

Fascia uniente.

Cintolo addominale.

## FASCIA PER LA VERGA.

Fascia per la verga offesa..

Sospensorio dello scroto..

Borsa scrotale.

## FASCE PEL SENO MULIEBRE..

Fascia pel seno muliebre..

## FASCE PEL PERINEO E LE NATICHE.

Fasca T semplice.

— — — — — doppia..

## FASCE PER L' ANGUINAJA.

Spica inguinale

Fascia all' ernia inguinale.

## FASCE PER LA SOMMITA' DELL' OMER O.

Fasca stellata semplice..

— — — — — doppia..

Spica ascendente.

descendente..

F A.



**FASCE PEL BRACCIO E  
L' ANTIBRACCIO.**

Fascia per la frattura dell' omero.

— per tagliarlo dall' articolo.

— per l' amputazion dell' omero.

— — — — dell' antibraccio.

**FASCE PER L' ARTICOLO  
DEL CUBITO.**

Legatura per la lussazione del cubito.

Fascia pel taglio della vena.

— per l' arteria offesa.

Legatura per l' aneurisma.

**FASCE PEL CARPO E LE DITA.**

Legatura pel carpo

— — — metacarpo.

— — per un dito.

— — — tutte le dita.

Ditale, per segnar la vena salvatella.

— — — — — cefalica della  
mano.

— — — pel dito mozzato.

Fascetta intera.

— — — mezza.

**FASCE PER COSCIA E GAMBA.**

Spica alla lussazion del femore.

Fascia alla frattura del femore.

— — — — della gamba.

— — — di 18. capi.


— — — all' amputazion del femore.

— — — — della gamba.



**NOTIZIA**  
**D'AUTORI**  
**PER CHI NON SA LA**  
**LINGUA GERMANICA.**





# BIBLIOTECA CHIRURGICA.

## NOTOMIA.

**P**LENCK : Rudimenti di Notomìa .

VVINSLOVV : Spofizione anatomica della  
struttura del corpo umano . T. IV.

ZINN : Defcrizione anatomica dell'occhio  
umano .

FABBRICIO : Metodo per la regular Diffeca-  
zione de' cadaveri umani .

LEBER : Anatomia .

## FISIOLOGIA.

BOERHAAVE : Istituzioni Mediche .

MARHERR : Pre-lezioni fopra le Istituzio-  
ni Mediche di *Boerhaave* . T. III.

HALLER : Rudimenti di Fifiologia .

—— : Elementi di Fifiologia del corpo  
umano . T. VII.

PA-

**PATOLOGIA CHIRURGICA  
GENERALE.**

**VAN SVVIETEN:** Comentarj agli aforismi di  
*Boerhaave* circa la conoscenza e  
cura de' morbi. T. V.

**MATERIA CHIRURGICA.**

**PLENCK:** Farmacia Chirurgica.

**DOTTRINA DELLE FASCE.**

**HEISTERO:** Istituzioni Chirurgiche. T. II.

**DOTTRINA DEGLI STRUMENTI.**

**HEISTERO:** Istituzioni Chirurgiche.

**CHIRURGIA IN GENERALE.**

**PIENCK:** Compendio d' Istituzioni Chirur-  
giche.

**HEISTERO:** Istituzioni Chirurgiche.

**PLATNER:** Istituzioni Chirurgiche.

— —: Supplementi alle Instit. Chirurg.

**LUDVVIG:** Istituzioni di Chirurgia.

**CALLISEN:** Instit. dell' odierna Chirurgia.

**BILGUER:** Dissertazione dell' amputazion di  
membra da non usarsi che rarissi-  
mamente, e quasi da abolirsi.

**PLENCK:** Dottrina de' morbi cutanei.

**ALIX:**

ALIX : Osservazioni Chirurgiche . II. Fascetti .

## MORBI DEGLI OCCHJ.

BOERHAAVE : De' morbi degli occhj .

PLENCK : Dottrina de' morbi degli occhj .

LANGE : Comento dell' Oftalmia .

## MORBI VENEREI.

ASTRUC : De' morbi venerei . T. II.

PLENCK : Dottrina de' morbi venerei .

—— : Metodo nuovo e facile di dar l'argento vivo a chi ha mal venereo .

## MAL DI DENTI.

PLENCK : Dottrina de' mali dei denti .

## CHIRURGIA FORESE.

LUDVVIG : Istituzioni di Medicina forese :

HEBENSTREIT : Antropologia forese .

## ARTE OSTETRIZIA.

ROEDERER : Elementi dell' arte ostetrizia .

CRANZ : Dissertazione sopra gli attrezzi dell' arte ostetrizia .

MANNINGHAM : Compendio dell' arte ostetrizia .

CASUISTICA.

RICHTER : Osservazioni chirurgiche . 2. Fasc.

ALIX : Osserv. chir. 4. pach.

L. B. DI Stoerck : Libretto della Cicuta :

— — — — — Flamula

— — — — — jovis.

— — — — — Pulsatilla

nericante .

STORIA DELLA CHIRURGIA.

HALLER : Biblioteca chirurgica . T. II.

COMENTARJ de' successi in scienza naturale  
e in Medicina.





B I B L I O T E C A  
M E D I C A .

C H I M I C A .

SPIELMANN: Istituzioni di Chimica .  
BOERHAAVE: Elementi di Chimica . T. II.

M A T E R I A M E D I C A .

CRANZ: Materia medica .  
ZUCKERT: Materia alimentaria .

F A R M A C I A M E D I C A .

REZIO: Rudimenti di Farmacia .  
GAUBIN: Del modo di acconciare le formule mediche .  
FARMACOPEA: Austriaco-provinciale .  
TASSA di Medicamenti .  
FARMACOPEA Elvetica .

P A T O L O G I A G E N E R A L E .

LUDVIG: Istituzioni di Patologia .  
——— : ——— ——— Terapia .  
GAUBIO: Instit. di Patologia .  
VAN-SVVIETEN: Comentarj agli aforismi  
di *Boerhaave* per conoscer e curar i  
morbi . T. V.  
SAUVAGE: Nosologia metodica che stabilisce  
PARTE II, H sce

sce le classi , i generi e le specie  
de' morbi .. T. II.

MASSIM. STOLL : Ragion e modo di medicare.  
2. parte .

GORTER : Medicina Ippocratica .

HOME : Principj di Medicina .

VOGEL : Pre-lezioni per conoscer e guarire  
i principali affetti del corpo umano .

CAMPER : Dissertazione de' vantaggi dell'  
inoculazione e suo miglior metodo .

L. B. di STOERCK : Precetti medico-pratici  
ad uso de' Cerusici di Città e di  
villa .

COLLIN : Osservazioni fatte sopra i morbi  
acuti e cronici . Parti V.

TISSOT : Opusculi medici . T. I.

STOERCK : Libretto dello stramonio , ioscia-  
mo e aconito .

———— : ——— del colchico autunnale .

STRACK : Osservazioni medicinali sopra la  
colica de' Pittoni . ( del *Pelton.* )

———— : ————— il  
morbo con petecchie .

TRNKA : Comentario del Tetano .

———— : Storia delle febbri intermittenti .

MORGAGNI ; Delle sedi e cause de' morbi ,  
indagate per notomia .

HUXHAM : Dell' aria e morbi epidemici .

BLANCARDO : Lessico Medico .

CHIRURGIA  
PRATICA,  
O V V E R O  
DOTTRINA SPECIALE  
D E  
MORBI CHIRURGICI.





# PROLEGOMENI

D I

## CHIRURGIA.

**C**HIRURGIA è la scienza che insegna a curar i morbi esterni.

Le dottrine *necessarie* al Chirurgo si dividono in *preparatorie* e in *proprie*.

Le dottrine *preparatorie* sono VIII.

1. Notomia.
2. Igrologia.
3. Fisiologia.
4. Patologia.
5. Dottrina de' medicamenti.
6. ——— degli strumenti.
7. ——— delle fasce.
8. Notizia d'Autori.

Le dottrine *proprie* si dividono in *comuni* ;  
e *peculiari*.

Le dottrine *comuni* sono VIII.

- I. Dottrina delle ferite.
- II. ——— degli ulceri.
- III. ——— de' tumori.
- IV. ——— de' prolapsi ;

II 3

V.

V. \_\_\_\_\_ delle ernie .

VI. \_\_\_\_\_ delle deformità .

VII. \_\_\_\_\_ de' morbi dell' ossa .

VIII. \_\_\_\_\_ delle operazioni .

Le dottrine peculiari sono anch'esse VIII.

I. Dottrina de' morbi degli occhi .

II. \_\_\_\_\_ de' denti .

III. \_\_\_\_\_ venerei .

IV. \_\_\_\_\_ della chirurgia fore-  
se .

V. \_\_\_\_\_ dell' arte ostetricia .

VI. \_\_\_\_\_ de' morbi cutanei .


VII. \_\_\_\_\_ Casuistica .

VIII. della Storia di Chirurgia .

## D O T T R I N A

D E L L E

F E R I T E .



DELLE FERITE IN GENERALE.

**LA ferita** è una soluzion cruenta di parti molli, fatta con istrumento acuto .

Si dividono le ferite in *semplici*, *complicate*, e *mortali* .

Ferite semplici sono quelle, in cui si trovano lesi i soli integumenti comuni .

*Complicate* diconsi quelle, dove oltre gli  
in-

integumenti si trovan insieme offesi gran nervi , arterie , tendini , muscoli od ossa .

Ferite *mortali* chiamansi quelle , che causan la morte o possono causarla .

Queste ferite mortali si distribuiscono in tre ordini :

I. in *assolutamente* mortali .

II. in *per se* mortali .

III. in mortali *per accidente* .

Le ferite *assolutamente* mortali sono quelle , in cui non può il Chirurgo esimer da morte .

Le *ferite mortali per se* diconsi quelle in cui può il Chirurgo esimer da morte .

*Ferite mortali per accidente* sono ferite leggieri , nelle quali sopravviene la morte per error del Cerusico o della persona ferita .

Le ferite *assolutamente* mortali si dividono in V. classi .

I. Quelle che impediscono il liquido nerveo di scorrere dal cerebro alle viscere vitali .

II. Quelle che impediscono la circolazione .

III. la respirazione .

IV. la ~~respirazione~~ *Chilificazione* .

V. Quelle che fanno un' *estravazione* , a cui non si può rimediare .

Alla prima *classe* appartengono le

Ferite profonde del cerebro .

— — — — del cerebello .

Ferite della midolla oblongata .

— della midolla spinale .

— dell'ottavo paio di nervi , e del  
nervo intercostale magno .

Alla seconda *classe* appartengono le

Ferite penetranti del cuore .

— della auricola del cuore .

— de' seni del cuore .

— di tutte le maggiori in-  
terne arterie e vene .

Alla terza classe appartengono le

Ferite che tagliano la trachea .

— de' bronchi .

— grandi de' polmoni .

— del diaframma .

— de' nervi diaframmatici .

Alla quarta *classe* appartengono le

Ferite che taglian l'esofago .

— ascole del ventricolo .

— degl'intestini tenui .

— — — — — grossi .

— della vescica della bile .

— del dotto pancreatico .

— del recettacolo del chilo .

— del dotto toracico .

Alla quinta *classe* appartengono

L'extravasazione nella base del cranio .

— — — — — ne' 4. ventricoli del ce-  
rebro .

— — — — — nello scavo delle verte-  
bre .

— — — — — nel pericardio .

nel-



—— nella duplicatura postica del mediastino.

—— nello scavo celluloso de' lombi.

—— nello scavo della pelvi.

### CURA DELLE FERITE.

Tutte le ferite si sanano per unione o per suppurazione :

Le ferite *di taglio*, per unione.

—— *contuse*, per suppurazione.

### FERITE DI TAGLIO.

L'unione delle ferite si può far in quattro maniere :

1. Con *empiaastro tenace*, col quale si uniscono le ferite *superficiali*.
2. Con *fascia uniente*, colla quale si uniscono le ferite *profonde* e insieme *bislunghe*.
3. Per *cucitura cruenta*, colla quale si riuniscono ferite *profonde* e insieme *trasverse*.
4. Con *fascia espulsiva*, che riunisce ferite *pendole* e *punte*.

### FERITE CONTUSE.

La cura di ferita contusa richiede

1. *Suppurazione* per unguento digestivo, o per balsamo d' Arcèo.
2. *Sanazione* per acqua vulneraria.
3. *Disseccazione* per panno lino lacero, o per allume arso, o bolarmeno, od estratto di saturno.

## FERITE DI PUNTA.

Si dividono in *semplici* e *complicate*. Le *semplici* si nettano con iniezione d'acqua tepida, indi mediante la fascia espulsiva si comprimono dal fondo verso l'orificio.

Ma se nel fondo si forma *ascesso*, bisogna far una contr'apertura del fondo.

Le ferite di punta *complicate* con lesione di vaso, osso o viscera, bisogna subito dilatarle quanto basti a poter applicare medicamenti a queste parti.

## FERITE DI SCHIOPPO.

Si dividono in *penetranti pel membro*, e *non penetranti*.

Le *penetranti pel membro* sono appena sanguinose, s'infiammano affai e tardi suppurano.

La cura si fa I. per *dilatazion degli orificj*.

II. per *digestivi* e cataplasmi emollienti.

Fatta la suppurazione si sanano con *iniezione* d'acqua vulneraria.

Le *non penetranti pel membro* tengono entro di se la palla. Cavata questa, si trattano come le ferite penetranti.

Si cava la palla, dilatata la ferita

I. colle dita;

II. colla forbice;

III. col cucchiajo;

IV. per la contr'apertura, se la palla ha cambiato luogo;

V. col

V. col foratojo, se la palla sta fitta nell'osso.

## FERITE VENENATE.

Frequentissime ferite velenose son quelle che fa un cane rabbioso o una vipera venenata.

La ferita di cane rabbioso si conosce dalla susseguente idrofobia o avversione da bevanda.

Si può prevenir l'idrofobia ch'è per nascere da morso d'animale rabbioso; ma s'è nata, finora non si è potuta curare.

Si previene.

1. Scarificando la ferita, e succiandone il sangue mediante la ventosa.

2. Inspargendovi polvere di cantaridi ( o canterelle ) ad eccitar la suppurazione per alcuni mesi.

3. Dando mercurio gommoso internamente, ed applicando unguento Napoletano esternamente sopra la polvere di cantaridi.

4. Dando internamente polvere di radice di belladonna da sei a dieci grani in ogni due giorni.

Fatta già l'idrofobia, non si è potuto estinguerla, nè con mercurio dato fin alla salivazione, nè con oppio, musco, bagni freddi o caldi, nè con immersione in mare.

Frattanto: anche al punto che sopravviene l'idrofobia, bisogna tentare la

consolidazione e sacificazione del luogo già morso, e non lasciar d'inspergervi la polvere di canterelle; poichè sembra che il velen idrofobo stia ancor nascosto nella ferita, e produca per consenso idrofobia nelle fauci.

La ferita di vipera velenosa reca varj sintomi, subito dopo il morso, come deliquj d'animo, itterizia, palpitation di cuore, dolore e gran tumore del membro morficato, e talvolta cancrena.

Giova *legar* il membro,  
*scarificarlo*,  
*succhiarlo* con ventosa, e  
*lavarlo* con triaca.

Ma non v'è *salute* che nei rimedj *specifici*.  
 Nulla giova nel morso della *vipera d'Italia*, fuorchè un sorso di mercurio gommoso e genziana.

Nel morso della *vipera di Francia* ha giovato *internamente* il sal viperino, ed altri sali volatili alcalini; *esternamente*, l'unguento di sal viperino.

Nel morso della *vipera Inglese* giovò *esternamente* unger il membro con olio d'oliva caldo: *internamente*, bisogna ber di quest'olio una mezza libbra.

Nel morso della *caudifona* ( biscia a sonagli, *Americana* ) si raccomanda la senega e gli alcalini volatili.

Nel morso della *naja* dicesi giovare l'*osier-riza* ( radice serpentina ) e

In

In quello della *vipera Illirica* la triaca internamente ed esternamente.

Nel morso della *vipera Svezzeſe* ſi applican foglie di fraſſino.

Nel morſo delle *veſpe* acqua fredda è l'antidoto eſterno.

## FERITA DI TENDINI.

Si dividono in ferite di tendini *mezzo tagliati*, e *tutto tagliati*.

La ferita del tendine *mezzo tagliato* non cauſa da principio ſintomo alcuno, ma poi grande infiammazione e dolore.

Queſti ſintomi ſi levano col ſalaffo, e con cataplaſma emolliente. Indi ſi applica l'eſſenza maſticina.

La ferita del tendine *tutto tagliato* cauſa immobilità della parte, ſenz' altro ſintomo. Quindi altro non ſi fa, che unire il tendine tagliato, col mezzo di faſce, e di ſito acconcio.

Nella rottura del tendine d'Achille biſogna adoperare per faſcia il *calzar Pe-  
tiziano*.

## FERITE DI NERVI.

Dividonſi in ferite di nervo *mezzo tagliato*, e *tutto tagliato*.

Il nervo *mezzo tagliato* fa ſintomi crudeli, gran dolore, infiammazione, ſpaſmo  
fino

fino di mascella e dorso , e sovente convulsione e morte .

Questi sintomi si sopiscono :

- I. Con replicato salasso ,
- II. Con cataplasma emolliente .
- III. Coll' unguento di balsamo di Arcèo con oppio .
- IV. Con l' uso interno d' oppio e di mercurio gommoso .

Il *tetano della mascella* esige unzion mercuriale fino a salivazione .

Se queste non levan lo spasmo , si tagli totalmente il nervo leso ; e se anche ciò non basta , si tronchi il membro .

Il nervo *interamente* tagliato fa immobilità e insensibilità della parte . Questi sintomi durano in vita , benchè la ferita sia sanata .

## F E R I T E D I V A S I .

La lesion dell' arteria è di tre sorte : *mezzo taglio , taglio intero , e lesion superficiale .*

Dalla *lesion superficiale* , o della sola membrana esterior dell' arteria , può nascere non che un' emorragia , ma un aneurisma vero .

Dall' arteria *mezzo tagliata o interamente tagliata* ne segue un' emorragia enorme .

Si ferma l' emorragia dell' arteria lesa ,

I. Con

I. Con *medicamenti astringenti*, come  
alcohol di vino, olio di trementina,  
acqua Tedianà, pannolino sfilacciato.

II. Per *compressione*, con pezzoline gradate,  
fungo agarico,  
carta sugante  
masticata;  
compressorio.

III. Per *legatura* con ago e filo.

IV. Con *cauterio ignito*.

In lesione dell'arteria maggiore di rado bastano i *medicamenti*.

La *compressione* elige, che di sotto vi sia un osso.

Il *cauterio ignito*, caduta la crosta arsa, ammette una nuova emorragia; e perciò

La *legatura* è dell'emorragia rimedio certissimo.

Dove l'arteria sta attaccata al *canal osseo*, sovente si ferma l'emorragia con soprapporvi cera e dilacerare con istilo l'arteria.

## FERITE DI ARTICOLAZIONI.

Si dividono in *penetranti*, e non *penetranti*.

Le ferite *penetranti* si conoscono coll'occhio, con lo stilo, e per l'efflusso del liquido sinoviale.

Si seda l'infiammazione con fomenti risoluti.

solventi e col salasso ; poi si cura la ferita con ispirito di vin masticino o con polvere balsamica .

## FERITE DI OSSA.

Le ossa *nudate* o *lese* si legano con ispirito di vin masticino , affinchè non diventino cariose per l'aria fredda , per medicamenti pingui , o per la marcia della ferita . Lo stesso spirito masticino sana le ossa *ferite* .

## FERITE DI VASI LINFATICI.

Si conoscono dalla linfa che ne gocciola . Il flusso della linfa *si cura* con acqua Tedi-  
diana o con estratto di saturno .

## FERITE DI CAPO.

Si dividono in *penetranti* e *non penetranti* .  
Le une e l'altre sono *semplici* o *com-  
plicate* .

Si complicano , 1. con *lesione del cranio* .  
2. con *commozion di cere-  
bro* .  
3. con *effusion di sangue* , o  
4. *lesion di cerebro* .

La *ferita esterna* del capo , cioè senza le-  
sion del cranio , si cura come l'altre  
ferite .

Le *ferite del cranio* si dividono in *acute* e  
*contuse* .

Le



Le ferite *acute* sono 5.

1. *Sede* è una ferita esterna che penetra la tavola del cranio.
2. *Incisione* è una ferita che penetra alla diploe del cranio.
3. *Percussione* è una ferita che penetra l'una e l'altra tavola del cranio.
4. *Diasope* è una ferita che obliquamente penetra fin nella diploe.
5. *Dedolazione* è una ferita che porta via parte della tavola esterna.

Poichè la ferita esterna accompagna queste lesioni del cranio, facilmente con l'occhio e collo stilo si conosce la lesion del cranio. Si cura con ispirito masti-  
cino.

Le ferite nel cranio *contuse* sono 16.

1. *Denudazione* o contusione, per cui s' apparta dal cranio il pericranio, o la dura madre.
2. *Edra* è una rima o crepatura che penetra la tavola esterior del cranio.
3. *Rima* è una crepatura che penetra insin nella diploe.
4. *Fessura* è una rima che penetra insino per la tavola intima.
5. *Fessura della tavola interna*, cioè, senza lesione della tavola esterna.
6. *Contrafessura* è una fessura del cranio in altro luogo da quello che fu contuso.
7. *Festuca esterna* è una contusion di cranio, che porta via una particella della tavola esterna.

8. *Fe-*

8. *Fessuca della tavola interna* è staccarsi una particella dall' interna tavola del cranio .
9. *Frattura* è una fessura del cranio, la quale molto boccheggia.
10. *Impressione con frattura*, come si osserva negli adulti :  
o *senza frattura* , come avvien negli infanti .
11. *Camarosi* è un' elevazion delle parti fratte .
12. *Appropinquazione* è dove nella frattura una parte sta sopra l' altra .
13. *Diafasi di sutura* è quando la sutura del cranio dista da se a vicenda boccheggiando .
14. *Jattura di sostanza* è dove un frammento del cranio è portato via .
15. *Contusione* quando è stritolata l' esterna superficie o la diploe del cranio .
16. *Evvi carie* , quando si corrode la sostanza del cranio .

Le *visibili* lesioni del cranio si conoscono a occhio , o con lo stilo .

Ma le *invisibili* , o quando non v'è ferita di parti molli , si conoscono dall' infiammazione del luogo contuso , la quale non cede a verun rimedio , e circa il settimo giorno va in suppurazione .

La *cura* del cranio leso e coperto esige incision delle parti contuse , o denudazion del cranio offeso . Il cranio

nio offeso si cura con essenza masticina .

Bisogna cavar fuora i *frammenti* e le *festuche* del cranio .

Quasi tutte le lesioni di cranio *complicate* soglion essere con effusion di sangue o con commozion di cerebro . Queste si debbon conoscere dai sintomi interni .

L'*effusion di sangue* e la *commozion di cerebro* hanno da principio sintomi quasi uguali , mentre i feriti subito cadono , sen giacciono senza senso o moto , sovente vomitan bile , mandano sangue dalla bocca , dall' orecchie e dal naso , si convolgono , o son paralitici .

Se questi sintomi vengono da sola *commozione di cerebro* , svaniscono in 24. o 48. ore , quando vi si adoperino più salassi , enemî solutivi , e fomenti di spezie cefaliche infuse in vino , o si faccia una *fomentazion frigida* ( che giova più di tutto ) sul capo , rasî i capelli .

Ma se nel terzo giorno que' *sintomi* non s' allentano , anzi crescono , allora è segno di *effusion di sangue* . Quindi subito nel luogo offeso del cranio si faccia trapanazione , acciò che n' esca il sangue *diffuso* ; o che si possa alzare il cranio impresso .

Talvolta , *piccole* effusioni di sangue non fan

fan da principio alcun sintomo . Ma ; putrefatto il sangue diffuso , ne ven-  
veno , il 17mo o 20mo dì , gravi sin-  
tomi di cerebro infiammato . Anche  
allora si dee far la trapanazione , ben-  
chè questa in simil caso di rado salvi  
l'infermo .

Colla trapanazione non si può cavar fuori  
la sede del sangue diffuso ne' ventri-  
coli del cerebro , o nella base del  
cranio , o sopra corpo calloso . E per-  
ciò quest' effusione è assolutamente  
mortale .

La *ferita del cerebro o del cerebello* , che  
non sia profonda , si può sanare con  
ispirito masticino , o col balsamo del  
commendatore . Ma sono assolutamen-  
te mortali le ferite profonde del cere-  
bro o del cerebello .

Agl' *infanti* può senza frattura *imprimerfi*  
il cranio . Se con ventosa di vetro  
non si può alzar l'impressione , si la-  
sci tutto alla natura ; perchè il più  
delle volte i sintomi spontaneamente  
svaniscono .

Ma negli *adulti* il cranio *impresso* con frat-  
tura esige trapanazione , affinchè si  
possa con l'elevatorio sollevare la par-  
te impressa del cranio .

La *contraffessura* si conosce al *moto automa-  
tico* dell'infermo , al *rossore* del luo-  
go diverso dalla contusion del cranio ,  
e al *luogo* contuso e intero del cra-  
nio .

nio. In contraffessura si fa la trapanazione non nel luogo contuso, ma nell'opposto, e indicato dal rossore o dal moto automatico.

## FERITE DELLA FACCIA.

*Divisione, in semplici e complicate.*

La ferita del *sopracciglio* può cagionar cecità.

La ferita della *cornea* dà un efflusso di umor acqueo, il quale, sanata la ferita, rimette. L'unione si fa coll'occhio chiuso e legato; l'infermo dee giacer supino.

Se dalla ferita dell' *albuginea* scola gran porzione di umor vitreo, ne segue cecità. Si cura come sopra.

La *lingua semi-squarciata* si sana con lavatura di vino, tintura di mirra, e miel rosato.

La ferita della *bocca*, complicata con lesione del dutto salivale, si conosce dall'efflusso di copiosa saliva: ne resta una *fistola salivale*.

## FERITE DEL COLLO.

*Sono semplici, o complicate.*

La ferita di *trachea* semisquarciata si debbe riunire con sanguinosa cucitura degli integumenti, se la ferita è grande; ma s'è piccola, si unisce mediante un empiaastro.

La

La trachea squarciata *affatto* non si può riunire , e perciò la ferita è assolutamente mortale .

La ferita dell' *esofago* in luogo , dove arri-  
vi la mano del chirurgo , è curabile .

Una *total* rottura dell' esofago è assolutamente mortale .

La ferita nel *nervo recorrente laringeo* fa paralisi di lingua , e perdere la loquela .

## FERITE DEL TORACE.

Si dividono in *penetranti* , e *non penetranti* .

Le penetranti sono *semplici* , o *complicate* .

Si complicano 1. con lesione dell' arteria  
intercostale .

2. ——— del polmone .

3. — effusion di sangue .

5. — lesion del cuore , o  
del diaframma .

La ferita *semplice* penetrante si riunisce  
con empiaastro vulnerario disteso sur  
una pelle .

La ferita *penetrante doppia* , per cui l' aria  
entra nell' uno e nell' altro scavo del  
torace , soffoca di botto l' infermo .

Ferita *penetrante* con lesion dell' *arteria in-  
tercostale* . La lesione di quest' arteria  
nella parte posteriore è assolutamente  
mortale ; nella parte laterale e an-  
teriore del torace , *per se* mortale ;  
potendosi con ago curvo legare sopra  
la costa .

Fe-

*Ferita penetrante complicata con effusion di sangue nello scavo del torace.*

*Segni del sangue diffuso nello scavo del torace*, sono l'angoscia e la suffocazione, se il malato giace sul lato sano.

Il sangue diffuso si cava 1. facendò stare il malato sopra la ferita; 2. con paracentesi alla terza costa infima.

Se poi attesa la strettezza della ferita, e la spessezza del sangue coagutato, il sangue non può scolare, si dilati la ferita con iscarpello capitato, e con iniezione d'acqua melata si dilavi il sangue, acciò possa uscire.

*Ferita penetrante complicata con lesion di polmone.*

I segni sono, *sputo* di sangue spumoso, e *suffocazione*.

Le *picciole* ferite di polmone si debbon lasciare alla natura, ma cavato prima il sangue diffuso nello scavo. Le ferite di polmone *grandi* sono assolutamente mortali, o ammazzano per tifica.

Le ferite del *cuore*, che gli penetrano nello scavo, sono prestissimamente mortali: non lo son subito quelle che gli stanno nella sostanza carnea: Ma talora dopo qualche tempo nasce aneurisma di cuore.

*Ferita del diaframma*. Se il visco addominale per simil ferita penetra nello sca-

scavo del torace, la ferita diventa assolutamente mortale; altrimenti, no. Effusion di sangue, o d'altro umore, nello scavo del pericardio, o nello scavo postico del mediastino, è assolutamente mortale.

## FERITE DELL' ADDOMINE.

Si dividono in *penetranti*, e *non penetranti*.  
 Le *penetranti* sono *semplici*, o *complicate*.  
 Le *ferite non penetranti* si riuniscono con fascia uniente, o con empiaastro.  
 Le *ferite penetranti semplici* si riuniscono con cucitura cruenta o per *gastrorafìa*.  
 Le *ferite penetranti* posson esser complicate;

1. con *incarcerazione*,
2. — *corruzione* e
3. — *lesione di viscere prolapse*,  
cioè dell' omento e degl' intestini.

Se per istrettezza di ferita le viscere sono *incarcerate*; bisogna dilatar la ferita, ripor le viscere, e unir la ferita per *gastrorafìa*.

Se gl' intestini son offesi, allora o sono *punti*, o *mezzo squarciati*, o *interamente tagliati*. Gl'intestini *punti* si lasciano alla natura. Gli altri si debbon cucire sopra un cannello di carta da giuoco; e questa cucitura cruenta si chiama *enterorafìa*.

Se l' *omento* è *cancrenoso*, bisogna senza le-



legatura tagliarlo via. Se gl'intestini prolapsi sono pur cancrenosì, bisogna egualmente tagliarli via, e cucirne per enterorafia le parti sane.

Se non si può far euterorafia, bisogna dalla superior porzione dell'intestino formare un *ano artificiale*.

L'*effusion* degli umori nello scavo dell'addomine esige una nuova incisione nella parte bassa dell'addomine, se, giacendo il malato sopra la ferita, per essa non escono.

Si giudica assolutamente letale quell'*effusione*, la cui scaturigine non si può fermare; e così pur quella ch'è nello scavo della pelvi, o nello scavo cellulare de' lombi fuori del peritoneo.

## DELLA CONTUSIONE.

La *contusione* è uno smiuzzamento de' vasi minimi subcutanei, il quale fa *sugillazione* o macchia turchina.

La *sugillazione* è un'effusion di sangue sotto la cute. Si conosce dal tumor livido, e dalla precedente causa contundente.

Si cura 1. con *fomenti* d'ossicrato, o di vino acquato, in cui si fan cuocer erbe risolventi semplici o cefaliche.

2. Con *salassi*. 3. Con *purganti*. 4. Con incision della cute per farne uscir il sangue per la ferita, se di esso v'è troppa effusione.

PARTÈ II.

I

DOT.

# D O T T R I N A D E G L I U L C E R I



## D E G L I U L C E R I I N G E N E R E .

**L' ULCERO** è una soluzione del continuo lenta , e purulenta , per lo più da causa interna .

E' causa *interna* ogni acrimonia , falsa , acida , venerea , scorbutica , scrofolosa , scabbiosa , variolosa , o cancerosa .

Sono cause *esterne* gli applicati vescicatorj , le ferite , le contusioni , e le infiammazioni , che vanno in suppurazione .

Gli ulceri si dividono in *semplici* , e *complicati* .

*Semplice* è quello ch' è puro . *Complicato* quello che ha impurità , carne fungosa , callo , carie , vermi , o qualche acrimonia .

La cura esige I. *purificazione* ,

II. *incarnazione* ,

III. *cicatrizzazione* .

La *purificazione* si fa con medicamenti esterni deterfivi , e con interni che specificamente levano l'acrimonia .

L' *incarnazione* si fa con acque vulnerarie , o balsami vulnerarj .

La *cicatrizzazione* si ottiene con disseccanti ,

ti, come panno lino sfilacciato , polvere disseccante, estratto di saturno , ed allume arso.

## ULCERO SEMPLICE.

Egli non esige che *incarnazione e cicatrizzazione*.

## ULCERO SINUOSO.

Il *seno* è un ulcero nascosto sotto la cute , il cui orificio è angusto , ma non calloso .

Il *seno purulento* si cura

1. per *injezione* d' acqua vulneraria ; poi si comprime con isplenioli graduati , e con fascia ;
2. o se la compression non riesce , bisogna far una *contr' apertura* del fondo purulento , o se questa non si può fare , allora si faccia
3. *dissezione* intera di tutto il seno purulento .

Indi si cura l'ulcero , come le ferite semplici .

## ULCERO FISTOLOSO.

La *fistola* è un ulcero profondo , il cui orificio è angusto e calloso .

La *cura* esige , che si levi il callo , e poi si curi il *seno* profondo .

Si toglie il callo 1. tagliandolo , via ovvero  
1      2      2. Col

2. col mezzo d' un *caustico*, come butiro d' antimonio.

*Levato il callo*, si cura il seno purulento nel modo accennato di sopra.

Per lo più, giova *squarciare* tutta la fistola in modn, che la ferita si faccia aperta.

## ULCERO FUNGOSO.

E' un ulcero, la cui superficie è assediata da *carne fungosa*.

La carne fungosa 1. o assedia *tutta la superficie*.

2. o quinci e quindi forma nella superficie *papille fungose*;

3. o cresce in un *gran fungo* tutta la superficie.

4. E se la carne fungosa *duole* assai e illividisce, si chiama *cancrecente*.

Se *tutta* la superficie è fungosa, bisogna consumarla con allume arso.

Se non v'è che *papille fungose*, si tocchino queste colla pietra infernale.

Se v'è *fondo alto*; bisogna levarlo con legatura o con coltello.

La fungosità *cancrecente* si consuma con polvere di *flamula jovis*, o con olio *caustico di canfora*.

UL-

## ULCERO LARDACEO.

Egli è ulcero, la cui superficie è fordida ,  
e bianca come il *lardo* .

Si leva il *lardo* con unguento fusco , o egi-  
ziaco .

Ma se l'ulcero è *venereo* , ivi s'insperge  
mercurio dolce , o precipitato rubro .

Levata la superficie lardacea , si cura come  
l'ulcero semplice .

## ULCERO SCORBUTICO.

E' ulcero che nasce da acrimonia scorbutica.

*Segni di scorbutico* sono le gengie cruenta e  
fungose , macchie livide su le gambe ,  
e lassitudine di ginocchia .

Le stesse *ulcere* sono livide , e d'ordinario  
fungose .

*Esternamente* giova l'acqua di calce , o  
acqua vitriolica con sughi antiscorbu-  
tici . . . .

*Internamente* , si dà siero di latte , o bro-  
detto con sughi antiscorbutici , e frut-  
te mature .

In *tempo d'inverno* si dà birra di rafano ,  
o mosto di malto , o conserve anti-  
corbutiche .

Le cose *mercuriali* nuocono agli scorbuti-  
ci .

La *stomacace* , o *scorbuto di gengie* , esige  
lavatura con decotto di china , sal-

via , tintura di mirra , spirito di sale  
e miel rosato .

## ULCERO VENEREO.

L'ulcero che nasce da acrimonia venerea ,  
Si *conosce* dai presenti o precedenti altri  
morbi venerei , come , da ulcerazion-  
celle della ghianda , da gonorrea , bub-  
boni , condilomi , tufi , cefalei nottur-  
ni , dolor osteocopo esacerbato di not-  
te , macchie veneree nella fronte .

La *Sede* di questi ulceri è frequentissima  
nelle fauci , nella fronte , nella ghian-  
da , nel prepuzio della ghianda , nell'  
anguinaja , nella vagina .

Si *curano* esternamente con acqua fagede-  
nica , balsamo mercuriale , o soluzio-  
ne acquosa il solimato .

*Internamente* si dà , in tutt' i morbi vene-  
rei , mercurio gommoso fino a gr. xx.  
con decotto di legni , di salsapariglia  
o di bardana .

## ULCERO CANCEROSO.

Egli nasce da acrimonia cancerosa .

E' di tre sorte , *glandulare* , *nervoso* , *fun-  
goso* .

Il *cancero glandulare* nasce da scirro esul-  
cerato ; ha labbia riverse , fungose , e  
di lurido colore ; duole e puzza .

Il *cancero nervoso* nasce per lo più da ver-  
ruca

ruca o tubercolo irritato della faccia ;  
egli mangia largamente la cute , e  
senza fungosità .

Il *cancero fungoso* forma un gran fungo ,  
che duole assai , arde e puzza .

Lo *specifico* del *cancero* è cicuta esterna-  
mente e internamente adoperata .

*Esternamente* quest' erba si applica cotta in  
fomento o cataplasma , o pur l'estratto  
soluto in acqua di calce .

*Internamente* si dà l'estratto in gr. x. due  
volte al dì , in pillole .

Nel *cancero fungoso* vi si spruzza anche  
polvere di *flamula jovis* , o di soprav-  
vivolo acre .

## ULCERO CARIOSO.

Quello , in fondo del quale l'osso è cor-  
rotto e coperto di carne fungosa .

La carie si conosce dal rancido fètor dell'  
ulcero ; dalla nericante marcia , e dal-  
lo stilo intruso per la carne fungosa .

L'ulcero carioso non si può guarire , se  
prima non gli si levi la carne fungo-  
sa . Ma circa la sanazion della carie  
veggasi la dottrina de' morbi dell' ossa .

## ULCERO INVETERATO .

L'ulcero già fatto *vecchio* non si cura sen-  
za pericolo , a disseccarlo subito . In-  
*ternamente* si applichi nitro canforato , e

cose che purificano il sangue : *Esternamente* acqua vulneraria con mucilagine canforata .

### ULCERO CANCRENOSO .

Quello che subitamente si fa livido , fetido , lasso e insensibile , diventa *cancrenoso* .

*Internamente* ogni due ore si dà china ʒj. con canfora o vino . *Esternamente* si applica un fomento antisettico di ruta , china , canfora e vin rosso .

### ULCERO VERMINOSO .

Negli ulceri s'aminazzano i *vermi* con olio di trementina , con ispruzzo di mercurio dolce , con essenza d'aloë . o con elissir di vitriuolo .



# DEGLI ULCERI IN SPEZIE.



## ULCERI DEL CAPO.

**A**SSAI frequenti ulcere del capo sono la *scabbia* e la *tigna*. Vedi i morbi della cute.

## O Z E N A.

E' *ulcero* maligno nella nari . Quest'è o *canceroso*, o *venereo*, o *cariofo*.

Si cura con iniezione nelle nari, varia secondo la diversità dell'ulcero.

## ULCERO DEL MEATO UDITORIO.

Si conosce dal *flusso d'orecchia* purulento . Talvolta v'è questo flusso purulento, senza *ulcero*.

Nell'uno e l'altro caso facciano purificanti iniezioni di decotto di ruta con miel rosato.

## FISTOLA SALIVALE.

E' una *fistola*, nell'esterna superficie della bocca, la quale ha origine da lesione nel dutto salivale.

I 5

Si

- Si cura 1. perforando la bocca con ago grosso, e
2. facendovi entrare un filo incerato, che si fa uscire per la fistola dalla bocca.
  3. Reso calloso l'interno orificio della bocca, si sana l'esterno orificio della fistola.

### FISTOLA MASCELLARE.

Spesso da dente *carioso* nella mascella superiore o inferiore nasce una *fistola*, la quale, cavato prima il dente carioso, si sana facilmente; ma se quello non si cava, ella è insanabile.

La *fistola* della *mascella superiore*, proveniente da ulcero dell'*antro Igmoreano*, si cura I. cavato mezzo dente molare superiore, II. fatta perforazione dell'alveolo, e III. con *iniezione* d'acqua vulneraria per l'alveolo nell'antro e' Igmoreo.

Per l'*iniezione* serve anche il decotto di ruta con essenza di mirra e di mele rosato.

### ULCERI DELLE FAUCI.

Per lo più sono venerei: in questi si danno *esbernamente* gargarismi mercuriali.

## A. F. T. E

Sono parve *ulcerazioncelle* albicanti della bocca, della lingua e delle fauci.

Negl'infanti si curano con acqua vitriolica con mel rosato.

Le afte *scorbutiche* si curano, toccandole ogni dì con un pennello tinto di spirito di sale col mel rosato.

## ULCERI DEL COLLO.

Gli esterni ulceri del collo sono, per lo più, *scrofolosi*.

*Internamente* si danno medicamenti *antisfrofolosi*.

## FISTOLA DEL TORACE.

Quelle *fistole*, che derivano da ascesso di polmone o da empiema del torace, non si debbon curare, se prima non si curi l'ulcero de' polmoni.

Così è pure delle *fistole addominali*.

## FISTOLA DELL' ANO.

È un ulcero sinuoso o fistoloso dintorno al intestino retto.

La fistola dell'ano si divide in completa,

-- esterna, e

-- interna.

**Completa** dicefi quella che ha due orificj intorno all' ano ; uno nell' intestino retto , l'altro esternamente nella cute. **Ella si conosce** , ficcandovi lo stilo , dalla feccia che n' esce per l' orificio esterno . . .

**Si cura** con una sola operazione , che consiste nell' interno taglio di tutte le parti situate sotto la fistola .

**Fistola dell' ano esterna** si è quella , che ha un orificio nella cute esterna dell' ano , senza orificio nell' intestino retto .

**Si conosce** dallo stilo che non penetra nello scavo dell' intestino retto , e da non uscir feccia alcuna per l' orificio esterno .

**Si può tentar la cura** con iniezioni detergenti , ma di rado giovano : la sola operazione giova .

**Fistola dell' ano interna** è quella che ha orificio nell' intestino retto ; ma niuno nella cute esterna intorno all' ano .

**Si conosce** 1. dalla marcia ch' esce dall' intestino retto avanti o dopo la deposizion della feccia . 2. Da tumor purulento , o macchia rossa esterna circa il giro dell' ano . 3. E talvolta ficcando il dito nell' ano .

Anche questa rarissime volte **si cura** con iniezioni . Ma si cura 1. con *incisione* dell' ascesso esterno . 2. Coll' interno taglio dell' intestino retto e di tutte le parti soggiacenti .

Fat-

Fatta l'operazione, vi resta la ferita, che si fana come l'altre.

## FISTOLA DEL PERINEO.

Ell' ha *origine* da erosion d'uretra, o di vescica urinaria.

1. Si lascia nell' uretra e nella vescica per lungo tempo il *catetere* o la candeletta cava, acciò perpetuamente non ne stilli orina per la fistola ad impedire la sanazione.

2. Se v' è callo, si levi con caustico.

2. Finalmente con acqua vulneraria si fani l'ulcero.

Nelle donne è incurabile la *fistola urinaria* aperta dall' uretra alla *vagina*, se dopo il parto non vi si applichi il catetere o la candeletta cava. Contro lo stillicidio dell' orina si applica lo strumento compressorio.

## D O T T R I N A

## D E' T U M O R I .

\*\*\*\*\*

 D E' T U M O R I . I N . G E N E R E .

**IL** *tumor* è un rialto preternaturale in qualche parte del corpo .

In generale *si dividono* i tumori in *calidi*, e *frigidi*.

*Calidi* si chiaman quelli che nascono da infiammazione : *frigidi* quei che dipendono dall' altra causa .

Per la materia contenuta *si dividono* i tumori in 18. classi, come :

1. Tumori infiammativi .
2. ——— purulenti .
3. ——— cancrenosì .
4. ——— indurati .
5. ——— acquei .
6. ——— sanguinei .
7. ——— cistici .
8. ——— escrescenziali .
9. ——— ossei .
10. ——— articolari .
11. ——— terrei .
12. ——— aerei .
13. ——— salivali .
14. ——— biliosi .
15. ——— lattei .
16. ——— urinosi .

17. — er-

17. ——— *erniosi spurj.*18. ——— *organici.*

## I. C L A S S E.

## TUMORI INFIAMMATIVI.

I tumori, che nascono da infiammazione, si dicono *infiammativi*.

*Si conoscono dal rossore, calore, dolore, e tensione.*

*Causa prossima dell' infiammazione è lo stimolo esterno o interno, che irrita i nervi de' vasi.*

*Fa da stimolo esterno la ferita del nervo, la contusion, l'ambustione, il gelo, la frattura, la lussazione, il vesicatorio od altra cosa acre applicata.*

*E' stimolo interno l'acrimonia (fermata in qualche parte); venerea, scorbutica, variolosa, biliosa, putrida, o specifica.*

*L'esito dell'infiammazione è di quattro sorte: Risoluzione, suppurazione, indurazione, o cancrena della parte infiammata.*

*Si predice risoluzione, quando il tumore e i suoi quattro primarj sintomi appoco appoco s'allentino.*

*Si predice suppurazione, se quei quattro sintomi vanno a passo a passo crescendo, e la medietà del tumore diventa più molle.*

• Si

Si predice *indurazione*, se i sintomi *a poco a poco* cedono, ma cresca la *tensione* del tumore.

Si predice *cancrena*, se tutt' i sintomi *subitamente* si rallentano, e se nella parte infiammata succede *freddo* in luogo del calore, *lividità* in luogo del rossore, *insensibilità* in luogo del dolore, *floccidità* in luogo della tensione.

La cura dell' infiammazione richiede

1. salasso, e

2. fomento di ossicrato, o

—— di vino acquato;

—— d' acqua vegeto-minerale, o

—— d' erbe resolventi.

Le *specie* de' tumori infiammativi sono *comuni*, o *proprie*.

Le *comuni* sono: *Flemone*.

*Furunculo*.

*Risipola*.

*Tumor pestilenziale*.

*Pedignone*.

*Ambustione* (o scottatura.)

Le *proprie* sono: *Oftalmia*. Vedi *Morbi de' denti*.

*Angina*.

*Purulide* ( nelle gengie. )

V. *Morbi de' denti*.

*Parotide*.

*Infiammazion di mamma*  
di *testicolo*.

Fi.



*Fimosi.*

*Parafimosi.*

*Bubbone.*

*Panereccio.*

## F L E M M O N E.

E' un' infiammazione della *membrana adiposa*.

Si divide in *flemmone circoscritto* e *esteso*.

Il *circoscritto* forma un tumore grande al più come uovo di gallina, e per lo più si fa postema.

Dunque la *cura* esige, che si promuova la suppurazione con empastro diachilon e cataplasma emolliente.

Ma il *flemmone esterno*, che della membrana adiposa fa un'ampia infiammazione che occupa quasi tutta la parte, come si osserva in fratture e contusioni, si può agevolmente risolvere con fomenti risolutivi e con cavate di sangue.

## F U R U N C O L O.

E' un' infiammazione della *glandula subcutanea*.

Si conosce dal tumor infiammativo, grande al più come uovo colombino.

Di rado si solve. D'ordinario, ma tardi, si fa postema. Quindi

La *cura* esige supputanti.

R I.

## R I S I P O L A .

È un' infiammazion della *cute* per deposizione di acrimonia biliosa .

*Si conosce* dal tumor largo , dal color di rosa che svanisce a premerlo col dito , e dalla febbre che precede .

*Si cura* con purganti e con esterni fomenti di farine risolutive e con fiori di sambuco .

Le cose pingui e repellenti son nocive nella risipola ; le *pingui* fanno suppurazion cancerosa ; le *repollenti* portano il morbo alle viscere vitali .

La risipola *repulsa* si richiama con vescicanti , con sinapismi applicati alla parte dove prima era il male , e con purganti .

## TUMOR PESTILENZIALE .

È un tumor infiammativo , duro , che viene da contaminamento di peste .

*Si conosce* dall' attual epidemia pestilenziale .

Nasce nell' anguinaja , sotto le ascelle , e in altri luoghi .

La soluzione e la ritirata del tumor è mortale . Quindi , tosto ch' è matura , si dee moverlo a suppurazione , e poi aprirlo con coltello , e con pietra caustica .

. P E .

## P E D I G N O N E .

È tumor infiammativo , prodotto da gelo .

*Si conosce* soprattutto ne' piedi , nelle mani , o nella punta del naso .

Va in suppurazione o in cancrena , se vi si applichino medicamenti calidi .

Si cava dalla parte il *freddo* con sopraporvi neve , o con acqua fredda . Indi si cura con unguenti nervini e pingui ; come , *unguento da pedignoni* .

## A M B U S T I O N E .

È tumor infiammativo prodotto dal fuoco .

*Si conosce* da causa precedente .

Il dolor e l'ardore si sopisce con acqua fredda ; poi si cura con unguento albo .

## A N G I N A .

È infiammazion di *fauci* .

Si divide in *visibile* , e *invisibile* .

La *visibile* ha la sua sede nelle *amigdale* , dell' *uvola* , nel *velo palatino* , o nella *faringe* ; e quest' *angina* si conosce dall' *inspezion* delle *fauci* .

L' *invisibile* sta nella *laringe* o nella *trachea* .

Per *inspezion* delle *fauci* non si può veder l' *infiammazione* , ma si conosce dalla voce roca , e dalla difficile *respirazione* e *deglutizione* .

La

La *visibile* non è sì pericolosa , quanto la invisibile che sovente soffoca il malato .

Nell'una e nell'altra specie bisogna tentar di *solvere* l'infiammazione

1. con replicati *salassi*;
2. con *purganti eccoprotici*; o con *enemi* di sal amaro , se l'infermo non possa inghiottire ;
3. con *cataplasmi emollienti* , e insieme *irritanti* , di seme di lino e senape ;
4. con *gargarismi risolvanti* , come
  1. di *ossicrato* con mel rosato ;
  2. di *acqua vegeto minerale* ; e
  3. di *decotto* di specie *risolvanti* con nitro e mele rosato .

Con questi gargarismi il malato si può gargarizzare , o da se , o col mezzo della iniezione .

Se con questo metodo non isvanisce l'angina , e se cadesse il malato in soffocazione ; allora subito bisogna procedere al *taglio della trachea* .

Se poi l'*Angina* delle *fauci* andasse in suppurazione , allora si usino *gargarismi emollienti* di fichi ed erbe emollienti cotte in latte , finchè la postema si rompa da se nelle fauci .

Ma se questa postema o ascesso minacciasse soffocazione , allora bisogna aprire la lancetta occulta , che si chiama *faringotomo* .

Se l'angina passasse in *cancrena* , e vi fosse-

fossero nelle facci macule nereggianti, con gran debolezza; allora si applichi un *gargarismo antisettico* di china, ruta e canfora. *Internamente*, e da principio, si danno vomitivi, poi antisettici.

Se l'*angina delle gangole* andasse in iscirro o indurazione, allora si dà esternamente un *gargarismo* di cicuta cotta in latte, e internamente un estratto di cicuta.

L'*angina venerea*, che forma gli ulceri lardacei delle fauci, esige internamente mercurio gommoso, esternamente un *gargarismo mercuriale* fatto di decotto di falsapariglia, mercurio dolce, e miel rosato.

Dunque da tutto ciò si vede, che l'*angina* si può comodamente dividere in, 1. *infiammativa*, 2. *suppurativa*, 3. *cancerosa*, 4. *scirroso*, e 5. *venerea*.

## P A R O T I D E .

E' *infiammazione* della glandula parotide. Viene spesso criticamente ne' morbi acuti.

La *parotide metastatica* non si dee risolvere, perchè ritornerebbe il morbo acuto; ma subito bisogna promuovere la suppurazione con empiastri emollienti e simili cataplasmi, ed aprire la fatta *postema* con caustico o lancetta.

IN-

## INFIAMMAZIONE DI MAMMELLA.

*Tre sono le sedi di questa infiammazione, la cute, la pinguedine, le glandule mammarie.*

1. La *cutanea* facilmente si risolve:
2. Più difficilmente la *pinguedinosa*, ma ella va facilmente in suppurazione.
3. La *glandulare*, che fa profondi tubercoli calidi, sovente va in iscirro.

*La cura esige soluzione, la quale si fa come in altri luoghi,*

1. con *fomenti resolutivi secchi ed umidi*,
2. col *salasso*, e
3. con *leni purganti*.

*Circa l' infiammazione de' testicoli, la fimosi, la parafimosi, e i bubboni, veggansi i morbi venerei, e circa la parulide, i morbi dei denti.*

## P A N E R E C C I O.

*Panereccio, Pateroccio, o Paronichia, è un' infiammazione in cima della dita della mano o del piede.*

*Quattro sedi egli ha;*

1. *negli integumenti comuni.*
2. *nella vagina de' tendini.*
3. *nel periostio.*
4. *nella polpa sotto l'ugna.*

*I segni del panereccio cutaneo sono una visibile intumescenza infiammativa.*

*I se-*

I *segni* di panereccio nella *vagina del tendine* sono un piccol tumore , e un dolor grande che va fin al condilo dell'umero .

I *segni* di panereccio nel *perioftio* sono un tumoretto , e un gran dolore , che si stende fin nell'ascella .

I *segni* del panereccio *sotto l'ugna* sono dolor , e rossore conspicuo sotto l'ugna .

*Prognosi* , Il panereccio *cutaneo* non è pericoloso . Quello del *tendine* spesso fa lunghi seni purulenti , i quali occupano nella vagina del tendine fino alla palma della mano . Il panereccio del *perioftio* fa sovente carie di falange ; e quello *sotto l'ugna* fa corruzione e caduta d'ugna .

La *cura* vuole , che si risolva l'infiammazione *principiante* ; il che si fa con *bagno del dito in acqua vegeto minerale* , o con *fomento* d'erbe risolutive .

Se non avvien *risoluzione* in 24. ore , bisogna subito promuovere la *suppurazione* con empiastro diachilon e cataplasma emolliente , e dopo 24. ore far incision dell'acceso .

Si faccia *incisione* longitudinale , e in quello stesso luogo dove cominciò il primo dolore .

Se già vi fossero lunghi *seni purulenti* nella vagina del tendine , si aprano tutti questi col solco e col coltello .

Se v'è già *carie di falange* , si applichi pol-

polvere masticina , o spirito masticino  
Talora con forcipe si può estrarre tutta la falange cariosa , e così più presto sanare si fatte ulcere .

Se l' *ugna corrotta* non va via da se , bisogna ogni dì andarla schiantando quanto si può . Perchè se non si leva l' *ugna corrotta* , non si sana l' *ulcero* .

## II. CLASSE.

### TUMORI PURULENTI.

I tumori , che in se contengono marcia ; diconsi *tumori purulenti* , o *ascessi* .

Quì appartengono

1. gli *Ascessi*, o *Posteme* ,
2. Il *Tumor metastatico* o *critico*, e
3. l' *Empiema* .

### A S C E S S O .

Nascono gli *ascessi* da precedente infiammazione di qualche parte .

Dà segno d' ascesso un tumor infiammativo, prominente nella medietà , albicante , fluttuante .

La cura dell' ascesso richiede , che 1. si promuova la *principiante suppurazione* ; 2. si apra l' ascesso nel luogo fluttuante .

Si promuove la *suppurazione* 1. con *empiaastro* diachilon semplice ; 2. con *ca-*  
*ta-*



*cataplasma emolliente* di pan bianco smi-  
nuzzato, latte, butiro, croco.

L'apertura dell'ascesso si può far in due  
maniere,

1. con la *lansetta*, o

2. con la *pietra caustica*.

Fatta l'apertura, si continua ad ammollir  
il tumore e a farlo suppurare con un-  
gento di basilicone, o con balsamo  
d' Arceo, e col cataplasma emollien-  
te. Finalmente si sana il tumore, co-  
me l'*ulcero semplice*, con acqua vul-  
neraria o balsamo vulnerario.

## TUMOR METASTATICO.

Quegli *ascessi*, che nascono subitamente e  
senza previa infiammazione della par-  
te, si chiamano *ascessi metastatici*.

Nascono, in febbri calde, da deposizione che  
di marcia fa il sangue, e bisogna presto  
aprirli e curarli come gli altri ascessi

## E M P I E M A.

E' un *ascesso* fra le coste, o un' *effusion* di  
marcia nello scavo del torace.

Quindi si divide l'empìema in *esterno* e  
*interno*.

L' *esterno* si apre con coltello come l'ascesso.

Nell' *empìema interno* bisogna con paracen-  
tesi del torace evacuare la marcia dal-  
lo scavo del torace medesimo.

P A R T E II.

K

I I I.

## III. C L A S S E.

## TUMORI CANCRENOSI.

*Cancrena* è mortificazione e perfetta putredine di qualche parte.

Si divide la mortificazione in *cancrena*, e *sfacelo*.

La *cancrena* è mortificazione degli integumenti comuni.

Lo *sfacelo* è mortificazione di tutte le parti molli fino all'ossa.

## C A N C R E N A.

*Segni*, che vi sia *cancrena*, sono:

1. Se il *Dolor* d'infiammazione va in *sensibilità*.

2. Se il *calor* ————— va in *freddo*.

3. Se il *roffor* ————— va in *lividezza*.

4. Se la *tensione* ————— va in *flaccidezza*.

5. Se l'*epidermide* si alza in gran vesciche, piene d'umor putrido, e spargenti odore *cadaveroso*.

*Segni di sfacelo* sono, se possono tagliarsi o pugnarsi, senza dolore, fino all'ossa tutte le parti molli.

*Prognosi*. La *cancrena* passa in *sfacelo*, e lo *sfacelo* finisce in morte.

La

La cura della *cancrena* esige 1. che si pongan *limiti* alla putredine ; 2. che tutto il già putrido si *separi* da quel ch'è sano.

Si metton *limiti* alla putredine 1. per *iscarificazioni*, 2. per *medicamenti antisettici* . Quindi *internamente* si dà ogni due ore una dramma di china con tre grani di *canfora*. *Esternamente* si applica un *fomento* di polvere di canfora , china e ruta , sritolate con aceto .

La *separazione* di quello , ch' è *cancrenoso* , dal sano si fa , quando la natura faccia *suppurazione* nel limite del luogo *cancrenoso*.

Lo *sfacelo* si cura nell' istessa guisa , s' è *topico* , ma s'egli occupa tutto il membro , bisogna tagliar via il membro medesimo . In *isfacelo* poi , il qual venga da causa interna , nulla giova l' amputazione .

## NECROSI, o CANCRENA SECCA.

E' una *mortificazione* , per cui , senza *previa infiammazione* , le parti diventano nere , secche ed insensibili .

*Causa prossima* è il mangiar pane di frumento corrotto ; oppur l' *ambustione* , o l' età senile .

La *cancrena secca* esige *canfora* *esternamente* e *internamente* ; nè mai in

*isfacelo secco* giovò la scarificazione ,  
l'amputazione , o la china .

## C A R B O N C H I O .

Il *carbonchio* o *antrace* è un tubercolo infiam-  
mativo che in 24. ore si fa cancrena.

*Causa prossima* è un peculiar. contamina-  
mento pestilenziale .

Quindi *internamente* si dà canfora con chi-  
na e aceto di ruta .

*Esternamente* , fatta la scarificazione , si ap-  
plica un fomento antisettico , e un-  
guento di storace con canfora .

## I V . C L A S S E .

### TUMORI INDURATI .

Così chiamansi que' tumori , che consistono  
in *indurazione* di glandula o di altra  
parte .

A questa classe appartengono

1. lo *Scirro* ,
2. il *Carcinoma* ,
3. le *Scrofole* ,
4. la *Struma* , e
5. il *Tubercolo* .

## S C I R R O .

Egli è un induramento di qualche glandula .  
N'è *segno* un tumor duro, indolente, ine-  
gua-

guale , di color simile a quello della cute .

*Sede* frequentissima è nelle mamme .

*Prognosi*. Lo scirro benigno passa in maligno , e l' maligno passa in canchero .

*Si divide* lo scirro in *benigno* , ch' è senza dolore ; e

in *maligno* , che duole .

La cura esige uno *specifico* risolutivo , ch' è la cicuta . Quindi

*Internamente* si danno ogni dì XX. grani d' estratto di cicuta .

*Esternamente* si applica di giorno un cataplasma di cicuta , e di notte un empiastro di cicuta e gomma ammoniac .

Ogni rimedio acre e pingue nuoce negli scirri .

## CARCINOMA o CANCHERO .

E' uno *scirro* , che duole e si fa livido .

Si divide in *canchero occulto* , che non è esulcerato ; e

in *canchero aperto* , ch' è esulcerato .

*Specifico* nel canchero occulto e nell' aperto si è la *cicuta* . Dunque si adopera questa , come negli scirri , esternamente e internamente .

Bisogna estirpar quel carcinoma che non si può curar con cicuta .

Il carcinoma *aperto* è un ulcero cancheroso , del quale abbiain parlato nella dottrina degli ulceri .

## S C R O F O L E .

Sono indurazioni delle glandule submascel-  
lari , e del collo .

A *resolvere* le scrofole bisogna adoperare

*China con cicuta .*

*Acqua marina .*

*Etiopie minerale .*

Esternamente , come nello scirro , si ado-  
pera empiastro o cataplasma di cicuta -

## S T R U M A , o G O Z Z O .

E' *indurazione* della glandula tiroidea e  
della parte anterior del collo .

N° è segno un tumor bislungo e duretto  
in questa parte .

*Causa prossima* è una peculiar acrimonia ,  
che si chiama *strumosa* , endemia a  
certi paesi, come Tirolo , Svizzeri ec.

La *struma principiante* si cura con polvere  
contra il gozzo , fatta di guscj d'uo-  
vo abbrossiti .

## T U B E R C O L O .

Così chiamasi un *tumoretto* induratò .

I tubercoli si dividono in *benigni* e *malì-  
gni* , e si curano come lo scirro .

Spesso nella faccia nascono fissatti tubercoli  
allividenti , i quali maltrattati finiscon  
fovente in canchero .

V. CLAS-

## V. C L A S S E.

## TUMORI ACQUOSI.

Sono tumori, che in se contengono *acqua*.  
A questa *classe* appartengono i seguenti 9.  
tumori.

1. *Edema.*
2. *Tumor sferoso.*
3. *Tumor linfatico.*
4. *Anassarca.*
5. *Idrocefalo.*
6. *Spina bifida.*
7. *Idrotorace.*
8. *Ascite.*
9. *Idartone.*

## E D E M A:

E' un tumore *acquoso*, che da dito impresso  
ritiene la fossetta.

La sua *sede* è per lo più nelle gambe; ra-  
re volte nelle mani.

N'è *segno* un tumor di tutta la parte, fri-  
gido, indolente, di color della cute,  
molle, in cui dall'impressione del dito  
resta la fossetta.

Se l'edema è nelle gambe, si cura

1. con *legar* tutta la gamba con fa-  
scia circolare;
2. con *fomento corroborante* d'acqua  
di calce, e di spirito di vino  
canforato;

K 4

3. con

3. con *fomento secco* di farine resolute e canfora ;
4. con *fregazioni secche* a fummo aromatico .

Insieme si danno purganti e diuretici .

Si commendan pure i *vescicatorj* e la *scarificazione* ; ma negli *edemi inveterati* questi due rimedj fanno talvolta cancrena .

L' *edema caldo* si cura come l' *infiammazione* .

## TUMOR SIEROSO.

Egli è un tumore, che in se contiene *siero* limpido non pituitoso, e non conserva la fossetta fattavi da dito impresso .

Si cura come l'edema .

## TUMOR LINFATICO.

E' un tumor acquoso, che nasce da *rottura* di vaso linfatico .

Si divide in *tumor linfatico incipiente*,  
 \_\_\_\_\_ *suppurante*, e  
 \_\_\_\_\_ *aperto* .

*Segno* di tumor linfatico *incipiente* è un tumor grande come una moneta di due fiorini ( o un ducato ), piano, indolente, di color della cute, rotondo ; e che per molti mesi va lentamente crescendo in volume .

*Segno* di tumor linfatico *suppurante* si è quando egli duole, si fa gialliccio, sub-



subito cresce di mole, e da per tutto ondeggia.

*Segni del tumor linfatico aperto.* Si rompe il tumore, n' esce molta linfa tenue e purulenta, cade tutto il tumore, e ne resta ulcero pallido, cavo in tutto il suo giro, e ond' esce ancora molta della suddetta linfa. Talvolta vi cresce una carne fungosa pallida, ne segue febbre lenta, e dopo alcuni mesi la morte.

La *sede* di questo tumore sta dove sono i vasi linfatici; non in altro luogo.

La *cura* vuole, che subito si apra il tumore, indi si sani con acqua Tediiana. Se vi cresce carne fungosa, bisogna consumarla con polvere di vitriuolo ceruleo.

## A N A S S A R C A.

E' intumescenza *edematosa* di tutto il corpo. Si *cura* con corroboranti e diuretici.

## I D R O C E F A L O.

E' un' acquosa intumescenza del capo.

Si divide in idrocefalo *esterno*, dove l' acqua è fuor del cranio; e in

————— *interno*, dov' ella è dentro il cranio.

*Segno* d' idrocefalo *esterno* è l' intumescenza edematosa di tutto il capo.

*Segno* ——— *interno* è una grande intumescenza del capo, che non ri-

tiene la fossetta del dito impresso , ed ha uno squarciamento nella futura sagittale .

L'idrocefalo *esterno* è sanabile; ma di rado assai l'*interno* .

————— si cura , come l'edema della gamba ,

1. con *fomenti* corroborativi , e internamente con diuretici ;

2. *scarificando* la nuca ; e

3. con *vescicatorio* nella nuca .

La cura dell'idrocefalo *interno* si dee tentare con gli stessi medicamenti . La *trapanazione* del cranio , in vece di guarir il male , fa morir più presto il malato .

## SPINA BIFIDA.

È un tumor acquoso , che sta su la midolla spinale fra le vertebre sesse .

Quest' è il morbo de' *nuovi nati* , e ha d'ordinario la sua *sede* nelle vertebre dei lombi .

*Causa prossima* è un' effusione di linfa che va nello speco vertebrale .

N'è *segno* un tumor fluttuante , indolente , di color della cute , il qual è tra le vertebre ; a' lati del tumore si toccano i processi spinosi , e v'è paralisi delle estremità inferiori .

Il tumor è incurabile , e sempre mortale .

L'*incision* del tumor accelera la morte .

IDRO-

## I D R O T O R A C E.

E' un' *idropisia* del torace, o *effusion* d' acqua nella cavità del torace.

Se non giovano i medicamenti diuretici ; bisogna far *paracentesi* nel torace.

## A S C I T E.

E' un' *idropisia* dell' addomine , o *effusione* d' acqua nello scavo dell' addomine .

Se questo morbo non può curarsi con medicamenti diuretici , si faccia *paracentesi* nell' *addomine* .

## I D A R T R O N E.

E' *idropisia* d' articolazione , o *effusion* d' acqua nella cavità di qualche articolazione .

La *sede* frequentissima è nell' articolo del ginocchio .

N' è *segno* un' intumescenza di tutto 'l ginocchio, la quale ondeggia, e corona la patella ; di color della cute ; indolente da principio , ma che a poco a poco si fa dolorosa .

La *cura* si fa per *resoluzione* o per *incisione* .

Si tenta la *resoluzione*

1. per *fomenti secchi* di farine risolutive con canfora ; e

K 6

2. con

2. con *gomma ammoniaca* cotta in aceto a guisa d'empiaastro , o con linimento di *radice di mandragora* e miele .

3. *Internamente* si danno diuretici e purganti .

Se con questi rimedj il tumor non cede , allora cavisi l'acqua per *incisione* . Si fa una *piccola incisione* nell' esterna parte del ginocchio , allato della patella .

Evacuata l'acqua , si copra subito con tenace empiaastro la ferita ; acciò che non vi possa entrare l'aria . Nocive sono le iniezioni nello scavo dell' articolazione .

Dopo l'operazione si continui con fomenti corroboranti .

Se nell'*inveterata* idropisia dell' articolazione v'è già carie d'ossa , allora bisogna troncar il membro , affinchè l'infermo non perisca di febbre lenta .

## VI. CLASSE.

### TUMORI SANGUINEI.

Così appellansi que' tumori , che in se hanno sangue .

Questa classe contiene cinque spezie :

1. *Ecchimosi* .
2. *Aneurisma vero* .
3. — — *spurio* .

4. *Va-*

4. *Varice.*5. *Emorroide.*

## E C C H I M O S I.

E' tumore per sangue de' vasi minori *diffuso* nella tela cellulosa. Vedi *Contusione.*

## A N E U R I S M A V E R O.

E' una preternaturale dilatazione di qualche arteria.

Ne dà *segno* un tumor *pulsante*, il quale a poco a poco acquista la grandezza d'un novo; indolente, e di color della cute.

Ma gli aneurisimi veri *inveterati* e assai grandi cessano quasi affatto di pulsare.

*Causa prossima* è una lassità o dilatazione di qualche luogo dell'arteria, per antecedente contusione, corrosione o ferita della membrana esteriore dell'arteria medesima.

Frequentissima è la *sede* nella flessura del cubito per antecedente salasso mal fatto.

*Prognosi.* Il tumor è pericoloso: da rottura sotto la cute, egli si può far *aneurisma spurio*; da rottura per la cute, ne può subito avvenir la morte.

La cura dee farsi per compressione, o per operazione. Si fa la compressione,

1. con

1. con *pezzoline* poste *graduatamente* ;
2. con *suvero incavato* ; e
3. con *particolar compressorio* .

Aumentisi a poco a poco la compressione ,  
e talvolta si continui a farla anche  
per un anno .

Negli aneurismi inveterati , e sì grandi  
che più non si lasciano comprimere ,  
bisogna far l' *operazione* .

## ANEURISMA SPURIO.

E' sangue che da una grande arteria lesa  
si diffonde nella tela cellulosa .

Ne dà *segna* un tumor largo , livido , *poco*  
*pulsante* .

N'è *causa prossima* un aneurisma vero rot-  
to , ovvero una ferita , rottura o ero-  
sione d'arteria .

La *cura* si tenta nello spurio , come nel  
vero , per *compressione* ; o per *opera-*  
*zione* .

Bisogna curare gli aneurismi spurj *minori* ,  
per *compressione* ; e per *operazione*  
i *maggiori* , che non si posson compri-  
mere .

## V A R I C E.

E' una preternatural *dilatazione* di una o  
più vene in tumori nodosi .

La *fede* frequentissima è nelle gambe di  
donne gravide .

La

La cura della varice richiede 1. *compresione* con fascia o calze artificiali ; 2. *fomenti astringenti*.

## EMORROIDE.

E' una *dilatazion* di vene emorroidali dentro e fuori dell' ano.

Si dividon le emorroidi ,

1. per la sede , in *esterne* , le quali sono visibili fuori dell' ano ;

2. ——— , in *interne* , che stanno ascose nell' intestino retto ;

3. ——— , in *fluenti* , che giongon sangue ; e

4. ——— , in *cieche* , dalle quali non fluisce sangue.

La cura dell' emorroidi cieche si fa per *resoluzione* o per *evacuazion* di sangue.

Si tenta la *resoluzione* ,

1. con *salassi* ,

2. con *enemi* o *serviziali* ,

3. con *purganti eccoprotici* , come *lattuario lenitivo* ; e

4. con *fomenti d'erbe resolutive* cotte in acqua alba .

L' *evacuazion* del sangue da' vasi emorroidali si fa

1. *da se* per *suffumigio* di vapor d' acqua ; o

2. con

2. con applicazione di *mignate*, o
3. con *incisione* alla vena dilatata.

Se il *flusso emorroidale* è critico e lieve, si lascia alla natura; ma s'egli è troppo, e rechi debilità, bisogna fermarlo.

Si ferma il *flusso esterno* con fungo agarico o con acqua Tadiana; e'l *flusso interno*, con iniezione d'acqua fredda mista con acqua Tadiana.

## VII. CLASSE.

### TUMORI CISTICI.

Sono tumori, la cui materia contenuta sta rinchiusa in peculiar *cistide* o sacco membranaceo.

La *materia contenuta* di questi tumori è assai varia, onde anco varj i nomi de' tumori.

Di questi ve n'è otto *specie*, come,

1. *Meliceride*, che contiene un tumor simile al mele.
2. *Ateroma*; con poltiglia bianca.
3. *Steatoma*; con sevo.
4. *Osteosteatoma*; con sevo ossificato.
5. *Igroma*; con acqua.
6. *Lipoma*; con pinguedine.
7. *Lupia*; con sostanza spongiosa.
8. *Ganglio*; con umor simile ad albume d'uovo.



## MELICERIDE.

E' un tumor cistico, la cui contenuta materia è simile al *mele*.

N' è *segno* un tumor globoso, indolente, di color della cute, molle, liscio al tatto.

*Cura*. La meliceride *incipiente* alle volte risolvesi con resolventi più forti, come spirito saponato.

La meliceride già *inveterata* non è curabile che con l'*operazione*, la quale si fa per *ismidollamento*, o *incisione* ed *erosione* della *cistide*.

Si *fin* della con incision della cute, poi si separa con iscarpello tutta la cistide dalla tela.

Facciasi *incision* nella cute insieme della cistide; uscitone il liquido, impongasì su la cistide cava *unguento digestivo acre* che abbia precipitato rubro; o si consumi la cistide con *butiro d'antimonio* o con *olio caustico di canfora*.

Il *primo* di questi metodi è più sicuro e miglior che l'incisione.

## ATEROMA.

E' un tumor cistico, la cui contenuta materia è come *poltiglia alba* o *farinacea*.

*Cu-*

*Curazione.* L'ateroma *incipiente* si può risolvere come la meliceride. L'*inveterato* si cura con la sola estirpazione.

## STEATOMA.

E' tumor cistico, la cui contentuta materia par *sevo* o *lardo*.

*Differisce*, per la maggior durezza, dall'ateroma: la sola estirpazione può farne la cura.

## OSTEOSTEATOMA.

E' tumor cistico, la cui contentuta materia è parte *steatomatosa*, parte *ossificata*.

## IGROMA.

E' tumor cistico con materia simile a *siero* o *linfa*. Talvolta si trova tutto pieno d'*idatidi*, o vescichette acquose. Si *cura*, per operazione, come la meliceride.

## LIPOMA.

E' tumor puramente *pinguedinoso*.

Si *cura* tagliando via tutto il tumore. Prima intorno alla base del tumore si taglia la sola cute, poi si solleva tutto

to il tumore, e dalla radice si schianta la pinguedine.

## L U P I A.

E' un tumore, la cui contenuta materia è una tela cellulosa *fungosa*.

La *sede* più frequente si è nell' articolo del ginocchio o del cubito.

Egli ha *segni* di tumor cistico, ma una mollezza spongiosa, che si sente al tatto.

*Curazione*, si risolve la *lupia* con *empiastro* a lei particolare, o con gomma ammoniac, come più volte osservai.

## • G A N G L I O.

E' tumor cistico, che è formato dalla vagina del tendine, e contiene un liquido simile a *crudo albume d'uovo*.

La sua *sede* più frequente è nel dorso della mano del piede.

Ha *segni* di tumor cistico.

*Si cura* in tre modi:

1. Con *medicamenti* indicati nella *meliceride*, come, spirito saponato.
2. Per *crepatura* della cistide; la quale si fa, premendo colle dita il tumore; indi, rotta la cistide, si comprime con fascia il luogo del tumore.

3. *Smi.*

3. *Smidollando* il tumore, come diffi della meliceride.

## VIII. C L A S S E.

### TUMORI ESCRESCENZIALI.

Sono quelli , che oltre la cute crescono , composti di *fibrosa sostanza* simile a carne . Entrano perciò in questa *classe* i seguenti :

1. *Sarcoma* .
2. *Nevo* .
3. *Corno* .
4. *Fungo cerebrino* .
5. *Polipo del naso* .
6. *Polipo uterino* .

### S A R C O M A .

E' un tumor composto di *sustanza fibrosa* come carne .

*Si dividon* i sarcomi in *pensili* , che han picciuolo , e sono piriformi , e in *sessili* , che alla cute s'attengono con base larga .

N' è segno un tumore che cresce oltre la cute ; indolente , rosseggiante , o di color della cute , e che ha la mollezza della carne .

*Si cura* in tre modi .

1. Legando la radice , ma solamente ne' sarcomi pensili .

2. *Ta-*

2. *Tagliando via o schiantando il tumore, ma ne' fessili.*
3. *Con caustici liquidi, ma ne' sarcomi piccoli.*

## N E V O .

E' un sarcoma nativo, o quello ch' è nato coll' uomo .

Si prende per causa eccitante l' *immaginazione della madre.*

I *nevi piani* si curano con applicazione di *pasta* fatta di calcina viva e sapon veneto .

Ma i *nervi più alti* bisogna curarli anche con legatura, con taglio, o con olio di canfora caustico .

## C O R N I .

Sono *escrescenze* grandi assai e *callose* come le verruche .

*Si curano* con ispirito di sale concentrato, o con olio di canfora caustico .

## F U N G O C E R E B R I N O .

E' un' *escrescenza* fungosa dalla *dura madre* o dal *cerebro*, la qual emerge, per un forame preternaturale del cranio, sotto la cute del capo .

*Si conosce* al tatto del forame, alla mollezza del tumore, alla sua oscura pulsazione .

La

La *cura* esige incision della cute, trapanazione in tutto il giro del forame, e taglio dell'escrescenza.

## POLIPO DEL NASO.

E' un *escrescenza a picciuolo* dalla membrana pituitaria delle nari.

Si *conoscono* i polipi a vederne il tumor albicante, piriforme, indolente.

Si dividono in *benigni*, che non dolgono; e

in *maligni*, che dolgono e sono lividi.

La *cura* è 1. Per *estorsione* mediante la forcipe, con la quale bisogna storcerli, non isvellerli.

2. Per *taglio*; che di rado si può eseguire.

3. Con *caustici*, i quali in polipi minori si possono tentare con olio caustico di canfora.

4. Per *legatura* del polipo; metodo ottimo, se si può eseguire, e necessario anche nel polipo cancheroso.

## POLIPO UTERINO.

E' un *polipo* che viene dallo scavo dell' utero o della vagina.

*Segni.* Il polipo uterino si conosce al tatto e all' emorragia uterina. Il polipo *vaginale* è senza emorragia.

La miglior cura si fa per legatura del polipo.

## IX. CLASSE.

### TUMORI OSSEI.

Vedi la Dottrina de' *morbi dell' ossa*.

## X. CLASSE:

### TUMORI ARTICOLARI.

Vedi i *Morbi dell' ossa*.

## XI. CLASSE.

### TUMORI TERREI.

Sono tumori, che nascono da deposizione di *sugo terreo*.

A questa classe appartengono,

1. il *tumor terreo*,
2. il *tufo podagrico*,
3. la *ranella lapidea*.

TU.

## TUMOR TERREO.

E' tumore che in se contiene materia *calcare*a o *lapidea*.

*Si conosce* alla durezza , al color albicante , e massime all'incisione .

*Si fa la cura* 1. per *resoluzione* con lisciva caustica dilavata in acqua .

2. per *incision* del tumore ed estrazione della terra calcerea .

## TUFO PODAGRICO.

*Quei tubercoli*, che a' gottosi crescono nelle dita delle mani e de' piedi , e in se contengon terra calcarea , si chiamano *tofi* o *tusi podagrici*.

*Si curano* come il tumor terreo : talvolta giova l'acqua fredda .

## RANELLA LAPIDEA.

E' un *tubercolo* sotto la lingua , il quale contien terra .

E' la sua *sede* nel *dotto salivale* .

N' è *segno* la durezza pietrosa del tubercolo .

*Si fa la cura* per *incision* del tumore ed estrazion della pietra .



## XII. C L A S S E.

## TUMORI AEREI.

Son quelli che nascono da *aria* diffusa nella tela cellulosa.

Appartengono a questa classe i seguenti :

1. *Enfisema*.
2. *Fisocefalo*.
3. *Broncocale*.
4. *Timpanite*.
5. *Pneumatosi*.

## E N F I S E M A.

E' intumescenza di qualche parte per aria contenuta nella tela cellulosa.

Causa prossima è,

1. L' *Aria atmosferica*, che per ferita s'insinua nella tela cellulosa, ovvero
2. *Aria*, che per putredine *si striga* dai nostri umori, e sovente accompagna la cancrena.

*Segno* d'enfisema è un'intumescenza di color della cute; appena dolorosa; elastica, ma che a premerla con dito scricchiola come ossa rotte.

La *cura*; vuole, che l'aria si scacci dalla tela cellulosa; quindi bisogna

1. Dilatar la *ferita angusta*,
2. Con *fregagioni* spremere l'aria verso la ferita, ovvero

PARTE II.

L.

3. Far

3. Far una *nuova ferita* in altro luogo enfisematoso.

Nell'*enfisema putrido* bisogna applicare *antisettici*, come canfora, esternamente e internamente.

### F I S O C E F A L O .

E' intumescenza *enfisematosa* di tutto il capo.

Ella pur viene a *ferite anguste* del capo.

*Si cura* come l'*enfisema* da causa esterna.

### B R O N C O C E L E .

E' un' intumescenza aerea e scricchiolante nell' *anterior parte* del collo.

*Causa prossima* è la *fessura* tra gli anelli cartilaginei della *trachea*.

*Curazione*. La *fessura* si sana da se; il tumor con fomento astringente si sbranca; giova lo spirito di vino canforato con allume.

### T I M P A N I T E .

E' intumescenza dell'addomine da aria in esso contenuta.

N'è *segno* un tumor lieve, non fluttuante come nell' *ascite*.

*Si cura* alle volte con *medicamenti corroborativi*.

In niuna specie sembra utile la *paracentesi dell' addomine*.

PNEU.

## P N E U M A T O S I .

E' un *enfisema* di tutto il corpo.

*Nasce* da enfisema topico , da frattura di costa con offesa del polmone .

*Si cura* con farvi una ferita , e spremere l' aria .

## XIII. C L A S S E .

## T U M O R I S A L I V A L I .

Vengono questi tumori da ritenzion della saliva contenuta nel dutto salivale .

Non v'è in questa classe , che la

## R A N E L L A S A L I V A L E .

Tumor sotto la lingua , il qual contiene la saliva raccolta nel dutto salivale .

N'è *segno* un tumor molle , fluttuante , indolente , e di color dell' interna membrana della bocca . A tagliarlo n' esce un liquido simile ad albume d' uovo .

*La cura* si fa con *incision* del tumore , e con ischiantarne la parte superiore .

## XIV. CLASSE.

## TUMORI BILIOSI.

Sono tumori, che nascono da ritenzion di bile nella vescica del fiele. Di questa classe non v'è che una specie, cioè il

TUMOR DELLA VESCICA  
DEL FIELE.

Egli è un' intumescenza della vescica del fiele per bile che vi si è raccolta.

*Causa prossima* è l'ostruzione del dutto cistico fatta da un calcolo bilioso o da bile inspessata.

Ne dà *segno* un tumor profondo e fluttuante sotto l'ipocondro destro; un dolor profondo; e l'assenza de' segni di peritonite.

La *cura* si dee fare per *risoluzione*, o *puntura* del tumore.

Si tenta la *risoluzione* con *decotti saponacei*, e *fomenti emollienti*.

La *puntura* della vescica del fiele con ago da tre coste non si debbe tentare, se non quando si sappia di certo essere la vescica attaccata al peritoneo; altrimenti la puntura diverrebbe mortale.

Che la vescica del fiele siasi *attaccata* al  
peri-

peritoneo , lo dimostra l' antecedente infiammazion della vescica stessa e del luogo dolente .

La puntura della vescica del fiele unita al peritoneo sovente lascia una *fistola biliosa* .

## XV. C L A S S E.

### TUMORI URINARIJ.

Qui spettano que' tumori , che nascono da orina ritenuta nella vescica urinaria .

#### INTUMESCENZA DELLA VESCICA URINARIA.

Ell' è una gonfiagione della vescica urinaria per orina ritenuta nella sua cavità .

*Causa prossima* è l' ostruzione del collo della vescica o dell' uretra .

*Causa* di questa ostruzione posson essere il calcolo , la caruncula , lo spasmo , l' infiammazion dell' uretra , la compression dell' uretra per gravidanza , la paralisi della vescica .

N' è *segno* un tumor profondo sopra l' ossa del pube , congiunto colla ritenzion d' orina .

*Prognosi* . Il morbo è mortale , se non si rimetta nel suo efflusso l' orina .

*La cura vuole* , che

L 3

1. Si

1. Si levi la causa , che ostruisce l'uretra .

2. Si estrarra l'orina mediante il catetere .

3. Si punga la vescica , se il catetere non possa far uscire l'orina .

Si rimuovono le cause ostruenti , levando con *enemi* e *cataplasmi emollienti* , e con oppio , lo *spasmo* del collo della vescica .

Con *salassi* , con fomento e serviziale emolliente , e con *emulsion refrigerante* , si cura l'infiammazione dell'uretra .

La *caruncula* dell'uretra si sana col lungo uso di *candelette* .

Il *calcolo* siccato nell'uretra si leva col *taglio* .

La *compression* dell'uretra in gravidanza esige *retropressione* dell'utero obliquo o retroverso .

La *paralisi* della *vescica* si cura con *infusion d'arnica* , e con vescicatorio all'osso sacro .

## XVI. C L A S S E.

### T U M O R I L A T T E I.

Son quelli che nascono da deposizion di *latte* . Qui appartiene

1. L'*intumescenza lattea delle mamme* .

2. Il *tumor latteo dell'estremitadi* .

## INTUMESCENZA LATTEA DELLE MAMME.

E' un doloroso gonfiamento delle mamme  
per troppa deposizion di latte.

N'è segno un' intumescenza molle non infiammata, delle poppe.

La cura esige *evacuazion* di latte, che si fa

1. coll' allattamento del proprio infante o di un altro;

2. spremendo la poppa; e

3. estraendo il latte coll' antlia mammaria.

*Internamente* si dà un tenue brodetto di cherofilo e purgante lene. La *dieta* sia tenue, non nutritiva.

## TUMOR LATTEO DELLE ESTREMITA'.

Egli è tumore per latte deposto nella tela cellulosa di qualche estremità.

*Causa prossima* è un' abbondanza di latte non deposto nelle poppe, e subitamente dalle poppe *retrospinto*.

*Segni*, che un tumor latteo vuol occupare l' estremità inferiore, sono: Nel primo giorno l'anguinaja duole; nel secondo, duole il ginocchio, e si gonfia l'inguine; nel terzo si gonfia il ginocchio, e duol la gamba e'l piede; finalmente anco il piede si gonfia.

Se il latte si depona nell' *estremità superiore* , allora duole assai , prima lo scavo subascellare , poi il cubito , e in ultimo la mano ; e sempre il tumore occupa il luogo ch'è abbandonato dal dolore .

L' *intumescenza* è calida , splendente , rofseggiate sul giallo , elastica , in cui non resta segno di dito impressovi .

La *resoluzione* esige fomenti resolutivi di sapon veneto in latte . *Internamente* si dà un purgante , e poi nitro canforato .

## XVII. C L A S S E. TUMORI ERNIOSI SPURJ.

Vedi la dottrina dell' *ernie* .

## XVIII. C L A S S E. TUMORI ORGANICI.

Così appellansi que' tumori che in se racchiudono viscera od altra parte organica mossa dal suo luogo naturale .

A questa classe posson riferirsi tutte l' *ernie vere* , e l' *parochidio* .

### P A R O C H I D I O .

E' un tumor nell' *inguine* , nato da testicolo ivi situato .

Can-



*Causa prossima* è una lenta discesa ; come negli adulti .

N'è *segno* la mancanza del testicolo nello scroto .

La *cura* vuole , che si allarghi la via al testicolo , ond' e' possa discendere . Ciò si fa con *cataplasmi emollienti* , e con lene fregagione .

## D O T T R I N A D E' P R O L A P S I .

**I** *Prolapsi* sono staccamenti o sinoviture *visibili* di qualche viscera dallo scavo che la contiene . Quì appartengono

Il *prolapso dell' ano* ,  
 .. ——— *della vagina* , e  
 .. ——— *dell' utero* .

### P R O L A P S O D E L L' A N O .

Egli è una *protuberanza* dell' intestino retto dall' ano .

La *cura* esige 1. *Reposizione* ; che si fa colle dita .

2. *Ritenzione* nel luogo naturale , che si fa con pezzoline graduate e colla fascia T.

3. *Corroborazione dell' intestino* ;

*no* ; che si fa con fomenti d'erbe astringitive con allume .

## PROLAPSO DELLA VAGINA .

E' *protuberanza* della vagina dall' orificio della vagina .

*Si conosce* alla vista d'una protuberanza rugosa e rosseggiante .

*Si cura* 1. con *riporre* la membrana ;

2. con *ritenerla* nel suo sito mediante un pessario ;

3. con *iniezione corroborante* fatta di specie corroborative con allume .

## PROLAPSO DELL' UTERO .

E' una *discesa* dell' utero dentro o fuori della vagina .

N' è *causa prossima* la *fiacchezza* de' ligamenti uterini .

*Si divide* in prolapso imperfetto, e perfetto .

L' imperfetto si *conosce* tentando col dito ; il perfetto è visibile .

*La cura* vuole 1. *Reposizione* ; che si fa colle dita .

2. *Ritenzione* ; che si fa con pessario .

3. *Fomenti e iniezioni corroborative* .

## INVERSIONE DELL'UTERO.

E' un' interna inversione della superficie dell' utero , e un prolapsò per l' orificio uterino . Nelle donne di parto l' inversion dell' utero avviene talvolta da violenta protrazione della placenta uterina .

*Si cura* 1. *rivesciando e riponendo* l' utero pel suo orificio ; il che si fa colle dita ;

2. *adoperando il pessario* ;

3. *con corroboranti esterni e interni* , e collo star lungamente supino .

## D O T T R I N A

## D E L L' E R N I E .



## D E L L' E R N I E I N G E N E R A L E .

**L'** *Ernie* si dividono in *vere*, e *spurie*.

L' *ernie vere* sono tumori prodotti dalla smovitura di qualche viscera .

Le *spurie* sono tumori , che da congerie d'umori nascono nel bellico : e nello scroto .

L' *ernie vere*, dal luogo ch' elle occupano , si dividono in 12. generi , cioè ;

L 6

1. *Er-*

1. *Ernie inguinali.*
2. — *scrotali.*
3. — *femorali.*
4. — *ovalari.*
5. — *ischiadiche.*
6. — *vaginali.*
7. — *umbilicali.*
8. — *addominali.*
9. — *lombari.*
10. — *perineali.*
11. — *toraciche.*
12. — *cefaliche.*

Ciascun genere d' ernie si divide nelle sue specie rispetto alla *contenuta viscera*, e alla *sua peculiar costituzione*.

Per la *contenuta viscera* si chiamano ernie *intestinali*, *omentali*, *del ventricolo*, *del fegato*, *della milza*, *dell' utero*, *della vescica*, *del polmone*, *del cerebro*.

Dalla *costituzione* si ha l' *ernia semplice*, l' *incarcerata*, e l' *inveterata*.

N' è *causa prossima* il peritoneo che si dilata in sacco.

*Causa remota*, la lassità o fiacchezza del luogo ernioso per antecedente contusione, ferita, clamore, tosse, parto, vomito, salto, rottura di peritoneo.

## ERNIA SEMPLICE.

*Diagnosi.* Si conosce l' *ernia semplice* dal tumore che va crescendo a poco a poco, e ch' è riducibile.

La

La cura dell'ernia semplice vuole

1. *Reposizione.*
2. *Ritenzione* mediante il brachiere.
3. *Corroborazione* del luogo ernioso.

La *reposizione* si fa 1. col sito supino dell' infermo, alte le ginocchia,

2. coll'*intropressione* delle parti scattate.

La *ritenzione* si fa con brachier elastico; e

La *corroborazion* del luogo, con uso esterno dello spirito di vino.

## ERNIA INVETERATA.

L'ernia cresciuta o *inveterata*, che non si lascia ridurre, esige un brachiere a palla *incavata*.

## ERNIA INCARCERATA.

E' un' ernia, che subito si fa irreducibile, e produce cattivi sintomi, come, vomito, colica, e ostruzion di ventre.

Si divide l'incarcerazione,

in *cronica*, la quale non è infiammata, e nasce da feccia, da fiato, o da spasimi; e in *infiammativa*, la qual è infiammata.

L'incarcerazione *infiammativa* esige *salassi*, *ferviziali emollienti*, e fomento d'acqua *vegeto minerale* o di *ossierato*.

L'incarcerazion *cronica* richiede

Fomento d'acqua fredda;

Enemi di *foglie di tabacco*, o di *fumo di tabacco*;


Po-

Pozione di *sal amaro*, se la feccia sia indurata.

*Oppio*, e fomenti *emollienti*, se lo spasmo de' muscoli addominali fa l'incarcerazione.

In entrambi questi casi si tenti più volte la *reposizione*, e s'ella è impossibile, si tagli l'ernia.

## DELL'ERNIE IN ISPEZIE.



### L'ERNIA INGUINALE.

**E'** Un tumor nell'anguinaja, il quale nasce da prolapsio dell'omento, o dell'intestino, per l'anello inguinale.

Si *conosce* dal poterli egli ridurre, perchè il bubbone non è riducibile.

Le *specie* sono:

1. *Ernia intestinale*, che nel riporla si conosce per la sua elasticità e pel suo gorgogliamento.
2. *Ernia omentale*, che si conosce alla sua durezza, e difficile riposta, e al non esservi gorgoglio.
3. *Ernia intestino-omentale*, che ha par-

parte segni d'ernia intestinale ,  
e parte segni di omentale.

4. *Ernia della vescica urinaria*, che si  
conosce alla pisciatura difficile, ma  
più facile, se si riponga l'ernia.

L'ernia d'entrambi gl'inguini richiede brachiere a due palle.

## II. ERNIA SCROTALE.

E' un tumor dello scroto per prolapso di  
viscera addominale, la quale per l'  
anello inguinale sdrucchiola nello sca-  
vo dello scroto.

Le *specie*, i *segni* e la *cura* sono come  
nell'ernie inguinali.

L'ernie *scrotale inveterata* elige un *sospensorio* dello scroto.

## III. ERNIA FEMORALE.

E' un tumor sotto l'inguine, nato nella  
più alta parte del femore, per pro-  
lapso di viscera addominale ch' esce  
rotto il ligamento di *Puparzio*.

Si *cura* come l'ernia inguinale.

## IV. ERNIA OVALARE.

E' un tumore nella suprema interna regione  
del femore, da prolapso di viscera ad-  
dominale per lo spiraglio o speccatura  
superiore del forame ovale della pelvi.

Si *conosce* e si *cura* come l'ernia femorale.

V: ER.

## V. ERNIA ISCHIADICA.

E' tumor all' ano, da prolapso dell' omento, o dell' intestino, per l' apertura che formano l' eccifura o spiraglio ischiadico e i ligamenti sacro-ischiadici.

*Si conosce e si cura come l'altre ernie.*

## VI. ERNIA VAGINALE.

E' un tumore nella cavità della vagina, prodotto da prolapso di viscere addominale, calata nella parte rilassata della vagina.

*Si cura con pessario.*

Si dà anco l' *ernia labbiale della vulva*; e questa specie d' ernia inguinale adivien nelle femmine.

## VII. ERNIA UMBILICALE.

E' un tumor dell' umbilico, nascente dal prolapso di viscera addominale per l' anello umbilicale.

Egli *abbisogna* di brachier particolare.

## VIII. ERNIA ADDOMINALE.

Nasce tumore in qualunque region dell' addomine, se v' è prolapso di viscere addominale.

Simil tumore per lo più occupa i luoghi *aponeurotisi*, come la linea alba, la femilunare, o i luoghi sopra gli anelli



li inguinali . Ma una ferite può farlo venir da per tutto .

*Si cura* con isplenj e con *cintolo addominale* .

## IX. ERNIA LOMBARE.

E' tumor nella regione lombare , nato da prolapso di viscera addominale in qualche luogo relassato .

*Si cura* come l'ernia addominale .

## X. ERNIA PERINEALE.

E' tumor nel perineo per prolapso della vescica urinaria .

*Cura* si come altra ernia; ben legato il brachiere sopra le spalle con lunghe strisce .

## XI. ERNIA DORACICA.

E' un tumore , ch' emerge fra le coste , e nasce da prolapso del polmone .

*Si conosce* dal poterli egli ridurre come un' altr' ernie , e parimente si cura con acconcia legatura .

## XII. ERNIA CEFALICA.

E' tumor in qualche parte del capo . Nasce dal cerebro e spunta per qualche preternaturale apertura del cranio .

DEL

# DELL' ERNIE

## SPURIE. IN GENERALE.

**LE ERNIE spurie** sono tumori nello *scroto*, o nel *bellico*, i quali non racchiudono in se, come l'*ernie vere*, viscera addominale, ma bensì un umor preternaturale.

Si dividono pel luogo che occupano,  
in ernie spurie dello *scroto*, e  
in ————— del *bellico*.

E per la *contenuta materia* diconsi

### I. *Ernie spurie dello scroto*,

1. *Idrocele*, ed ernia acquosa dello *scroto*.
2. *Ematocle* ————— sanguinea dello  
scroto.
3. *Pneumatocle* ————— aerea ———
4. *Spermatocele* ————— spermatica ———
5. *Sarcocle* ————— carnea ———
6. *Empiocle* ————— purulenta ———
7. *Liparocle* ————— pinguedinosa ———
8. *Varicocle* ————— varicosa ———
9. *Idatocle* ————— Idaticosa ———

### II. *Ernie spurie del bellico*

1. *Idronfalo*, o ernia acquosa del *bellico*.
2. *Emantonfalo*, o ernia sanguinea del  
bellico.
3. *Pneumatofalo* ————— aerea ———
4. *Empionfalo* ————— purulenta ———
5. *Sarconfalo* ————— carnea ———

6. *Va-*



L' *evacuazion* dell' acqua diffusa può tentarsi in quattro modi :

1. Per *paracentesi dello scroto* ; ma questa rare volte fana radicalmente il morbo .
2. Colla *pietra caustica*. Così più volte si è interamente curato il morbo : si applica al fondo dello scroto una molecola di pietra caustica , appena più grossa di una lente .
3. Per *dissezione di tutto lo scavo scrotale* : anche questa di spesso guarisce radicalmente ; ma dall' operazione ne vengono sintomi pericolosi .
4. Per *setaceo dello scroto* : anco questa cura è , per lo più , radicale .

## E M A T O C E L E .

E' intumescenza dello scroto per sangue diffuso nello scavo dello scroto medesimo .

*Causa prossima* n'è il cruor che si diffonde nello scroto per antecedente contusione o puntura dello scroto .

La cura esige *risoluzione* per fomenti risolutivi , o

evacuazione del sangue diffuso , per incisione .

## PNEUMATOCELE.

E' un' intumescenza *aeria* o enfisematosa dello scroto.

La *sede* dell' aria non è che nella tela cellulosa del medesimo.

N' è *segno* un' intumescenza crepitante dello scroto.

N' è *causa* un enfisema universale, o una ferita dello scroto.

La *cura* vuole *emission* d' aria, per fomenti umidi, e freghe, o per *incisione* dello scroto.

## SPERMOTOCELE.

E' un' intumescenza del testicolo per seme in lui accumulato.

N' è *segno* un tumore del testicolo, con un dolor che si stende fino a' lombi, senz' attual infiammazione del testicolo.

La *cura* vuole bevanda refrigerante, e cavata di sangue.

## SARCOCELE.

E' scirro o *indurazion* del testicolo.

*Si divide* la sarcocoele in

*benigna*, che non duole; e

*maligna*, ch' è livida e da se duole.

N' è *segno* un' intumescenza del testicolo, duro al lato,

Cu-

*Cura* , la sarcocoele benigna si debbe *risolvere* come un altro scirro , La *maligna* , si schianti per *castrazione* : ma se il funicolo spermatico si è già indurito fin nell' addomine , non giova nemmeno l' operazione .

### EMPIOCELE.

E' marcia raccolta nello scroto , o nella sostanza del testicolo .

N' è *causa prossima* un' antecedente infiammazione , o deposizion di marcia nello scroto .

La *cura* vuole evacuazion di marcia , e si fa per incisione .

### LIPAROCELE.

E' un' intumescenza *adiposa* dello scroto , o della tunica vaginale .

I *segni* , l' *esito* e la *cura* della liparocoele sono come quei del lipoma .

### VARICOCELE.

E' intumescenza di vene nello scroto , o nel funicolo spermatico .

Si divide 1. in *varicocoele scrotale* , che si conosce al veder le vene livide e gonfie nell' esterna faccia dello scroto : e

2. in *varicocoele del funicolo spermatico* .

*matico* , la qual si conosce al tocco quasi di vermi duri retti situati nel funicolo spermatico .

*Causa prossima* è una lassazione o compression di vene .

La *cura* esige fomenti corroboranti .

## I D A T O C E L E .

Le *vescichette* piene d'acqua si chiamano *idatidi* .

La *sede* delle idatidi è nello scroto o nel funicolo spermatico .

Si *conoscono* al tocco di globetti pisiformi .

La *cura* richiede *resoluzione* con ispirito saponato , o *evacuazion d'acqua* per incisione .

## SPECIE DELL'ERNIE SPURIE DEL BELLICO .

### IDRONFALO .

E' un' intumescenza acquosa del bellico .

N' è *segno* un tumor edematoso , che talvolta si osserva nelle donne gravide , e nell' ascite .

*Si cura* con rimedj corroborativi ; e con compression del bellico . Negli ascitici questo tumore si rompe alle volte da se .

EMA-

## E M A T O N F A L O .

E' il bellico prominente per ecchimosi .  
 N' è *segno* un lividore nella region del  
 bellico  
*Si cura* l' ematonfalo , come l' ecchimosi in  
 altro luogo: per fomenti resolutivi .

## P N E U M A T O N F A L O .

E' intumescenza *aerea* del bellico .  
 N' è *causa* un enfisema di tutto il corpo .  
 La *cura* vuol emissione d' aria per freghe,  
 o con farvi una ferita .

## E M P I N F A L O .

E' un ascesso nel bellico .  
 La *cura* esige evacuazion di marcia ; il  
 che si fa per *incisione* .

## S A R C O C E F A L O .

E' carne fungosa , che nasce e sporge dal  
 bellico .  
 N' è *causa* un ulcero del bellico .  
 Se ne fa la *cura* per tagliamento, legatu-  
 ra , o caustico .

## V A R I C O N F A L O .

E' intumescenza varicosa de' vasi circa il  
 bellico .  
*Si cura* con fomenti astringitivi .



## LIPONFALO.

E' intumescenza di pinguedine entro il bellico.

Ha gli stessi segni che il lipoma; e vi si fa la stessa cura.

## D O T T R I N A D E L L E D E F O R M I T À.

LE deformità sono allontanamenti dalla natural formazione di qualche parte.

Si dividono le deformità in 8. Classi:

1. *Clausure*; come *concrezion dell' ano*, della *vagina*, *bocca*, *prepuzio*, *uretra*. Queste concrezioni si tagliano con coltello.
2. *Accrezioni*, come, *dita concrete*, *articolari concreti*, *lingua concreta*. Le dita si distaccano col coltello; così anche un poco si schianta lo scilinguagnuolo; ma le concrezioni degli articoli sono incurabili.
3. *Soluzioni preternaturali*, come *labbro leporino*, ch'è una secca fessura del labbro superiore, e talvolta insieme del palato osseo.

La cura vuole, che le labbra secche della fessura si recidano con particolar forbice, e che poi la ferita si ri-

P A R T E II.

M

nif.

nisca con peculiar fascia uniente. Rare volte giova la *cucitura cruenta*.

4. *Parti soprannumerarie*, come sei dita nella mano o nel piede. Bisogna tagliar dall'articolazione il *dito soprannumerario*.

5. *Parti mancanti*; come mancanza di dito, testicolo, naso. Questi difetti sono incurabili, ma in vece del membro mozzato, si applica un membro artificiale.

6. *Grandezze preternaturali*; come; una parte troppo picciola o troppo grande, troppo lunga o corta. Per lo più questo vizio è incurabile. Quì anco si riferisce il *zoppicamento* per piede più corto; e l'*aridor di membro*, che talora con medicamenti irritanti ed insieme emollienti si cura.

7. *Curvature preternaturali*, come, collo torto, gibbosità della spina del dorso, contrattura di membra gambe sbilenche, rachitide.

Il collo torto si cura facendo taglio del muscolo sternomastoideo subito sopra lo sterno.


La gibbosità della spina del dorso, che solo è curabile negl'infanti, richiede l'ordigno del Sig. *Le Vacher*.

La contrattura di membrana esige unguenti emollienti, e fomenti di sopravvivoło vermicolare cotto in cervogia.

Le gambe sbilenche si curano con gambiere artificiali.

8. *Errori di luogo*; come, *occhio* in mezzo alla fronte, *vulva* sotto il bellico, *cuore* fuor del torace. Questi vizj son incurabili. Ma il *dente*, che sporge in fuori nel palato, si rimedia a cavarlo.
- 

## DOTTRINA DE' MORBI DELL' OSSA.



### DE' MORBI DELL' OSSA IN GENERALE.

**I** morbi, che infestano l' ossa, si dividono in *articolari*, e *sustanziali*.

*I morbi articolari*, che molestan la sola articolazione.

1. *Lussazione.*
2. *Diastasi.*
3. *Storta.*
4. *Lassità o rilassazione d' articolo.*
5. *Rigidità o anchilosi.*
6. *Tumori articolari.*
7. *Strepito.*
8. *Dolore.*
9. *Ferite.*
10. *Ulceri.*

*I morbi sustanziali*, cioè quelli che infestano la sostanza stessa dell' osso, sono:

1. *Frattura.*

2. *Fessura.*
3. *Tumori ossei.*
4. *Carie.*
5. *Spina ventosa.*
6. *Dolor osteocapo.*
7. *Fragilità.*
8. *Mollezza.*
9. *Deformità.*
10. *Ferite.*

## DELLE LUSSAZIONI IN GENERALE.

*Lussazione* è ritiramento dell' articolo mobile dalla sua cavità naturale.

Si divide la lussazione <sup>in</sup> *perfetta*, ove mezzo capo esce dalla cavità; è *imperfetta*, quando tutto il capo si ritira. Si divide anche in *semplice*, *duplicata*, e *complicata*; in *violenta*; in *recente*, e *inveterata*.

Si conosce la lussazione,

1. col toccare il tumor preternaturale e la cavità della region dell' articolo;
2. col vedere la diformità dell' articolo; e
3. dall' *impotenza* di moto naturale.

La cura elige 1. *Reposizione.*

2. *Ritenzion* nel sito naturale.
3. *Toglimento de' sintomi.*
4. *Corroborazione* dell' articolo rilassato.

La *reposizione* vuol estensione, contra estensione e introduzione dell' osso slogato,

Qual-

Qualche *piegatura* del sito del membro slogato è necessaria per la reposizione. La *ritenzione* in sito si fa con fasce, e con la quiete.

I *simptomi*, come dolor e *infiammazione*, si levano con *emission* di sangue, e con fomenti *resolutivi*.

La *relassazion* dell' articolo si cura con *medicamenti spiritosi*, e con fomento di *feccia di vino*.

Le *lussazioni complicate* con ferita di articolazione sono assai pericolose, e fan *tetano*. Le *ferite de' nervi*, e le *lussazioni da causa interna* si curano come i tumori articolari.

## DELLE LUSSAZIONI IN ISPEZIE.

### *Lussazion della Mascella.*

Ella solamente può slogarsi *in avanti* in uno o nell' uno e nell' altro condilo.

Quindi si divide in *semplice*, e *duplicata*.

La *semplice* si conosce dall' *obliquità* della bocca; la *doppia*, dalla bocca aperta, che non si può chiudere.

*Prognosi*. La *lussazion* è mortale, se non si ripone.

La *reposizione* richiede, che la mascella inferiore si prema prima in giù, poi dritto indietro.

Si lega colla fonda *mascellare*.

### *Lussazione della Nuca.*

E' lo scostarsi, che fa il capo colla prima

vertebra del collo, dai processi articolari della seconda vertebra del collo.

Questa può essere *destra*, o *sinistra*, e rotto il processo odontoideo ella può essere *davanti* o *di dietro*.

La *perfetta lussazion della nuca* è assolutamente mortale; l'*imperfetta* fa paralisi dell'estremità superiori.

#### *Lussazion delle Vertebre.*

E' il ritirarsi, che fanno le apofisi oblique di una vertebra, dalla sua compagna. Il ritiramento può succedere verso la *destra* o la *sinistra*.

Si conosce al tatto, alla vista, alla paralisi delle estremità inferiori. La *perfetta lussazione* di vertebra è mortale, dell'*imperfetta* bisogna tentar la *reposizione*.

*Reposizione.* Posto l'infermo sopra una gran botte, si faccia l'estensione e la contr'estensione.

#### *Lussazione della Costa.*

Il capitolo posteriore della costa si può solamente in dentro slogare dalla fossa articolare.

Si conosce dalla mobilità della costa slogata.

#### *Lussazione della Clavicola.*

Si può slogare l'estremità anteriore della clavicola, ed anche la posteriore.

Avviene in fuori la lussazione anteriore, od anche in dentro; la posteriore succede in su, o in giù.

#### *Lussazion dell'Omero.*

In tre modi si può slogar l'omero, *in giù, indietro, o in avanti.*

*Lussazion del Cubito.*

Il cubito può slogarsi dalla troclea o girella dell'omero, *in dentro, o indietro,*

*Lussazione del Radio.*

In tre modi il radio si può slogare dal processo capitato dell'omero; *in avanti, in dietro, in fuori.*

*Lussazione della Mano.*

Può essere in tre modi; *interna, esterna, e laterale.*

*Lussazione del Corpo.*

Uno degli ossi del carpo si può slogar *in fuori, o in dentro.*

*Lussazion della Dita.*

Le falangi delle dita possono disluogarsi *in fuori, in dentro, o lateralmente.*

*Lussazion del Femore.*

Questa può essere in quattro guise: 1. *in dentro e in su; 2. in dentro, e in giù; 3. in fuori e in giù; 4. in fuori e in su.*

*Lussazion della Patella.*

Si può disluogare *in fuori, o in dietro; ma anche in su, rotto il ligamento della patella inferiore.*

*Lussazione della Tibia.*

Può disluogarsi soltanto imperfettamente; *indietro, o alle bande.*

*Lussazion del Piede.*

Il piede si slonga *in avanti, e indietro; ma ancor in dentro, o in fuori, rotto il mallecolo.*

Le ossa del *tarso* e del *metatarso* dislogansi  
in su, e in giù. E

Le dita del piede si possono slogare come  
le dita della mano.

### D I A S T A S I.

E' ritiramento dell'osso immobile dal suo  
compagno; perchè il ritiramento dell'  
osso mobile si chiama *lussazione*. Si dà  
Distaasi o ritiro di sutura, nel *cranio*.

— — — — — d' ossa, nel *pube*.

— — — — — dell' osso *coccige*.

— — — — — della *fibula* e

— — — — — di qualche *epifisi* dall' osso.

### S T O R T A.

E' una violenta estensione di qualche arti-  
colo senza che vi rimanga *lussazione*.

*Si cura*, come la contusione, con emission  
di sangue, con fomenti resolutivi e  
insieme corroboranti, come ossicrato  
spiritoso, od acqua fresca.

### RELASSAZIONE D' ARTICOLO.

Se da *lussazione* o *storta* resti *relassazion*  
d' articolo, facciasi uso di corroboran-  
ti spiritosi, di fomenti astrittivi, o d'  
acqua fredda.

### A N C H I L O S I.

E' un tumor *articolare duro*, che fa immo-  
bilità di articolo.

Per



Per la durezza del tumore l'anchilosi *differisce* da idropisia d'articolo, nella quale si sente un tumor fluttuante.

La *division* dell'anchilosi è

in *perfetta*, nella quale l'ossa sono concrete (si compigliano) col succo osseo;  
in *imperfetta*, dove l'ossa non sono concrete.

*Diagnosi.* L'anchilosi *perfetta* si conosce dalla perfetta immobilità dell'articolo;

— — — e l'*imperfetta*, da qualche mobilità che ancor resta.

*Causa prossima* è l'ispessamento della sinovia, o la rigidità de' ligamenti, o la concrezione dell'estremità ossee.

La *cura* varia secondo la varietà della causa.

L'anchilosi per *rigidità* di ligamenti si cura con *unguento* e-molliente, e con *vapor* acqueo.

— — — per *ispessamento* di sinovia si cura con *unguento saponato*; con gomma ammoniacca soluta in aceto; con *doccia* o embrocca; *vapor* acqueo; con *bagni sulfurei*.

— — — per *concrezione* d'articolo è incurabile.

## TUMORI ARTICOLARI.

Sono i seguenti:

1. *Idropisia dell'articolato*: Vedi i *Tumori acquosi*.
2. *Tumori reumatici*, che si curano con fomenti secchi, o con vescicatorio, o con unguento mercuriale.
3. *Tumori podagrici*, che si guariscono con acqua fredda.
4. *Tumori albi o pituitosi*, che si sanano con vescicatorio.
5. *Tumori rachitici*: Vedi *Iperostosi*.
6. *Osteosteatoima di articolato*, che si fa grande e carioso. Bisogna farvi amputazione.
7. *Cartilagini mobili* negli articolati: si conoscono al tatto, e bisogna col ferro schiantarle.

## STREPITO D'ARTICOLO.

Questo per lo più si osserva negli scorbutici, per tenuità di sinovia, o per ritiramento delle epifisi.

Si cura con antiscorbutici.

## DOLOR D'ARTICOLO.

Egli è senza tumore; nasce da reumatismo, o da artrite, e si cura come il reumatismo.

U L.

## ULCERI D' ARTICOLI.

Si dividono in *penetranti*, e *non penetranti*.  
 I *semplici* si curano come in altro luogo.

I *cariosi*, se occupano tutto l'articolo, esigono amputazione; perchè di raro se ne può schiantar la carie.

## FERITE DI ARTICOLAZIONI.

Vedi la Dottrina delle Ferite.

## D O T T R I N A

## • DELLE FRATTURE.

**LA FRATTURA** è soluzione d'osso in due o più frammenti.

Si dividono la fratture.

1. dall'indole, in *semplici*,  
*duplicate*,  
*complicate*;
2. dalla figura, in *trasverse*,  
*oblique*,  
*bislunghe*,  
*sbriciolate*.

N'è *causa prossima* la violenza esterna, o l'interna fragilità dell'osso.

Si prende la *diagnosi* 1. dal *toccare*, un'ineguaglianza, o mobilità nel mezzo dell'osso; e 2. dall'*udire* strepito al moto dell'osso.

La cura vuole 1. *Reposizione.*

2. *Ritenzione in sito.*

3. *Sanazione.*

4. *Rimovimento de' sintomi.*

La *reposizione* non è necessaria che in fratture del femore.

Ella esige *estensione*, *contr' estensione*, e *composizione*.

La *ritenzione in sito* si fa con fascia e con ferule secche.

Qualche piegatura del *sito* del membro fratto è per lo più necessaria.

La *sanazione* la fa la natura mediante il glutine che trasuda, e che a poco a poco s'indurisce in callo.

Dall'età, costituzion di corpo, grandezza d'osso, e specie di frattura, si desume il *tempo della sanazione*. In 6, o 8. settimane si risanano le fratture semplici.

Il *movimento de' sintomi*, come dell'inflamazione, si ottiene con emission di sangue e con fomenti resolutivi.

Le *fratture complicate*, quelle dov'è ferita, lussazione, o cancrena, esigono rimedj specifici a questi stessi mali.

Le fratture molto *sbriciolate* fan d'ordinario cancrena.

## FESSURA DI OSSA.

E' spaccatura d'osso, non plenaria, ma imperfetta.

Da principio difficilmente si conosce; ma con-

continuando lungamente il dolore ,  
con infiammazion pertinace , e per l'  
ascesso carioso che ne segue , si viene  
a conoscerla .

Si *cura* alla prima come la contusione .  
Se il male non cede , bisogna far incisione , e dinudar il luogo carioso .

## TUMORI OSSEI

Tumori , formati dalla stessa sostanza dell'osso , sono i seguenti :

1. *Esofosti.*
2. *Tufo.*
3. *Gomma.*
5. *Iperofosti.*
5. *Sarcofosti.*

## E S O S T O S I.

E' un' *escrescenza* d' osso in tumore  
Ne dà segno un tumor profondo , continuo all' osso , e che ha durezza ossea e superficie ineguale .

Si *divide* in *benigna* , che vien da causa esterna e senza dolor osteocopo ; e  
In *maligna* , che duole , è livida , e viene da causa interna .

*Prognosi.* L' *esofosti benigna* spesso resta così in vita .

— *Maligna* sovente passa in carie .

La *cura* esige , che con cuneo e martello si estirpi dall' osso il tumore .

*Tu-*

## TUFO, E TOFO.

*E' intumescenza d'osso per elevazione dell'esteriori lamine ossee.*

*D'ordinario la sede è nella fronte, nello sterno, nelle clavicole, nel cubito, nella tibia.*

*N'è segno un tumor profondo, continuo all'osso, quasi duro come l'osso, e che ha superficie piana, colla quale differisce dalla esostosi.*

*Causa eccitante si è quasi sempre un contaminamento venereo.*

*Prognosi. Se il tufo non si risolve, egli va in carie.*

*La risoluzione si tenta con interne ed esterno uso di mercurio, e coll'infusione di Mezereu.*

*Nel tufo carioso bisogna far incisione e perforazione d'osso.*

## G O M M A.

*E' un tumor d'osso, formato da elevazione del periostio.*

*Ha i segni del tufo, ma è più molle.*

*Si cura come il tufo.*

## I P E R O S T O S I.

*E' intumescenza di tutto l'osso; e di tutta l'estremità dell'osso.*

*N'è causa il malfranzese; la rachitide, o la fessura dell'osso.*

*L'iperostosi rachitica svanisce da se; ma la ve-*

venerea, e quella che vien da fessura, passa in carie, e allora esige amputazione.

## SARCOSTOSI.

È tumor che nasce da trasmutamento di sostanza ossea in *carnea*.

*Segno* è un tumor profondo, continuo all'osso, ma spongioso; indolente da principio, ma poi assai doloroso.

Il *tumore adulto* passa in carie cancerosa e a morte.

La *cura* vuole amputazione.

## CARIE.

È una erosion d'osso, la quale ne consuma la sostanza.

Si divide la carie,

1. in *perfetta*, dove l'osso è già roso; e
2. in *imperfetta*, ove solamente il color dell'osso è viziato, divenuto pallido, giallo, fusco;
3. in *visibile*, ch'è nuda, e in *invisibile* ch'è coperta di carne fungosa.

Si conosce la carie a veder l'osso giallo, bruno, negro, e roso.

Con lo *stilo*, mediante il quale si trova nudo, o scabro l'osso; e

per

per l'efflusso di marcia  
nericante, di ranci-  
do odore.

La *causa* è *esterna*, come, contusione, fe-  
rita, nudità d'osso, ulcero del perio-  
stio; ovvero *interna*, come, acrimo-  
nia deposta sul periostio, venerea,  
scorbutica, scrofolosa, variolosa ec.

La *carie* da *causa esterna* si fana più facil-  
mente; da *causa interna*, difficilmente.

Nella *carie imperfetta*, dove il solo natu-  
ral colore dell'osso è viziato, stanno  
bene le cose balsamiche spiritose, co-  
me, *spirito masticino*, *essenza di mir-  
ra* o d'*euforbio*.

Nella *carie perfetta*, ove l'osso è nero e  
roso, convengono le seguenti:

1. *Caustici liquidi*, come, butiro d'an-  
imonio, acqua forte.
2. *Cauterj*.
3. *Punture* con trapano perforativo.
4. *Tagliamento* con cuneo, sega, trapa-  
no.
5. *Scavamento* con trapano sfogliativo.

In *carie d'articolazione* non sempre basta  
l'amputazione; bisogna schiantar la  
*carie*.

La *carie, che perfora il cranio*, bisogna  
schiantarla con molte trapanazioni.

Le *carie coperta* di carne fungosa vuole,  
che si levi con caustico la carne fun-  
gosa, onde la *carie* si possa trattar  
nuda.



## SPINA VENTOSA.

E' tumore, che nasce da carie interna d' un osso.

Si *divide* la spina ventosa in *occulta*, e *aperta*.

La spina ventosa *incipiente* si conosce al dolor osteocopo, ed a una macchia rossa della cutè, la quale dopo qualche tempo si alza in rubiconda e spongiosa intumescenza.

Finalmente questo tumore si apre con molti forami, ma non cade.

Egli suol aver la sua *sede* in ossa piccole, come nel tarso, nel carpo, o nelle dita.

N' è *causa prossima* la carie interna dell' osso, la qual nasce da peculiar deposizione di qualche acrimonia. E' malattia d' *infanti*; rara negli *adulti*.

*Curazione*. La spina ventosa talvolta si risolve con unguento mercuriale, se insieme dasi internamente acqua alba, assa fetida, cicuta con china.

## F R A G I L I T A'.

E' nell' ossa una disposizione, per cui agevolmente si rompono,

N' è causa l'età senile, lo scorbutico, il malfrancesco.

La *cura* dunque richiede nella vecchiezza buon vitto nutritivo; e nel mal-  
ve-

venereo, o nello scorbuto rimedj antivenerei o antiscorbutici,

### MOLLEZZA.

E' una disposizion dell' ossa, per la quale facilmente si posson piegare senza frattura.

Suol esserne *causa* un'acrimonia, o la rachitide.

La cura esige *antacidi*, *antirachitici*, e radice di robbia.

### DEFORMITA'.

Vedi la Dottrina *delle Deformità*.

### FERITE DELL' OSSA.

Vedi la Dottrina *delle Ferite*.

---

## DOTTRINA DELLE OPERAZIONI.

### \*\*\*\*\* DELLE OPERAZIONI IN GENERALE.

**L'***Operazione* è una manipolazione artificiale con o senza strumenti, colla quale si cura qualche morbo.

Si dividono le operazioni in *manuali*, e *stru-*

*strumentali* : si fan quelle con la sola mano ; queste con istrumenti .

In ogni operazione è uopo considerare le seguenti cose :

1. *Indicazione.*
2. *Contr' Indicazione.*
3. *Luogo.*
4. *Istrumenti.*
5. *Apparato di legatura,*
6. *Sito del malato.*
7. *L'operazione stessa.*
8. *Fasciatura, e 'l resto della cura-  
razione.*
9. *Disgrazie, che nell'operazione  
avvenir possano.*

## EMISSION DI SANGUE.

*Indicazione* è l'abbondanza di sangue ;  
la febbre infiammativa ;  
l'infiammazion gagliarda .

*Contr'indicazione.* Mancanza di sangue .

*Luogo.* Ogni vena si può tagliare : per lo più le seguenti :

Nel capo la vena frontale ,

———— angolare .

———— ranina .

———— jugulare esterna .

Nel braccio la vena mediana ,

———— cefalica ;

———— basilica .

Nella mano la vena salvatella ,

———— cefalica .

Nella verga la vena dorsale .

Nel

Nel piede la vena cefalica ,

——— safena ,

——— dorsale ,

——— malleolare .

*Instrumenti* . la lancetta , o 'l flebotomo .

• *Legatura* : spleniolo e fascia .

*Sito del malato* : in seggiola verso il lume .

• *Operazione* : 1. Si legghi la vena con legame al di sopra del luogo della puntura .

2. Con *lancetta* si punge la vena , la quale , all' estrazion della lancetta , si debba alquanto dilatare ; ovvero si punge la vena col flebotomo .

*Fasciatura* : Cavata la requisita quantità di sangue , si riunisce e sana la ferita con ispleniolo asciutto e fascia circolare .

*Disgrazie* : Quelle della mala amministrazione del salasso , sono ;

1. Il *trombo* , o rappigliamento del sangue , che dall' incisa vena esce nella tela cellulosa : si cura con ossicrato , o con fomento risolutivo .

2. *Aneurisma vero* , se resti offesa l' esterior membrana dell' arteria : si cura con graduata compressione .

3. *Aneurisma spurio* , se dall' incisa arteria il sangue sotto la cute fluisca nella tela cellulosa : anche questo richiede compression graduata .

4. *Gran-*

4. *Grande emorragia*, se resti offesa l'arteria brachiale e ne possa il sangue liberamente uscire. Allora il sangue schizza molto alto e con istrepito, ed è di color cremesino; ma a strigner fortemente su la puntura il legame, cessa il flusso di sangue.

*Cura*, sei splenioli gradatamente posti, il primo de' quali in se contenga un moneta di rame, si pongano alla ferita, sei altri splenj si mettano alla parte opposta del braccio, ed altri sei alla parte opposta dell'antibraccio; e tutti questi splenj tengansi con lunga fascia ben applicati per quindici giorni senz' altra rinovazione.

5. *Varice pulsante*. Se la ferita dell'arteria corrisponde alla ferita della vena, e non si salda, allora la vena si fa varicosa, e pulsa: si cura per compressione.

6. *Inflammazione gagliarda e gran dolore*, se si punge il nervo. Si resolve con acqua alba o con cataplasma emolliente.

7. *Il flusso di linfa*, che nel dì susseguente si osserva, se fu offeso il vaso linfatico, si cura con acqua tediata o con estratto di saturno.

8. *La suppurazione* nasce dall' antecedente infiammazione, e si cura con acqua vulneraria semplice o con balsamò vulnerario.

## OPERAZIONE DELL' ANEURISMA SPURIO.

*Indicazione.* Un aneurisma spurio sì grande, che non possa curarsi per compressione, richiede operazione.

*Preparazione di strumenti.*

1. Torno, o strettojo.
2. Scarpello acuto.
3. Solco ad apice acuto.
4. Ago con filo incerato.

*Preparazione di fasciatura:*

1. Diversi pinnacciuoli, e
2. Splenioni, o pezzette.
3. Fascia di sei braccia.
4. Sei pezzetti di fungo agarico.

*Sito dell'infermo:* in letto o in seggiola, steso sopra la tavola il braccio.

*Operazione.* 1. Col torno si comprime il tronco dell'arteria brachiale.

2. Si tagliano gl'integumenti comuni del tumore, e 'l sangue diffuso si leva via con una spugna.

3. Se all'istesso tempo il sangue fosse diffuso sotto l'aponeurosi del muscolo bicipite, allora bisogna incidere col coltello anco questa aponeurosi, e toglier anche

che da questo luogo il sangue grummoso .

4. Scoperta poi la ferita dell'arteria lesa , vi si applicano striscette di fungo agarico .

5. Si riempie , con pinnaccoli , e con asciutto panno lino sfilacciato , il restante spazio della ferita . Di sopra vi si legano splenioli con fascia .

6. Dopol' operazione si allenta a poco a poco il tor-  
no , ma non si leva .

*Altre fasciature .* Nel terzo giorno , quando la ferita comincia a suppurare , si fascj con balsamo d' Arceo il circuito della ferita , senza levarne il fungo agarico .

Se col fungo non si può fermare l' emorragia , allora conviene alzar l'arteria lesa , ficcandovi lo stilo , e legarla con ago .

## OPERAZIONE DELL' ANEURISMA V E R O .

*Indicazione .* Un aneurisma vero , prossimo a rottura , ovvero sì grande , che più non si lascj comprimere .

*Operazione .* 1. Applicato il tor-  
no dell' arte-  
ria brachiale , si schian-  
zino

tino gl'integumenti comuni del tumore.

2. Indi l'aponevrosi del muscolo bicipite si divida con coltello in modo , che il sacco dell'aneurisma apparisca nudo affatto .
3. Poi si apra il sacco aneurismatico , si evacui il sangue grommoso , e via si taglino le parti laterali del sacco .
4. L'arteria , introdottovi lo stilo , alquanto si alza , e bisogna con ago e filo legarla sopra il sacco aneurismatico , frappostovi uno spleniolo , guardando bene di non collegarvi anche il nervo mediano .
5. Poscia leghisi l'arteria anche sotto il sacco aneurismatico , acciò l'aneurisma si trovi intercetto fra queste due legature .
6. Finalmente empiasi la ferita di dieci lini sfilacciati , e si munisca di splenioli e fascia . Si faccia il restocome nell'aneurisma spurio .

*I sin-*



I *sintomi* susseguenti all'operazione, come, freddo dell'antibraccio, intumescenza e lieve paralisi, da se svaniscono il quarto o'l settimo giorno, dilatati i vasi laterali dell'arteria brachiale.

## OPERAZIONE DEL SETACEO.

*Indicazione*. Intenzione di far un ulcero artificiale.

*Luogo*: per lo più nella nuca.

*Preparazione di strumenti*. Ago largo con legame lungo, unto d'unguento di basilicone.

*Operazione*. 1. Il ministro e'l cerusico alzano la cute, nella nuca, in piega longitudinale.

2. Poi il cerusico ficca l'ago pel mezzo della piega, e lascia nella ferita il legame introdotto nella ferita.

3. Vi si mette su uno splenio, il quale si munisce con fascia circolare. Il legame irrita la ferita, acciò suppurì di più, e non ne segua concrezione.

## OPERAZIONE DELLA FONTANELLA :

*Si indica* dove si richiede ulcero artificiale.

*Luogo*: per lo più nell' esterno lato del braccio, dove il musculo bicipite e'l

PARTE II.

N

bra-

brachiale esterno lascian uno spazio pinguedinoso .

2. A quattro dita sopra il ginocchio , nell' interna superficie del femore .

3. A quattro dita sotto il ginocchio , nell' interna superficie della gamba .

*Operazione.* 1. Il ministro e' l' chirurgo alzano la cute in piega trasversale .

2. Questa piega si squarcia colla lancetta ,

3. Si mette nella ferita un pisello unto con unguento di basilicone , e di sopra vi si applica empastro , ~~pleniolo~~ e fascia .

4. Ogni dì vi si pone un nuovo pisello , acciò non si compiglji la ferita ; e si assoda la fontanella con peculiar coreggia in vece di fascia .

Il *metodo* di sugellare con caustico la fontanella , non è buono : non essendo profonda la ferita , difficilmente vi resta il pisello .

## CUCITURA CRUENDA DI FERITE.

*Indicazione.* Quelle ferite , che sì profonde sono e trasversali , che non si pos-

possan riunire nè con empiastrf , nè con fascia , richieggon *cucitura sanguinosa* .

*Contr' indicazione* . Le ferite molto contuse , o complicate con altra lesione , bisogna sanarle per suppurazione .

*Strumenti* . Tre aghi curvi , che hanno un quadruplo incerato .

*Operazione* . 1. L' ago , a un pollice dal margine della ferita , si ficca pel labbro sin nel fondo della ferita .

2. Poi lo stesso ago si torna dal fondo della ferita a cavar fuori per l' altro labbro della ferita , in detta distanza .

3. Levato l' ago si lascia il re-  
se nelle punture .

4. Così faccianfi tante punture , quanti pollici ha la lunghezza della ferita .

5. Finalmente , compresse le labbia della ferita , alla riunita ferita si soprappone un pimacciuolo bislungo , e di sopra vi si legan le fila in nodo elegante , il quale , occorrendo , si possa disciorre .

*Fasciatura* . Sopra il cucito si mettono splenij , bagnati con fomenti resolutivi , e si fermano con fascia .

Dopo 10. o 12. giorni, sanata la ferita, si tagliano da una banda le fila, dall'altra si cavano.

*Sintomi.* Ma se dalla cucitura ne venisse infiammazion grande, quella si dovrebbe allentare per alcuni giorni.

## A P P L I C A Z I O N E D E L V E S C I C A T O R I O .

*Indicazione.* L'intenzione di far una derivazione, un ulcero artificiale, o qualche evacuazione.

*Luogo.* Il capo, la nuca, lo spazio interscapulare, l'interna superficie del braccio, della coscia, della gamba, o dietro le orecchie.

*Operazione.* Si applica alla parte un empiastro vescicatorio, della grandezza, figura e grossezza di un tallero, e di sopra si colloca un empiastro diachilon semplice e uno spleniolo. Si ferra poi tutto l'apparato con fascia circolare, e si lascia così per 12. ora.

*Prima fasciatura.* Incisa la vescica, se ne sprema la linfa: se si richiede suppurazione più lunga, si fascia con *unguento* da vescicatorj; se n'è indicata la sanazione, si fascia con *unguento albo*.

Omettere la vescica, e insperger polvere di canterelle, è metodo cattivo, dolorosissimo, che lascia ulceri maligni.

Se,

Se , per replicati vescicatorj , sopravviene  
*disuria cruenta* , giova l' emulsion can-  
forata ,

## APPLICAZIONE DELLA PIETRA CAUSTICA.

*Indicazione* . Quando bisogna aprire l' as-  
cesso .

*Operazione* . 1. Al tumore , cui s' è incisa  
apertura , si attacca un  
empiastro .

2. Si mette sull' apertura la  
pietra caustica ammolita  
con saliva .

3. Di sopra vi si applica cen-  
cio lino sfilacciato , un  
altro empiastro , e uno  
spleniolo ; e tutto quest'  
apparato si ferma con fa-  
scia circolare .

Dopo alcune ore si leva l' apparato ; l'  
arsa crosta si ammolisce con un-  
guento , acciò s' apparti per suppu-  
razione .

## APPLICAZION DELLE MIGNATTE.

*Indicazione* . Quando bisogna evacuar l'emor-  
roidi cieche .

Le *mignatte* si rendono esurienti per fame .

Il luogo , dove si applicano , debb' es-

N 3 fere

fere ben lavato e fregato, o macchiatto di fangue.

*Operazione.* 1. Le mignatte involte con mano in panno lino, o con un fiaschettino, si applican alla parte, finchè fermamente si attacchino.

2. Se, succiato il fangue, si gonfiano quasi a crepare, lor si taglia via la coda.

3. Ottenuta sufficiente quantità di fangue, di sale e di cenere si aspergono le mignatte, se da se dal luogo non cadano.

4. Il luogo si lava con vin caldo, e così anche si fascia.

## TAGLIO D' ARTERIA.

La sola arteria *temporale* si può sicuramente incidere come la vena.

Si indica in mali pertinacissimi di capo o d' occhj.

L' *incisione*, per la parvità del ramo arterioso, debb' essere trasversa.

Con *fascia stellare o nodosa*, e con compression piramidale, si ferma l' emorragia, acciò non segua aneurisma.

IN'O-

## INOCULAZIONE DEL VAJUOLO.

*Indicazione.* Ad infanti sani, che ancora non hann' avuto il vajuolo, egli s' innesca.

*Contr' indicazione:* ogni morbo,

*Operazione.* Una lancetta, la cui punta è tinta puramente di vajuolo benigno, s'immerge sotto l'epidermide nell'esterno lato del braccio, nell'uno e nell'altro braccio; poi la puntura sotto l'epidermide s'inverte in guisa, che resti nella ferita una marcia variolosa.

In otto, o più giorni, spunta il vajuolo.

La ferita non si fascia: per tutto il tempo del morbo si tengano i bambini fuor del letto, in aria serena.

## TRAPANAZIONE DEL CRANIO.

*Indicazione.* 1. Effusion di sangue sotto il cranio.

2. Fessura o impression del cranio.

3. Carie che penetra il cranio: tutte cose ch'esigono trapanazione.

*Contr' indicazione.* Non si trapani, senza somma necessità.

1. in mezzo all'osso della fronte, a causa del seno longitudinale;

N 4

2. lo-

2. sopra le *ciglia* ; pe' seni pituitarij della fronte ;
3. nell' *anteriore e inferiore angolo* dell' osso parietale , a causa dell' *arteria spinosa* della dura madre :
4. in *mezzo e allato* della medietà dell' osso occipitale ; pel fine del seno longitudinale , e pe' seni laterali della dura madre ;
5. Su *niuna sutura* del cranio , perchè la dura madre sta fermamente alle suture attaccata ; quando sotto di lei non vi sia effusion di sangue .
6. Nè fur *osso vacillante* , acciò non s' imprima nel cervello qualche frammento d' osso .

*Strumenti requisiti per dinudar il cranio :*

*Scarpello.*

*Spatola detrusoria.*

*Per la trapanazione. Trapano perforativo.*

*Trapano a corona e piramide.*

*Chiave della piramide.*

*Cbiocciola elevatoria dell' orbitola riciso.*

*Setolina.*

*Dentifcalpio ( Stuzzicadenti. )*

*Meningofilace o Detrusor della dura madre.*

Per



Per alzar il cranio. *Elevatorio comune.*

— — *Petiziano.*

Per la fasciatura. *Pezzolina con refe.*

*Lamina di piombo cribra-*

*sa con appiccagnoli.*

*Tasta orbicolare.*

*Panno lino sfilacciato ,*  
*crudo.*

*Varj splenioli.*

*Fascia del capo, o mitra.*

*Sito dell'infermo:* in guisa, che la parte, a cui debbesi applicar il trapano, sia la più alta.

*Dinudazione del cranio,* con la quale si prepara il luogo da trapanarsi: ella si fa per incisione con iscalpello, col quale s'incidono in forma di X o di T gl'integumenti del cranio fin al cranio stesso, e colla spatola detrusoria dal cranio si separano.

*Trapanazione.* 1. Il chirurgo col trapano intero mediante la piramide imprime una *marca* nel luogo da trapanarsi.

2. Indi questa marca si rende più profonda col *trapano perforatorio*, acciò la piramide del trapano abbia sul cranio un punto fisso.

3. S'impone il *trapano intero*, e si continua a

N 5 tra-

trapanare fin nella *diploe* del cranio . Mentre colla chiave si leva dalla corona la piramide , i denti della corona si nettano da limatura col dentiscalpio e con la setolina .

4. Si torna ad imporre il trapano , ma *senza* piramide , e si continua a trapanare dalla *diploe* fin nell' intima superficie del cranio . Il *vacillamento* del riciso orbicolo dà a conoscere , che il cranio è perforatorio .
5. Allora con la *chiocciola* , con lo *stilo* , si leva l' orbicolo riciso dal trapano .
6. Poscia col *coltello lenticolare* si pulisce dai prominenti spigoli il riciso margine .
7. Così il sangue , se l' infermo sta su la ferita , esce spontaneamente , o ritenuto il sospiro , si sprema .
8. O se il sangue diffuso si ferma sotto la *dura madre* , questa si dee con  
la

la lancetta incidere in croce.

*Fasciatura*, 1. Al forame trapanato s'impone un orbicolo di tenue panno lino con filo.

2. Di sopra si mette una lametta di piombo cribrosa con maglie o appiccagnoli.

3. Una tasta orbicolare.

4. Più pimacciuoli.

5. Più splenj bagnati di fomento cefalico.

6. Tutte queste cose si assodano con fascia capitale, o con mitra di panno lino.

Se l'osso è franto ed anche impresso, bisogna con la lieva comune, o con la lieva Petiziana, alzare l'impresso frammento.

Se il forame tagliato col trapano non è solidamente fasciato, allora il cerebro si fa in un gran fungo, e questo dovrebbe ricadersi.

## ESTIRPAZIONE DEL POLIPO NASALE.

Questa si fa per estorsione se il polipo è piccolo, o per legatura s'egli è grande.

All'estorsione richiedesi una peculiar forcipe, con la quale si prenda il polipo, e torcendolo a poco a poco, e

per lungo tempo, nella radice, si svelga, ma non per forza.

Alla *legatura* si vuole un cannello particolare, in cui si fa passare un filo d'argento piegato in maglia.

1. Si applichi la maglia del filo attorno al ventre del polipo.
2. Mediante il cannello spingasi la maglia che abbraccia il polipo, col perpetuo rivoltolamento, fino alla radice del polipo.
3. Indi esteriormente sotto il cannello attraggansi le estremità del filo, e si contorca la maglia ormai collocata dintorno alla radice del polipo.

Così ogni 24. ore, mediante il cannello, vie più si contrae la maglia del filo; finchè in 14. giorni, più o meno, il polipo corrotto dalle nari sen cada.

L'estirpazion del polipo per *caustici*, o per *taglio*, è di rado possibile e sempre pericolosa.

## FERMAR L' EMORRAGIA NASALE.

Se non giova l'*acero* o l'*acqua fredda* tirata su per le nari, il *salasso* del piede, o l'*injezion* d'acqua vitriolata o tediiana; bisogna empier le nari di fungo agarico, o di cencio lino sfilacciato, e così turarle.

Spesse fiate giova tirar su pel naso fummo d'*allume* col mezzo d'un imbuto; co,  
per-

perto con maschera il viso , acciò quel fummo nol faccia assai rosso .

Se non giova neppure turar il forame anterior delle nari , allora bisogna turare anche il forame posteriore , ciò che ottimamente succede collo strumento dei Sig. *le Drane* .

## TAGLIAR LA TRACHEA .

*Indicazione* . 1. Quando l'angina infiammatoria , faccia soffocamento .

2. Quando un corpo eterogeneo sta fermo nella trachea .

*Strumenti* . Scarpello acuto .

Cannellina laringea del cel. Prof. *Richter* .

*Fasciatura* . Pezzolina di tela rarissima ( velo di lino . )

Empiastro finestrato ( a buchi . )

Spleniolo finestrato .

Fascia un pollice larga .

Panno lino sfilacciato .

*Sito del malato* . Sia egli sedente in seggiola :

*Operazione* . 1. Collo scarpello acuto , a tre dita su la trachea , si tagliano longitudinalmente dalla laringe gl'integumenti comuni .

2. La linea tendinosa , che dai muscoli sternoioidei e sternotiroidei si forma su la tra-

trachea, s'incide pur longitudinalmente.

3. Poi con lo scarpelo *cannullato* s'incide trasversalmente lo spazio membranaceo fra il 3zo e 'l 4to, o fra 'l 4to e 'l 6to anello cartilagineo della trachea.

4. Estratto lo scarpello, si affoda nella nuca la cannellina mediante i ligamenti di questa.

*Fasciatura*. Di sopra e di sotto si riempie la ferita di panno lino sfilacciato.

*Copertura della cannellina*.

1. Ella si copre di panno lino raro ( di velo ; ) e poi

2. D'empiastro finestrato ; a cui si sovrappone

3. Uno splenio pur finestrato, e

4. Tutte queste cose si ferrano avvolgervi circolarmente la fascia larga un pollice.

*Curata l'angina* ( il che si conosce dalla facile respirazione, chiudendo col dito l'apertura della cannellina ) si cava la cannellina, si riunisce con empiastro la ferita, e così si sana.

Se la *tracheotomia* è indicata per causa di *corpo eterogeneo* fermato nella trachea, allora bisogna fare l'incision longitudinale della trachea per quattro o sei anelli cartilaginei, affinchè poi,

poi , ficcando la forcipe nello scavo della trachea , si possa comodamente estrarne il corpo eterogeneo .

## TAGLIAR L'ESOFAGO .

L' incisione dell' esofago si chiama *esofagotomia* .

*Indicazione* . Quando un corpo eterogeneo grande sta talmente attaccato all' esofago , che non si possa muover di luogo nè in su , nè in giù .

*Luogo dell' incisione* . Lungo la trachea nel lato sinistro ,

*Operazione* . 1. Lungo il sinistro lato della trachea facciasi incision longitudinale degl' integumenti comuni del collo .

2. Con uncino largo e ottuso rattengansi dalla trachea le parti molli .

3. La parte prominente dell' esofago incidasi longitudinalmente in guisa , che la ferita basti per l' estrazione del corpo .

4. Poi con forcipi , con le dita , o col cucchiajo , si cavi dall' esofago il corpo eterogeneo .

Fatta l' estrazione , si riunisce la ferita con empiaastro , splenioli e fascia .

## CAVAR DALLE FAUCI UN CORPO ETEROGENEO.

I Corpi eterogenei si cavan dalle fauci ,

1. colle dita.

2. colle forcipi .

3. con la balena .

Se non si può cavarli , si caccino con la balena giù nel ventricolo .

I metalli , eccetto il ferro che si solve con acidi , se restan nel ventricolo , si posson solve con mercurio vivo . Si può anco schiantar dal ventricolo corpi più grandi , e indissolubili .

## RICIDERE LA MAMMA .

*Indicazione.* Se la mamma è cancerosa .

*Contr' indicazione.* 1. Se il canchero viene da causa interna . 2. Se la mamma sta fortemente attaccata al muscolo pettorale . 3. Se più parti , come le glandule ascellari , son già cancherose , e se perpetuamente arrossano i tarfi delle palpebre .

*Strumenti* . Scarpello acuto , e

Ago con refe per legar l'arteria mammaria .

*Fasciatura.* Gomitolo grande di panno lino sfilacciato .

Splenj , o pezze .

Fascia .

*Ope-*



*Operazione* . 2. Facciasi incisione per la mamma dello sterno verso l'ascella. 2. Poi sollevisi con la man sinistra la pinguedine di tutta la mamma , e con perpetui tagli ella si separi dal muscolo pettoral maggiore . 3. Indi si leghi l'*arteria mammaria* chè piove sangue , ciò che rare volte è necessario .

*Fasciatura* . 1. Si mette sulla ferita il *gomitolo* grande , asciutto , o bagnato di spirito di trementina .

2. Due *empiastri* lunghi posti in croce .

3. *Splenioli* .

4. *Fascia* .

Nel terzo dì , mediante il balsamo d'Arceo , si procura la suppurazione , poi la guarigione , e finalmente la cicatrizzazione .

## PARACENTESI DEL TORACE.

Ella è *indicata* , quando bisogna cavar dallo scavo del torace il *sangue* , l'*acqua* o la *marcia* , che v'è diffusa .

*Luogo* . A latitudine di una spanna dalla spina del dorso , sopra la terza costa spuria contando dalla più bassa .

*Strumenti* . Coltello acuto .

— a punta ottusa .

*Fasciatura* . Cannello , o pezzolina senza orlo .

Pi-

Pimacciuolo .

Fascia larga .

*Sito dell' infermo* : Sur una seggiola volti egli le spalle al lume .

*Operazione* 1. Si ricida la cute longitudinalmente fino a tre pollici .

2. Pur longitudinalmente si tagli il muscolo latissimo del dorso .

3. Poi trasversalmente s'incidano fin alla pleura i muscoli intercostali : si faccia l'incisione nella metà dello spazio intercostale .

4. Facciasi alla pleura una piccola ferita trasversale . Con lo scarpello capitato si dilati questa ferita a mezzo pollice .

5. Così all' infermo , collocato sulla ferita , vien fuori il sangue , l' acqua o la marcia contenuta nello scavo del torace .

*Fasciatura* . Uscito il fluido , la ferita , intrusovi il panno lino senza orlo , si fermi con pimacciuolo e fascia larga . E se altropiù non esce dalla ferita , si consolidi la ferita con empastro tenace .

Se alla pleura si fosse attaccato il polmone nel luogo della operazione , allora bisognerebbe staccarlo dalla pleura colla cima del dito mignolo ; o se questa  
sepa-

separazione fosse impossibile, si dovrebbe istituire una nuova operazione a quattro dita dallo sterno fra la sesta e la settima costa vera.

## TRAPANAZION DELLO STERNO :

*Si indica*, quando nello spazio anteriore del mediastino sotto lo sterno vi s'asconda *sangue* o *marcia*.

L'operazione si fa cogli stessi strumenti e metodo che nella trapanazione del cranio .

## PARACENTESI DELL' ADDOMINE .

*Indicazione*. Idropisia dell'addomine , incurabile per via di medicamenti .

*Luogo* . Nel mezzo fra l' anteriore spina dell'osso ileo , e 'l bellico . Si misuri il luogo con un filo , e si segni con inchiostro .

*Strumenti* . Ago da tre coste .

*Vasi* per ricever l' acqua .

*Fasciatura* . *Cintolo* addominale .

*Spleniolo* bagnato di spirito di vino .

*Cardiaci* , come , vino forte .

*Sito* per l' operazione : sedendo alla sponda del letto

*Preparazione* . Col cintolo ben si comprime l' addomine , e si apre la finestra del cintolo .

*Ope-*

**Operazione .**

1. Il chirurgo , nel luogo segnato , immerge un poco obbliquamente nello scavo dell'addomine l'ago da tre coste .
2. Cava l'ago dalla cannellina , e lascia questa nell' addomine .
3. Riceve in un vaso l'acqua che ne vien fuori .
4. Ogni qual volta s' allenti il cintolo addominale , si torna colle sue coreggie a stringerlo bene .
5. Uscita l'acqua tutta , il chirurgo cava la cannellina , e fascia la ferita con ispleniole , o pezzetta bagnata di spirito di vino , o con empiaastro anglicano , e lascia per alcuni giorni applicato all'addomine il cintolo addominale .

Se sotto l'operazione sopravviene *deliquio d'animo* , si tura subito la cannellina , si contrae il cintolo , e si ristora l'infermo con acqua fredda e vino cardiaco .

Se non sopravviene deliquio , si manda fuori tutta l'acqua senz'altra interruzione .

## GASTRORAFIA, o CUCITURA ADDOMINALE .

**Indicazione .** Penetrante ferita dell' addomine .

**Strumenti .** Se la ferita è lunga 4. pollici , si richieggono

1. Sei *aghi grandi e curvi* .
2. Tre fila *incerate* : un ago a ciascun capo di refe .

3. Bac-

3. *Bacchetta* di calamo,

4. *Pimacciuolo bislungo*, unto di balsamo d'arceo.

*Operazione.* 1. Col dito indice e col pollice della mano sinistra si attrae il peritoneo. 2. L'ago di un capo si conduce da dentro in fuori per lo peritoneo e per tutte le parti molli. 3. simil puntura facciasì nell'opposto lato con l'ago dell'altro capo. E così faccian sì tre cuciture.

Sopra la *bacchetta* finalmente si costringano le fila in nodo elegante.

## ENTERORAFIA, o CUCITURA INTESTINALE.

*Indicazione.* Intestini mezzi o tutto tagliati.

*Strumenti.* Aghi curvi e sottili.

*Fila* incerate, ma di color diverso.

*Tubo* fatto di carta da gioco, lungo due pollici.

*Operazione.* 1. Si fascia nella porzion superiore del tagliato intestino il tubo di carta.

2. Poi questa porzion d'intestino insieme col tubo si mette sopra la porzion inferiore del tagliato intestino.

3. Uniti gl'intestini, vi s'immerge talmente l'ago curvo,

vo, ch'egli torni ed emergere dall' altro margine dell' intestino leso e della carta intronessa.

4. Finalmente si leva l' ago dal refe, e i due capi del refe solamente si contorcono, non si costringono in nodo.
5. Si faccia due o tre di queste cuciture. Poscia alla cute saldamente s' incollino con tenace empiastro le fila fuor della ferita dell' addomine, e finalmente riuniscasi per gastrorafia la ferita dell' addomine.
6. In capo di 20. giorni le fila da una parte si tagliano, e da quella banda si cavano dagl' intestinti. In quel mentre il tubo di carta esce colla feccia alvina.

## FORMAR UN ANO ARTIFICIALE.

*Indicazione.* Se non può farsi la cucitura intestinale, uniscasi per cucitura il capo superiore del taglio intestino alla ferita addominale; e perchè la ferita non si compigli, si metta su la ferita una tasta.

L' orificio dell' ano artificiale si comprime con *palla* incavata a *Bracchier elastico*,  
af-

affinchè non esca perpetuamente la  
feccia .

## ERNIOTOMIA.

*Indicazione.* Se l'ernia è incarcerata , nè  
v'è altra arte di ridurla ,

*Strumenti.* Scarpello semplice .  
—— occulto .

Solco ,

Dilatatorio .

*Fasciatura.* Panno lino sfilacciato .

Fascia larga T.

Splenioli o pezzette .

*Sito del malato.* In letto , alle le ginoc-  
chia e lontane una dall'altra .

*Operazione.* 1. Fate incision longitudinale  
degli integumenti dell'er-  
nia dall'anello fin in fon-  
do dello scroto .

2. Fate una piccola incisione  
del sacco ernioso , ficcate-  
vi il solco cavo e dilata-  
tela in su fin all'anello  
inguinale .

3. Se poi , attesa la strettezza  
dell'anello , non potete  
riporre le parti prolapse ,  
dilatatelo col dilatatorio ,  
o con lo *scarpello occulto* ,  
in su e insieme in dentro  
verso il bellico a mezzo  
pollice .

4. Finalmente riponete gl' in-  
testi- < .

testini , e poi l'omento  
prolaspo .

Ma se l'omento è scirroso , o cancrenoso ,  
ricidetelo .

Se gl'intestini fossero cancrenosi , formere-  
te un ano artificiale ; imperciocchè di  
raro può farsi l'enterostasia .

*Fasciatura* . Si riunisca la ferita con pi-  
macciuoli , pezze , e fascia .

## OPERAZION CESAREA .

*Indicazione* . 1. Se la femmina muore di  
gravidanza .

2. Se per la strettezza della  
pelvi si fa impossibile il  
parto .

3. Se il feto è concepito fuor  
dell'utero , o s'è sdrucio-  
lato fuor dell'utero rotto .

*Operazione* . 1. Fate a latitudine di una  
spanna dal bellico una fe-  
rita di sei pollici fin nel-  
lo scavo dell'addomine .

2. Nella parte laterale dell' ute-  
ro fate una ferita di cin-  
que pollici , e poi estraete  
il feto e la placenta .

3. Contratto l'utero , e spur-  
gato dallo scavo dell' ad-  
domine il sangue , unirete  
per gastrorafia la feri-  
ta addominale .

In



In femmina *morta* si fa la stessa operazione come in femmina *viva*. Ma quest'operazione in femmina *viva* è pericolosissima, e rare volte ha buon esito.

## PARACENTESI DELLO SCROTO.

*Si indica: nell'idrocele vaginale dello scroto.*

Con *picciol ago da tre coste* pungente il fondo dello scroto, un poco obliquamente per non offender il testicolo, il quale colla man sinistra, sotto la puntura, dovete premere in su.

Di rado la puntura sana *radicalmente* l'idrocele; ma soltanto la sana a tempo in via palliativa.

Di spesso una grand' *ematocoele* succede alla puntura dello scroto. Questa richiede una grand' incisione allo scroto.

## TAGLIO INTERO DELLO SCROTO :

*Si indica: nell'idrocele vaginale.*

1. Tagliate longitudinalmente la cute.
2. Dilatate questa ferita su e giù fin al fondo dello scroto,
3. Così pur incidere la tunica vaginale del testicolo.
4. Mandato fuori il liquido acquoso, riempite tutta la ferita di panno lino sfilacciato, ed eccitata la suppurazione, sanatela.

## SETACEO DELLO SCROTO.

*Si indica nell'idrocele vaginale.*

Si passi l'ago da tre coste per lo scroto, e vi si lasci per alcune settimane il legame.

## CASTRAZIONE.

*Si indica, in canchero del testicolo.*

*Contr'indicazione.* Se il funicolo spermatico è già feirroso di là dall'anello inguinale.

*Operazione.* 1. Dinudate il testicolo per intersezione dello scroto.

2. Poscia con ago più largo e con refe quadruplo legate tutto il funicolo spermatico su lo spleniolo.

3. Finalmente separate, sotto legatura, il testicolo dalle parti vicine, ma lasciatevelo acciò imputridisca, e poi ricidetelo sotto la legatura.

4. Riempite di panno lino lacerò tutta la ferita: fatta la suppurazione, della risana.

## TRONCARE LA VERGA.

*Indicazione.* Cancchero della ghianda e del prepuzio.

L'operazione si fa per *legatura*, o per *taglio*.

La legatura esige, che si ficchi nell'uretra una

una *cannellina d'argento*, acciò l'infermo possa pisciare in tempo che si lascia la legatura nel membro.

Nel *taglio* della verga per coltello, il sangue salta fuori da due arterie. Se con acqua *tediana* non potete fermar questa emorragia, comprimete il membro con una fascia alla *cannellina* ch'è nell'uretra.

## C A T E T E R I S M O.

*Indicazione.* Ogni *ritenzion d'orina*; ed anche il caso di *esplorar* il calcolo nella vescica.

Si applica il catetere in due modi.

1. Col metodo semplice.

2. Col metodo di *version magistrale*.

Nell'*applicazion semplice* si tiene il membro colla man sinistra, e si ficca il catetere, con apice unto d'olio, nell'uretra in modo, che la curvatura del catetere sia volta all'ingiù, e così egli a poco a poco s'immerge nella vescica.

Nell'*applicazion magistrale* si pone all'uretra il catetere in modo, che la sua curvatura sia volta in su; così immergesi il catetere quanto si può, poi subito si volta in giù la curvatura del catetere; e così talora il catetere penetra più agevolmente nella vescica.

Ficcato il catetere, si estrae il filo d'argento, si manda fuori l'orina, che si riceve in un vaso.

Alle *femmine* più facilmente si applica il catetere , perchè l'uretra loro è più corta e dritta . Si ha per esse un catetere *particolare* , che è corto .

## PUNTURA DELLA VESCICA .

*Indicazione* . Se l'*orina* , già lungamente ritenuta , non si può col catetere in verun modo estrarre , e già fia l'infermo in pericolo di morte .

*Strumento* . Ago da tre coste , lungo e curvo .

*Luogo* . Il più sicuro è per l'intestino retto .

*Operazione* . Mettete nell'intestin retto due dita della man sinistra ; fra queste ficcate l'ago in guisa , che possiate introdurlo per l'intestino fin nella vescica .

Cavate poi l'ago , e lasciate nelle ferita e nella vescica la cannellina per alcuni giorni , cioè finchè l'*orina* esca da se per l'uretra .

## URETROTOMIA .

*Si indica* , in calcolo impiantato nell'uretra . Il *luogo* è nella inferior parte della verga , dove si sente il calcolo .

Fatevi un'incision longitudinale per poter con piccolo cucchiajo o forcipe cavar il calcolo ,

Sanate poi la ferita con empiaastro adesivo .

## OPERAZION DELLA FISTOLA DELL' ANO.

*Si indica*, in fistola completa od incompleta, che in altro modo è insanabile.

*Contr' indicazione*. Se la fistola è troppo alta; se v'è carie nell' osso sacro; se è già consunta ogni pinguedine intorno all' intestin retto; e se la fistola dell' ano è cancherosa.

*Strumenti*. Coltello curvo a punta ottusa.  
Forbice.

*Fasciatura*. Tasta lunga.  
Diversi pinnacciuoli.  
Splenj, o pezze.  
Fascia T.

*Preparazion del malato*. Nel di avanti l' operazione egli piglia un purgante. Alcune ore avanti l' operazione gli lava gl' intestini un sorviziale: A ple- torici si cava sangue.

*Sito*. Si mette il malato in letto, inginoc- chione e col petto piegato in avanti.

*Operazione*. 1. Ficcate nell' intestin retto l' indice della mano sini- stra unto d'olio, e tocca- te con la punta del dito l' orificio interno della fi- stola.

2. Colla destra ficcate per la fistola il coltello fin nel- lo scavo dell' intestino retto.

O 3

3. Col-

3. Colla punta dell' indice ch' è nell' intestino , e coll' altra mano , mediante il manubrio ch' è fuor della fistola , si tiri in giù per tutte le soggiacenti parti il filo del coltello .
4. Indi se vi sono callosità , si tagliano colla forbice .

*Fasciatura* . Si mette nell' intestino retto una tasta lunga . Si empie di cencio sfilacciato la ferita , e di sopra si ferra con pezze , e fascia T.

Nell' operazion della *fistola incompleta esterna* , bisogna con coltello perforar l' intestino retto , e poi fare ulterior sezione , come nel primo caso .

Per la *fistola incompleta interna* , bisogna prima far esternamente un' incision nel fondo della fistola ; e così di fistola incompleta ella divien completa , ed esige la medesima operazione .

Le fistole più alte si schiantano collo strumento del cel. D. Brambilla .

## AMPUTAZION DEL FEMORE .

- Indicazione* .
1. *Sfacelo* di tutta la gamba ;
  2. *Stritolamento* dell' ossa della gamba .
  3. *Carie magna* dell' articolazion del ginocchio .

*Contr' indicazione* . Sfacelo che già ascende all' anguinaia , o che è nato da causa interna .

*Stru-*

*Strumenti.* 1. *Torno o Strettojo.*

2. *Ago curvo* con fila incerate  
e con piccolo spleniolo.

3. *Coltello grande falcato.*

4. *Coltello dritto.*

5. *Sega.*

6. *Legame.*

7. *Pano lino fesso.*

*Per la fasciatura.* 1. *Pimacciuoli* bagnati con  
ispirito di trementina.

2. *Gomitolo grande* di panno  
lino sfilacciato.

3. *Due empiastri* lunghi.

4. *Splenio* in forma di croce  
di *Malta*.

5. *Due splenj* lunghi.

6. *Fascia* lunga sei braccia,  
avvolte in due capi.

*Sito dell' infermo.* Segga egli in sedia grande,  
o in letto, verso il lume.

*Operazione.* 1. Si applica il *torno* all'arteria  
femorale, ch'è nell'interna parte del femore.

2. A due dita sopra il ginocchio si lega un *legame*,  
lungo il quale si deve far l'incisione.

3. Col *coltello falcato grande* si faccia incision circolare di  
tutte le parti fin all'ossa.

4. Poi col *coltello dritto* si rade in giù il periostio.

5. *Levato il legame:* si applica

il panno lino *fesso* in guisa che con esso l'ajutatore tiri in su le carni.

7. Finalmente colla *segamagna* si ricide l'osso del femore, e si leva via la parte troncata e l'panno lino *fesso*.

7. Si relassa un poco il *torno*, acciò dal sangue, che salta fuori, veder si possa dove stia l'arteria femorale tagliata.

8. Per la pinguedine, che circonda l'arteria, s'immerge l'*ago curvo* accanto all'arteria, e dall'altra banda dell'arteria si torna a cavar l'ago, e si leva dalle fila. Indi all'arteria si applica un piccolo *splenio*lo, e di sopra vi si costringon in nodo le fila.

#### *Fasciatura.*

1. Legata l'arteria, si mette sull'osso tagliato un *pimaeciuolo* bagnato di spirito di trementina.

2. Su tutta la ferita si mette il *gomitolo* grande, asciutto.

3. Si ferra il *gomitolo* con due *empiastri* lunghi, posti in croce.

4. Indi si sovrappone lo *splenio*, croce *Maltese*.

5. In fine, si ferra ogni cosa con *fascia*.



*scia*, circolarmente e replicatamente  
ravvolta d'intorno alla parte troncata.

6. Il mozzato femore si pone sur un *sacco di strame*. Si relassa a poco a poco il torno; ma non si levi del tutto ne' primi giorni.

*Resto della cura*. Nel terzo di si leva tutta la fasciatura, e si mette il gomito lo grande, unto di balsamo d'Arceo, acciò si muova suppurazione alla ferita; e in vece della fascia lunga si applica la *fascia moltiplicata*.

Fatta da per tutto la suppurazion della ferita, si sana la ferita con acqua vulneraria, e l'osso con ispirito di trementina, o con essenza masticina.

D'ordinario circa il dì quartodecimo la legatura cade dall'arteria legata.

Sanata la ferita vi si adatta una gamba artificiale di legno.

Nell'amputazion della *gamba*, la *carne interossea* si taglia col coltello dritto, e si spigne in giù. Poi colla sega si taglia prima alquanto la tibia, e finalmente insieme anche la fibula.

Nel *femore* bisogna legar l'arteria femorale, nel *braccio* la brachiale; nella *gamba* la tibial anteriore, la tibial posteriore e la peronea, nell'antibraccio la cubitale, la radiale e l'interossea.

Se bisogna troncar la *falange* della mano e del piede, si tagli dall'articolazione;

## D O T T R I N A

## D E' M O R B I

## D E G L' O C C H J.



## O F T A L M I A.

**E'** infiammazione della membrana albuginea dell' occhio.

*Si divide in umida*, che dalle lagrime si conosce, e

*in secca*, la qual è senza lagrime.

*L' infiammazion d'occhi umida si risolve.*

1. Con *emission di sangue*.

2. Con *purganti*.

3. Con *vescicatorj* nella nuca, o

4. Con *mignatte* alle tempie.

5. Con *collirj*, ed *acque ofthalmiche* mitamente astringenti, come,

*Acqua di rose vitriolata.*

----- *vegeto minerale.*

----- *frigidissima.*

*L' ofthalmia secca richiede collirio emolliente, come,*

*Cataplasma di bricioli di pan bianco, e latte.*

----- *di polpa di mele con gruogo e canfora.*

*L' ofthalmia per contusion d' occhio vuote vin*

vin tepido , in cui sieno infuse erbe  
cefaliche .

L'*oftalmia inveterata* chiede , oltre i sud-  
detti rimedj , anche *setacei e fonta-  
nelle* .

## I P O P I O .

E' *effusion* di marcia nell' anterior camera  
dell' occhio .

Se con *fomenti resolutivi* non si assorbisce  
la marcia o non trasuda pe' pori della  
cornea ; bisogna far una piccola *inci-  
sione* nella parte inferior della cornea ,  
affinchè la marcia possa uscire .

## P T E R I G I O .

E' una macula opaca nella cornea pellucida  
dell' occhio .

La cura esige

1. *Unguento sentiviano* .
2. *Butiro fresco con precipitato rubro* ;  
ovvero
3. *Polvere oftalmica* , fatta di parti egua-  
li di zucchero , cremor di tartaro , e  
bolarmeno .

## T R I A C H I A S I .

E' un' inversion delle ciglia verso il bulbo  
dell' occhio .

La cura esige , che si svelgano con *picciole  
mollette* le ciglia riverse .

## FISTOLA LACRIMALE.

È un efflufo di moccio puriforme dai punti lagrimali.

Si divide in *aperta*, che ha un ulcero nell'angolo interno;  
                   in *occulta*, ch'è senza ulcero esterno; e  
                   in *complicata*, che va congiunta con ostruzione del duto nasale; coll'orificio calloso dell'ulcero, e colla carie dell'osso unguis.

L'*occulta* fistola lagrimale si cura con *instillarvi* collirio vitriolato. Non giovano le *injezioni* fatte per l'inferior punto lagrimale mediante il *sisone Anelliano*.

L'*aperta* fistola lagrimale si cura come un altr'ulcero calloso.

Ma la fistola lagrimale *complicata* coll'*ostruzione* del duto nasale, richiede, che s'*incida* il sacco lagrimale, e che l'ostruzione si levi con lo *stilo*, o con *setaceo di corda di violino*, ficcato nel duto nasale.

La fistola *complicata* con *carie* dell'osso unguis si sana con ispirito di vin masticino.

## C A T E R A T T A.

È cecità provegnente da opacità delle lenti cristallina.

Cau-

*Causa prossima* è un'ostruzione della sostanza della lente cristallina. Assai di raro la *pellicola*, che copre la pupilla, è causa della cateratta.

*Si conosce* questa cecità al veder albicante la pupilla dell'infermo, la quale in istato di sanità debb'esser vera.

Rarissime volte *si cura* la cateratta con medicamenti: ma si possono tentar quelli, che giovano contra l'amaurosi. Se ad essi non cede, bisogna far l'operazione, ch'è di due sorte.

1. per *estrazione* della cateratta;
2. per *depression* della cateratta.

## A M A U R O S I .

E' *cecità plenaria* senz'altro apparente vizio dell'occhio che dilatazion di pupilla.

N'è *causa prossima* una paralisi del nervo ottico o della membrana retina.

Dato alcune volte il tartaro emetico, ed inciso alla muca un setaceo, alla cura posson giovare i seguenti specifici.

1. *Infusion d'arnica*.
2. *Estratto di pulsatilla nericante*.
3. ——— di aconito con mercurio dolce.
4. *Elettricità. Vescicatorj. Fontanella*.

## ETROPIO.


E' inversione della palpebra inferiore ;  
 La cura , vuole che si ricida con forbice  
 la carne fungosa della riverfa palpebra .  
 Non giova punto l'esterna incisione  
 della palpebra cutanea trasversale .

---

## DOTTRINA

## DE' MORBI

## DE' DENTI.



## ODONTALGIA.

E' dolor di denti .

*Odontalgia reumatica* è quel dolor che nasce da infiammazione reumatica di gengia . Bisogna lavarle con acqua di ruta o radice di piretro cotta in vino ; e internamente pigliar sudoriferi .

*Odontalgia cariosa* . Bisogna cavare il dente .

*Odontalgia consensuale* , cioè da favorra del ventricolo , o da gravidanza : nel primo caso si cura con vomitorio ; nel secondo , con salasso e medicamenti nervini .

DEN.

## DENTIZION DIFFICILE DEGL' INFANTI.

Il dente, che spunta, fa nella gengia una macchia bianca, o un tumor rosseggiante. Sene vien convulsione, bisogna dolorosamente squarciar la gengia.

### P A R U L I D E.

E' un *tubercolo* infiammativo nelle gengie. Suol nascere da radice *cariosa* di qualche dente.

L'infiammazione *incipiente* si può talvolta risolvere mediante un *collutorio* d'erbe risolutive.

Se la resoluzione non succede in 24. ore, bisogna promuovere la *suppurazione* con un *collutorio* di fichi cotti in latte.

Indi con la lancetta si apre l'*ascesso*.

Si sana poi l'*ulcera* con un *collutorio vulnerario* di decotto di ruta e salvia con mele rosato.

Curato il tumore, si cava il dente carioso, altrimenti in poche settimane ritorna il male.

### E P U L I D E.

E' un *tubercolo fungoso* che nasce alla gengia: N'è causa la carie dell'alveolo.

La cura vuole, che si tagli il tumore: e si cavi il dente carioso.

TAR-

## TARTARO DE' DENTI.

E' un moccio terreo, che incrosta i denti :  
 S'egli non si può distruggere con polvere  
 di conchiglie preparate, o solvere con  
 aceto, allora bisogna schiantarlo a  
 miccino con instrumento acuto.

## DENTI VACILLANTI.

Si osservano ne' vecchj, negli scorbutici,  
 e in chi fa uso di mercurio. Giova  
 un *collutorio* astringente, o tintura di  
 lacca.

## EMORRAGIA ALVEOLARE.

Quella che viene per dente cavato, si ferma  
 con aceto caldo e forte.

Ma s'è troppo il flusso di sangue, allora  
 con istilo acuto si straccj l'arterietta  
 attaccata al fondo dell'alveolo, poi si  
 riempia l'alveolo con fungo agarico  
 o con carta sugante masticata, e s'  
 affodi con soprapporvi altro corpo du-  
 ro e ben collegando le due mescele.

## CARIE DEI DENTI.

Se quasi tutt' i denti sono nericcj, facciasì  
 lungo uso di un *collutorio* di ruta e  
 salvia.

In:



In carie *foraminosa*, empiasi d'oro il buco, o si scotti con rovente stilo.

Le carie *magna* vuol che si cavi il dente; il che si fa colla *chiave inglese*, o col *pellicano*, o colla *forcipe dentaria semplice* o composta.

Cavar un dente a' scorbutici, o da gengie molto infiammate, è cosa assai pericolosa.

## MORBI CUTANEI.

### VERRUCHE.

**B***enigne*, cioè non dolenti, toccatele ogni dì con *ispirito di vitriuolo*, e coprittele d'*empiaastro* albo. Le *maligne*, che son livide e dolenti, vanno in canchero.

### C A L L O.

I calli delle dita de' piedi ammolliteli con *pediluvj*, poscia con piccol *empiaastro vescicatorio* o *dichilan* copriteli.

### S C A B B I A.

*Si conosce* da pustule pruriginose che principiano negl'interstizj delle dita.

*Si divide* in *iscabbia secca*, la quale forma pustule secche; e

*scab-*

*scabbia umida, che fa pustule  
suppuranti.*

*Internamente si dia un purgante ,  
un decotto purificante ,  
un etiope minerale , o  
fiori di zolfo con estrat-  
to d' enula .*

*Esternamente , bagni sulfurei ,  
unguento elleborato  
—— di precipitato albo .*

*La scabbia squamosa si cura talvolta con  
decotto di scorza d' olmo .*

### SCABBIA DEL CAPO.

*Ella forma croste umide nella parte cape-  
luta del capo .*

*Un disseccamento subitaneo fa pessimi mali  
d' occhj o di polmoni .*

*Oltre purganti e purificanti , lavisi il capo  
con decotto di specie emollienti e miele .*

### TIGNA DEL CAPO.

*Forma croste secche verdeggianti .*

*Internamente si pigli mercurio gommoso ,  
esternamente , un lavacro di specie  
emollienti con radice d' ellebro albo ,  
e solimato corrosivo .*

*Giovè talvolta unguento di precipitato ra-  
bro , e verderame .*

## CROSTA LATTEA.

E' una *scabbia crostosa*, che nasce in bocca agl' infanti.

*Internamente* si dian *purganti*, e *decotto di bardana*, e di *viala tricolore*.

## ERPETE o FORMICA:

Egli è una macchia con pustule pruriginose e talvolta tubercoli crostosi.

Se non giova *unguento elleborato*, si applichi *empiaastro vescicatorio*.

## V A R I.

Sono pustule rosse e dure nella faccia e intorno al naso, le quali anche si chiamano *goccia rosacea*.

Si lavi la faccia con *acqua impregnata di sak marino* e con tenue *soluzion di solimato*. *Internamente* si dian *purganti*.

I lividi tubercoli del viso vanno sovente in canchero.

## I D A T I D I.

Certe vescichette acquose si chiaman *idatidi*. Bisogna inciderle e disseccarle.

## L E N T I G G I N I.

Sono *macchie solari*. Si lavino con *aceto di ramolaccio*.

MOR-

## MORBI VENEREI.

**S**ONO morbi che nascono da contaminamento venereo.

In tutti si dà mattina e sera *internamente* 10. grani di mercurio gommoso, con decotto di bardana, di falsapariglia, o di legni.

Sotto l'uso del mercurio dasi ogni otto giorni un purgante.

Varj poi sono i medicamenti esterni.

### GONORREA.

E' un flusso puriforme ( marcioso ) dall' uretra.

Nasce da coito con femmina, che patisce di fluor bianco venereo.

Ne' primi giorni v'è *disuria*, o dolorosa emission d'orina;

La cura esige 1. *Emulsion* refrigerante.

2. *Decotto d'altea*.

3. *Purgante* eccoprotico di rabarbaro e sal mirabile.

Rallentandosi l'ardor dell'orina si dia polvere balsamica.

R. *Rhei electi*.

*Salis mirabilis* ℥ā ʒj.

Balsami copaivæ. gr. vj.

Si mescoli e si divida in IV. dose.

Vi si faccia un segno: ogni quattr'ore se ne pigli uno.

Nuoce il far nell'uretra *injezioni* astringen.

genti; ne vengon *bubboni* o *infiammagioni* di testicoli.

Ma le *injezioni* d'acqua  $\text{℥j}$ , di mucilagine di gommarabica  $\text{℥j}$ , e di mercurio sublimato corrosivo grani  $1\frac{1}{2}$ , curano in breve la gonorrea.

## FLUOR BIANCO.

E' un flusso puriforme da vagina muliebre. Nasce da coito con uomo che ha gonorrea. Si cura come la gonorrea.

## BUBBONI.

Sono intumescenze delle glandule inguinali. Si *resolvono* con empiaastro mercuriale, o si *aprono* con pietra caustica.

Gli *ulceri veneri* dell' *anguinaja* si curano con soluzione di solimato.

## FIMOSI.

E' venerea infiammation di prepuzio.

## PARAFIMOSI.

E' un'infiammazion venerea della ghianda; un collarino che reprime il prepuzio.

La fimosi e la parafimosi si curano mediante un bagno della verga in latte cotto con mercurio *gommoso*, o con soluzione di solimato.

Se per lo strangolamento della ghianda ci venisse

nisse cancrena , allora bisognerebbe con coltello squarciar il prepuzio .

### INFIAMMAZION DI TESTICOLI .

La cura , oltre un' emulsion refrigerante e mercurio gommoso , richiede cataplasma di spezie emollienti cotte con acqua vegeto minerale .

### ULCERI VENEREI DELLA GHIANDA .

Gli ulceri della ghianda o del prepuzio , detti *canceri venerei* , si scacciano con soluzion mercuriale .

*R. Mercurii sublimati corrosivi . gr. iv.*

*Aque florum sambuci . ℥j.*

*Mellis rosacei . ℥ss.*

*Si mescoli .*

### ANGINA VENEREA .

Colla medesima soluzione si ungano con pennello , alcune volte al dì , gli ulceri venerei delle fauci ; dato internamente un decotto di bardana con mercurio .

### OZENA VENEREA .

Gli ulceri della cavità delle nari , o dell' esterna superficie del naso , si curano con soluzion di solimato applicata all' ulcero .

Di-

Distrutto per erosione il setto delle nari ;  
*cade tutto il naso.*

## CONDILOMI.

Sono escrescenze fungose circa l'ano e le  
parti genitali ,

*Cura.* Si ungano con forte soluzione di so-  
limato , poi si copron d'unguento mer-  
curiale .

## TOFI o TUFFI.

Tumori venerei nell' ossa . Si risolvono  
con *empiastro* o *unguento mercuriale* ,  
e con decotto di *mezereo* .

## ARTRITIDE VENEREA.

E' un dolor di capo e d'articoli , che di  
notte cresce, e di giorno cala .

Si *cura* coll'uso interno di mercurio gom-  
moso .

## SCABBIA VENEREA.

Fa macchie e vari nella fronte e in altre  
parti .

Oltre l'uso interno di mercurio , si può  
con tenue soluzione di mercurio subli-  
mato lavare la parte scabbiosa .

F I N E .

NOI

# NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

**C**oncediamo Licenza a *Giuseppe Orlandi* Stampator di Venezia per la ditta del fù *Francesco di Niccolò Pezzana* di poter ristampare il Libro intitolato *Compendio d'Istituzioni chirurgiche del Celeb. Prof. Gioseffo Jacopo Plenck: ristampa*: Osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 7. Ottobre 1795.

( *Agostin Barbarigo* Rif.

( *Zaccaria Vallareffo* Rif.

( *Francesco Pesaro K. Pr.* Rif.

Registrato in Libro a Carte 238. al N. 60



*Marcantonio Sanfermo Segr.*







